

The
THOMAS LINCOLN
CASEY
LIBRARY
1925

L'ABEILLE

JOURNAL D'ENTOMOLOGIE

RÉDIGÉ PAR

M. S.-A. DE MARSEUL

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE,
MEMBRE DE L'INSTITUT DES PROVINCES DE FRANCE,
DES SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES DE LONDRES, DE RUSSIE, DE BELGIQUE
ET DE SUISSE,
ET DE PLUSIEURS AUTRES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
NATIONALES ET ÉTRANGÈRES.

TOME XI — 1873
DEUXIÈME SÉRIE — TOME V


PARIS

CHEZ L'AUTEUR, BOULEVARD PÉREIRE, 271, TERNES;
RORET, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE, 12.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE XI^e VOLUME.

| | PAGES. |
|--|---------|
| Monographie des Otiiorhynchides (2 ^e partie)..... | 454 |
| — des Phyllobides | 659 |
| — des Amaröides | 1 à 100 |



QL
596
19545
DE 2

ENT.

MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES

D'APRÈS LES

TRAVAUX DE MM. LES DOCTEURS SEIDLITZ & STIERLIN,
COORDONNÉS PAR M. S.-A. DE MARSEUL

DEUXIÈME PARTIE

VIII. — STOMODES (στομώδης, qui a une grande bouche) Sch.
Curc. Disp. 1826. 188, 404. — u 1834. 510, 463. — Seidl. 21, 13.

Le genre *Stomodes* a été établi par Schœnherr pour une petite espèce (*tolutarius*), de Crimée, qui est très-voisine de *St. gyrosicollis*; une 3^e très-différente (*rudis* Sch.), a été décrite de Turquie.

Stierlin a rapporté ces espèces aux *Otiorhynchus*; il est cependant difficile de les faire rentrer dans ce genre; car toutes trois (raccourcies par derrière) manquent de ptéryges en forme de lobe et ont le rostre parallèle et les scrobes supérieures dans tout leur parcours; structure qui ressemble beaucoup à celle des *Meira*. Dans les *Otiorhynchus* au contraire, je ne connais aucune espèce qui manque de ptéryges lobiformes, et lorsqu'elles sont petites, les scrobes sont plus latérales et non sur le dos du rostre comme dans les *Stomodes*.

Le *rudis* s'éloigne par la squamulation et les antennes épaisses, par tout le faciès, des 2 autres espèces, de sorte que Schœnherr a ajouté *an hujus generis?* et dans ce cas, il n'a que la structure des scrobes de commun avec le genre *Stomodes*, et on pourrait le rapporter aux *Meira*, si les cuisses, fortement en massue, ne le rangeaient ici. La disposition naturelle serait de l'éloigner des *Stomodes* et d'en faire un genre à part.

On doit encore rapporter aux *Stomodes*, l'*Otiorth. Schaufussi* Mill. (Wien. J. 1863. p. 31), de Dalmatie, qui a le rostre conformé d'une manière très-semblable et a également une fine pubescence sur le pronotum et les élytres. Les cuisses fortement en massue, qui souvent sont dilatées en une dent, distinguent le genre des *Peritelus*, les ongles libres et les scrobes supérieures, des *Omius* et des *Barypeithes*, qui ont beaucoup de ressemblance avec les *St. gyrosicollis* et *tolutarius*, le corps étroit, avec le 2^e segment abdominal long et les ongles libres, des *Myllaeus*, le manque de ptéryges lobiformes, des *Otiorthynchus*, et la fine pubescence du corps, enfin des genres suivants et des *Nastus*.

A Rostre très-court, plan en dessus; 2^e article du funicule court; cuisses armées d'une petite dent ou subdentées.

B Prothorax arrondi, *gyrosus*. 1. *gyrosicollis* Bohm. Dalm.

B' Prothorax finement ponctué.

2. *tolutarius* Bohm. Crim.

A' Rostre plus long, élevé entre les antennes; 2^e article du funicule allongé; toutes les cuisses fortement dentées ♂, ou postérieures mutiques ♀.

3. *Schaufussi* Mill. Dalm.

Ce genre est répandu en Dalmatie (*Schaufussi*), Autriche, Hongrie et Transylvanie (*gyrosicollis*), jusqu'en Crimée et en Grèce (*tolutarius*) et vraisemblablement se trouve au Caucase, car l'*Omius elongatus* Hoch. Bul. Mosc. 1847, 503, appartient probablement au *tolutarius*.

1. ST. GYROSICOLLIS Bohm. Sch. Cure. vii 1843. 146, 2.

Presque la stature du *St. toltarius*, mais moitié moindre, distinct par son prothorax également rétréci devant et derrière, densément *gyrosus* en dessus.

Tête infléchie, épaisse, assez convexe en dessus, roux de poix, assez luisante, peu pubescente; vertex lisse. Front finement et densément pointillé. Yeux latéraux, petits, arrondis, assez saillants, noirs. Rostre un peu plus court et un peu plus étroit que la tête, épais, peu arqué, assez convexe en dessus, roux de poix, finement et densément pointillé, menu, pubescent. Antennes insérées plus

près de l'extrémité du rostre, dépassant la base du prothorax, assez fortes, roux-ferrugineux, peu pubescentes de cendré; massue ovale-oblongue, acuminée. Prothorax un peu plus long que large au milieu, tronqué aux deux bouts, également rétréci devant et derrière, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, peu convexe en dessus, densément *gyrosus* dans sa longueur, roux de poix, assez luisant, assez densément garni de pubescence déprimée, blanche. Ecusson enfoncé, à peine visible. Elytres ovales-oblongues, légèrement échancrées en devant, un peu plus larges que le prothorax à la base, graduellement rétrécies à partir du milieu, vers le bout qui est subacuminé, 3 fois plus longues que le prothorax, peu convexes en dessus, vaguement pointillées de points fins et écartés, roux de poix, assez luisantes, assez densément parsemées de pubescence fine et cendrée. Prothorax et poitrine roux de poix; ventre d'un roux testacé plus pâle. Pattes médiocres, robustes, roux-ferrugineux, assez pubescentes de cendré; cuisses en massue médiocre, mutiques; jambes droites, un peu élargies en dedans, au milieu; tarses médiocrement allongés, garnis en dessous de brosses cendrées.

Dalmatie.

1^a. ST. PUNCTICOLLIS Tourn. Soc. Ent. Suisse 1864. 268. — Ab. VI 1871. 366.

Allongé, brun de poix, parsemé sur les élytres de petits poils d'un gris roux. Antennes et pattes, moins la base des cuisses, testacées. Tête et rostre fortement ponctués. Prothorax subarrondi, très-rétréci aux 2 bouts, à points très-fins et serrés, entremêlés de points plus gros et profonds. Elytres striées-ponctuées profondément; interstries marqués chacun d'une ligne de petits points bien distincts. Dessous testacé. — Long. 6 — larg. 2,3 mill.

Forme du *gyrosicollis*, un peu plus long, plus étroit, avec les élytres à peine plus larges que le prothorax, qui est différemment ponctué.

Sicile.

2. ST. TOLUTARIUS Bohm. Sch. Curc. II 1834. 511, 1.

De la longueur du *Sitones lineellus*, mais plus étroit.

Tête courte, couleur de poix, ponctuée-rugueuse, pubescente de blanc; vertex presque lisse. Yeux latéraux arrondis, peu saillants, noirs. Rostre très-court, un peu plus court et plus étroit que la tête, épais, impressionné au bout, brun de poix, ponctué-rugueux, pubescent de blanc. Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, robustes, roux-ferrugineux, pubescentes de cendré; massue ovale-oblongue, acuminée. Prothorax plus long que large au milieu, tronqué en devant et à la base, dilaté-arrondi sur les côtés, plus étroit par derrière, avec un rebord élevé, angles abaissés, assez convexes en dessus, brun de poix, à points écartés, assez profonds, parsemé d'une fine pubescence grise. Ecusson enfoncé, peut-être situé sur le métathorax. Elytres ovales-oblongues, un peu plus larges par devant que la base du prothorax et 3 fois plus longues que lui, subtronquées à la base, rabattues sur les côtés, dilatées obliquement vers le milieu après la base, atténuées par derrière, acuminées au bout, peu convexes en dessus, densément ponctuées de points marqués, mais peu réguliers; brun de poix, parsemées d'une pubescence fine, blanche. Dessous du corps brun de poix, pointillé, pubescent de gris. Ventre ferrugineux plus clair. Pattes assez courtes, robustes, roux-ferrugineux, pubescentes de gris; cuisses très-dilatées, multiques; jambes droites, plus larges au milieu; tarses allongés, avec des brosses fauves en dessous.

Crimée.

3. ST. SCHAUFUSSI Miller, Wien Monat. 1861. 31 (*Otiorhynchus*).
— Ab. iv 1866. xiv 2. — Long. 6 mill.

Resssemble un peu au *zebra* F. pour la forme.

Allongé, étroit, rouge, avec les élytres plus obscures ou tout brun de poix rougeâtre luisant. Tête ponctuée, avec un plus gros point entre les yeux. Rostre court et assez fort; scrobes grandes, avec l'intervalle étroit, convexe. 2^e article du funicule des antennes un peu plus long que le 1^{er}, les suivants diminuant de longueur, le dernier plus large que long. Pronotum un peu plus large que long, légèrement convexe, finement et peu densément pubes-

cent, fortement arrondi sur les côtés, assez fortement et peu densément ponctué, intervalles lisses luisants, avec une carène médiane quelquefois nulle. Elytres pas tout-à-fait 2 fois aussi longues que larges, arrondies sur les côtés, peu convexes, striées-ponctuées de gros points, interstries plus étroites que les points, lisses, luisants; vêtues de poils blancs, squamuleux, couchés et de plus longs poils espacés. Dessous luisant, couvert de points fins et espacés et d'une fine pubescence. ♂ Cuisses fortement dentées; ♀ antérieures avec une faible dent, les autres inermes. Antennes plus épaisses et composées d'articles plus courts.

Dalmatie, Boccagnazzo, dans un bois de chênes.

IX. — PARAMEIRA Seidl. 1868. 26, 16. (παρά, *auprès*, MEIRA).

Scrobes supérieures, grandes, allongées, ptéryges non divergentes.

Rostre parallèle, à peine plus étroit que la tête.

Cuisses fortement en massue.

Ongles libres.

Corps densément squamuleux.

Antennes épaisses.

Ce genre ressemble beaucoup au sous-genre *Meira* du genre *Peritelus*, surtout par son rostre et sa tête parallèle, et par le manque de ptéryges (ce qui le distingue également des *Otiorhynchus*), mais il s'en distingue par les cuisses fortement en massue et les ongles séparés; il diffère des *Stomodes* par l'épaisse squamulosité du corps, qui sur les élytres est entremêlée de soies épaisses, dressées, et lui donne beaucoup de ressemblance avec les *Trachyphleus*; des *Ptochus* par la large avance tronquée par devant du 1^{er} segment abdominal entre les hanches postérieures; des *Trachyphleus*, *Cathormiocerus* et *Axyreus* par les scrobes supérieures; des *Holcorhinus* enfin et des genres africains voisins par le manque de sillon transversal entre le front et le rostre.

Le genre se compose de 2 espèces, *rudis* Sch., et une nouvelle; il est propre, paraît-il, à la Turquie.

1. PAR. RUDIS Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 147 (*Stomodes*). — Seidl. 26, 1. — *hispida* Stierl. Otiorh., 1861. 163, 150 (*Otiorhynchus*).

Prothorax à peine plus large que long, moins arrondi sur les côtés, funicule aussi épais que le scape, soies dressées plus courtes, petites sur le prothorax, serrées, plus serrées sur les élytres. — Long. 3,3 mill.

A à peu près la taille et le faciès du *Peritelus* (Meira), *exiguus* Stierl., cependant ses petites soies dressées lui donnent un autre aspect. Les interstries alternes sont ordinairement distinctement plus élevés et portent seuls les petites soies qui se trouvent postérieurement sur tous les interstries. J'ai devant moi plusieurs exemplaires de Turquie, que je rapporte avec certitude au *Stomodes rudis* Bohm. Sch., dont je n'ai pas de type. Je pense que l'*O. hispidus* Stierl. doit s'y rapporter, puisque dans la description il signale sa ressemblance avec l'*O. minimus* Stierl. (probablement *Meira suturella*).

Turquie.

2. PAR. ISLAMITA. — *setosa* Seidl. 1868. 27, 2.

Prothorax beaucoup plus large que long, très-fortement dilaté-arrondi sur les côtés, funicule plus grêle que le scape, soies dressées très-épaisses et très-denses sur les élytres et sur le prothorax. — Long. 4 mill.

Le *P. setosa* a la plus grande ressemblance avec le genre *Trachypylus*, cependant ne peut se confondre avec lui à cause de ses serres toutes supérieures, il a un autre aspect que le précédent par sa forme beaucoup plus large, mais il est en tout très-voisin et ne se distingue que par les caractères de la diagnose. Il a été découvert à Tultscha par M. Malinovski et envoyé par le musée de Vienne comme *Trachypylus setosus* (Malinovski).

X. — PTOCHUS (πτωχός, *pauvre*) Schœnh. *Cure. Disp.* 1826. 187, 103. — Lacord. *Gen.* 188. — Seidl. *Otiorn.* 1868. 35, 20. — *Peritelus* Hoch. *Bul. Mosc.* 1851. I 58.

Scrobes supérieures.

Corps squamuleux ou presque nu.

Avance intercoxale du 1^{er} segment de l'abdomen plus étroite, subacuminée.

Cuisses mutiques ou dentées.

Ongles libres ou soudés.

Se distingue des *Peritelus* par l'avance intercoxale du 1^{er} segment de l'abdomen étroite, non tronquée par devant, mais légèrement en pointe; la stature du 1^{er} au 2^e segment anguleuse, le 2^e aussi long que les 2 suivants ensemble. Rostre très-large au bout, souvent pas beaucoup plus étroit que la tête. Scrobes courtes, tout-à-fait supérieures et ordinairement un peu convergentes par derrière. Antennes assez déliées; scape dans quelques-uns presque droit, dans d'autres fortement courbé (*bisignatus*, *4-signatus* et *subsignatus*). Elytres allongées, étroites, sans épaules ou avec les épaules très-légèrement arrondies (*rufipes* et *desertus*), striées-ponctuées simplement, sans interstries élevés, plus rugueuses, plus granuleuses, ou avec une sculpture analogue, plus ou moins densément squamuleuses, et presque glabres seulement dans le *rufipes*. Cuisses fortement renflées en massue jusqu'à la forme de dent. Ongles libres, plus rarement soudés.

Le genre *Ptochus* établi par Schœnherr en 1826 (*Disp. Mét.*) sur 2 espèces *porcellus* et *Perit. bisignatus* Germ. que ce savant cite comme *Cure. inustus* Steven ou *Omius grandicornis* Dej. — En 1834 Schœnherr décrit 11 espèces dont 2 doivent être mises en synonymie (*perdix* et *tessellatus*), et en 1843, dans son vi^e vol., il en ajoute une. — Outre ces 10 espèces de Sch., Hochhuth, *Bul. Mosc.* 1847 et 1851, en décrit 4 nouvelles, dont une est synonyme d'une des espèces de Schœnherr, et communique aussi plusieurs considérations importantes sur les *Ptochus* du sud de la Russie et du Caucase, qu'il avait réunis pour la plupart, cet

auteur a le premier appelé l'attention sur la structure différente des ongles et des antennes dans les *Ptochus*, il pourrait cependant ne pas avoir suffisamment séparé ces insectes des *Peritelus* qu'il paraît n'avoir connus qu'en nombre insuffisant et qui ressemblent beaucoup aux *Ptochus* en bien des points. Lacordaire le premier a nettement séparé ces 2 genres par la forme de l'avance intercoxale du 1^{er} segment abdominal et eût fixé les limites du genre *Ptochus*, si en donnant trop d'importance à la structure des crochets il ne fût arrivé à la fausse conséquence que quelques espèces à crochets libres doivent être reportées aux *Trachypylidulides*. En suivant cette règle, sur 16 espèces il faudrait en exclure 12, parmi lesquels le type *porcellus*. Depuis le travail de Hochhuth, ont été décrits de plus *Ptochus 4-signatus* Bach. (1856), *desertus* Mots. (1860), et *periteloides* Fuss. (1861). Le *Ptochus tigrinus* Redt. Hegel's Kaschmir iv 2, p. 504, se rapporte au genre *Cyphicrus*, ou vient auprès.

A Ongles libres.

B Scape peu courbé.

C Prothorax subtronqué à la base; scrobes convergentes par derrière.

D Corps densément squamuleux; cuisses fortement en massue.

E Cuisses mutiques; yeux arrondis.

F Elytres convexes, ventruës; prothorax étroit; 1^{er} article du funicule égal au 2^e.

1. *deportatus* Bohm. Sch. Sib.

F' Elytres peu convexes, ventruës.

G Front et rostre striolés, yeux plus fortement saillants.

2. *strigosirostris* (strigirostris Hoch.) Cauc.

G' Front et rostre squamuleux.

H Tête moins large; épaules subdistinctes.

3. *deserticola* (desertus) Mots. Sib.

H' Tête très-large; épaules nulles.

I Article 1^{er} du funicule égal à 2 et 3 réunis; antennes et tarses plus grêles; prothorax très-court. 4. *sus* (porcellus Bohm.) R^s C.

I' 1^{er} article du funicule égal au 2^e ; antennes et tarses forts ; prothorax plus long.

5. *setosus* Bohm. Cauc.

E' Cuisses dentées.

F Yeux oblongs. subtransverses (Ex Hochh.) ; prothorax très-court. 6. *circumcinctus* Bohm. Perse.

F' Prothorax plus long que large, cordiforme.

7. *longicollis* Bohm. Perse.

D' Corps luisant, parsemé de squamules très-fines, piliformes, peu nombreuses ; cuisses peu en massue. 8. *rufipes* Gyl. Cauc.

C' Prothorax bisinué à la base ; scrobes divergentes par derrière. 9. *carinirostris* Bohm. Mongol.

B' Scape plus fortement courbé.

C Yeux saillants ; front plus étroit, couleur obscure (Ex Hochh.).

10. *fulvidipes* (fulvipes Hochh.) Buchar.

C' Yeux peu saillants ; front plus large ; élytres à fascies longitudinales obscures (Ex Hochh.).

11. *latifrons* Hochh. Cauc.

A' Ongles soudés à la base ; élytres convexes.

B Scape courbé, antennes rapprochées, scrobes à marges internes convergentes, marge extérieure plus souvent abaissée au bord inférieur de l'œil.

C Rostre très-court, très-large, épais, plus haut que long ; front convexe.

D Tête avec les yeux un peu plus larges que le prothorax ; prothorax subcylindrique ; élytres fortement convexes, ornées de taches dénudées.

12. *bisignatus* Germ. 1 Dalm. R^s

D' Tête avec les yeux plus étroits que le prothorax ; prothorax avec les côtés un peu arrondis ; élytres moins convexes, densément et également squamuleuses. 13. *subsignatus* Bohm. R^s Hong.

C' Rostre plus long, plus étroit, pas plus haut que long ; front un peu déprimé ; élytres fortement convexes, ornées de taches dénudées. 14. *4-signatus* Bach. A

B' Scrobes subsupérieures non convergentes ; scape presque droit ; squamules arrondies, serrées.

15. *periteloides* Fuss. Transylv. Serv.

Des 15 espèces de *Ptochus*, un seul (*4-signatus*) se trouve dans l'O. de l'Allemagne, 1 en Italie, Dalmatie et Hongrie, 1 en Hongrie et Russie méridionale, 1 dans le sud-est de la Russie et le Caucase, 5 appartiennent à l'Europe et 11 à l'Asie.

1. PT. DEPORTATUS Bohm. Sch. n 1834. 485. — Seidl. 38, 1. — *variegatus* Hoch. Mosc. 1851. 65 (*Peritelus*).

Facile à reconnaître et s'éloignant de tous les autres *Ptochus* par son prothorax proportionnellement très-petit, ses élytres larges et fort convexes et la tête assez étroite.

Rostre presque aussi large que la tête et plus large que le front entre les yeux. Scrobes distantes. Antennes grêles; scape très-peu courbé, 1^{er} et 2^e articles du funicule presque d'égale longueur. Prothorax plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, tronqué devant et derrière, presque d'égale longueur. Elytres à la base pas plus larges que le prothorax, graduellement élargies, presque sans épaules, élargies en ventre derrière le milieu et plus de 2 fois aussi larges que le prothorax et ensuite terminées en pointe. Squamosité épaisse, mêlée de petites soies sérialement disposées, tantôt d'un gris uniforme, tantôt plus ou moins marquetée de taches d'un blanc intense et de noires. — Long. 3 à 4 mill.

Décrit par Schoenherr sur un individu unicolore, d'où Hochhuth regarde comme espèce distincte les individus bariolés.

Sibérie.

2. PT. STRIGOSIROSTRIS. — *strigirostris* Hoch. Bul. Mosc. 1851. 64 (*Peritelus*). — Seidl. 39, 2.

Ovale-oblong, noir, luisant, squamuleux de gris et d'obscur. Front et rostre assez plans, fortement ridés longitudinalement sur toute la surface. Yeux très-petits, un peu arrondis-allongés et très-saillants. Antennes grêles, s'étendant jusqu'au milieu des élytres, 1^{er} article du funicule beaucoup plus long que le 2^e, massue en ovale allongé, étroit, sans être tout-à-fait en pointe aiguë. Prothorax de moitié plus large que long, presque cylindrique,

médiocrement convexe et fortement ponctué-ridé. Elytres ovales, un peu plus de 3 fois aussi longues que le prothorax, coupées droit par devant, cependant sans angles huméraux saillants, arrondies ensemble par derrière; stries fortes, robustes, ponctuées, presque crénelées; interstries un peu convexes, garnis de points fins assez épars, portant chacun un poil sétiforme raide, jaune-blanc, un peu dirigé en arrière. Les squamules qui revêtent partout l'insecte très-lâchement, sont disposées en chevrons, de forme arrondie à un grossissement assez fort, à la simple loupe ont une certaine ressemblance à une substance cristallisée; en dessous elles sont toutes d'un gris blanc, en dessus mêlées d'un brun jaune tantôt plus foncé, tantôt clair, tantôt se condensant en taches plus obscures. Antennes et pattes d'un rouge ferrugineux foncé. Cuisses en massue, les 2 crochets des tarses très-petits, d'égale longueur. — Long. 2,8 mill.

Sibérie, Nertschinsk.

3. PT. DESERTICOLA. — *desertus*. Mots. Peterb. 1859. 1 312. — Seidl. 40. 3.

Scrobes supérieures. Ongles libres. Corps densément squamuleux. Prothorax court, un peu plus étroit que les élytres. Elytres peu convexes. Épaules un peu saillantes, arrondies. Tête plus étroite. — Long. 3 à 3,5 mill.

Paraît assez semblable au *deportatus*, mais a une toute autre forme, puisque le prothorax est proportionnellement aux élytres plus large, celles-ci sont plus étroites, plus parallèles, ont les épaules arrondies, mais cependant distinctes et sont en dessus légèrement convexes. Tête assez semblable à celle du *deportatus*, par là même étroite en comparaison de celle des 2 espèces suivantes. Yeux un peu plus convexes que dans *deportatus* et antennes plus épaisses et plus courtes, 1^{er} article du funicule 2 fois aussi long que le 2^e, celui-ci assez égal au 3^e.

Sibérie.

4. PT. SUS. — *porcellus* Bohm. Sch. II 1834. 482. — Seidl. 40, 4. — *perdix* Bohm. Sch. Curc. II 1834. 484, 5.

Forme avec les 3 espèces suivantes un petit groupe na-

turel qui, par sa grande tête, ses ongles séparés, sa squamosité épaisse et par son scape légèrement courbé, se distingue des autres *Ptochus* et compte les plus grandes espèces du genre.

Tête épaisse et assez convexe. Scrobes très-distantes, les carènes qui les bordent en dedans sont tranchantes et convergentes par derrière. Antennes environ de la longueur de la moitié du corps, 1^{er} article du funicule à peu près de moitié plus long que le 2^e. Yeux arrondis et un peu allongés, tandis que d'après Hochhuth ils sont presque transverses dans le *circumcinctus*. Prothorax 2 fois aussi large que long, tronqué devant et derrière. Prosternum aussi long que le pronotum. Elytres régulièrement arrondies sur les côtés, sans épaules, en pointe par derrière, légèrement convexes, finement striées-ponctuées, garnies de petites soies blanches et densément squamuleuses comme tout le corps. Squamosité ou toute blanchâtre unicolore, ou avec 2 bandes longitudinales sur le prothorax et des taches sur les élytres plus ou moins distinctes et foncées. Le *perdix* se compose des individus de cette dernière coloration. Cuisses fortement en massue; jambes assez délicates et longues, ainsi que les tarses. Ongles grands et très-divergents. — Long. 3,5 à 5 mill.

Répandu dans tout le sud et l'est de la Russie jusqu'au Caucase et paraît n'y être pas rare. Le *lacteolus* (Mts.) appartient à cette espèce.

5. PT. SETOSUS Bohm. Sch. Curc. II 1834. 484. — Seidl. 41, 5.

Scrobes supérieures; ongles libres, plus grands; corps densément squamuleux; élytres peu convexes; épaules nulles; tête très-large; prothorax moins court; tarses très-longs, robustes; antennes moins grêles; scape peu courbé; 1^{er} article du funicule égal au 2^e. — Long. 5 mill.

Ressemble extraordinairement au *porcellus*, mais s'en éloigne par les points suivants: antennes plus épaisses et plus longues; 2^e article du funicule pas plus court que le 1^{er} (mais cela peut aussi varier); prothorax pas 2 fois aussi large que long, et surtout les tarses sont différents, puisqu'ils ne sont pas seulement distinctement plus longs;

mais encore beaucoup plus épais que dans le *porcellus*, ce qui est surtout marqué dans le 1^{er} et le 2^e article.

N'ayant sous les yeux qu'un seul individu type de Schœnherr, je ne puis juger si ces différences varient.

Caucase.

6. PTOCH. CIRCUMCINCTUS Bohm. Sch. Curc. u 1834. 481. — Seidl. 42, 7.

Ovale-oblong, noir. Tête courte, large, noire, ornée de squamules brunes et d'autres blanches au-dessous des yeux, qui sont ovales, peu saillants. Rostre presque aussi long et aussi large que la tête, épais, droit, plan, squamuleux de blanc sur le dos. Antennes insérées vers l'extrémité du rostre, de la longueur de la moitié du corps, assez épaisses, brunes, peu poilues; massue ovale, en pointe. Prothorax plus court que large, tronqué et rétréci aux 2 bouts, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, squamuleux de brun, avec une ligne dorsale droite, obsolète en devant, et une large bande latérale de squamules blanches. Ecusson petit, triangulaire, squamuleux de blanc. Elytres un peu plus larges en devant que la base du prothorax, arrondies aux épaules, dilatées au-delà du milieu, puis rétrécies vers le bout, qui est en pointe, 4 fois plus longues que le prothorax, peu convexes sur le dos, déclives par derrière, finement striées-punctuées: interstries un peu convexes, densément squamuleuses de brun, ornées d'une ligne suturale et d'une latérale de squamules blanc de neige, avec une pubescence couchée, raide, brune. Dessous obsolètement pointillé, squamuleux de cendré argenté. Pattes médiocres garnies de squamules blanches; cuisses en massue, armées d'une dent obsolète; tarses ferrugineux.

La description va très-bien à un très-grand exemplaire foncé de *porcellus* ou de *setosus*, avec la suture plus claire, ainsi que les côtés des élytres, seulement les caractères suivants paraissent constituer des différences spécifiques: les interstries des élytres sont un peu convexes et portent de petites soies d'un brun foncé, les cuisses sont munies d'une dent indistincte. Un caractère est encore plus sail-

lant, celui que Hochhuch donne dans son travail sur les *Curculionides* de Russie p. 60, que les yeux sont presque transversaux, ce qui fait présumer que ce n'est pas un *Ptochus*, mais peut-être un *Cyphiceride*, si d'ailleurs Hochhuch a connu le vrai *circumcinctus*. Cette conjecture est supposable, car Schœnherr a décrit l'espèce de la collection Faldermann.

Perse.

7. PT. LONGICOLLIS Bohm. Sch. Curc. n 1834. 482, 2. — Seidl. Otiorh. 42.

Ovale-oblong, noir, densément garni de squamules brunes. Tête courte, large, épaisse, avec des squamules pâles au-dessous des yeux, qui sont oblongs, peu saillants. Rostre aussi large et à peine plus long que la tête, épais, droit, plan, faiblement canaliculé vers le bout, à squamules brunes sur le dos, pâles sur les côtés. Antennes insérées vers l'extrémité du rostre, de la longueur de la moitié du corps, assez épaisses, brunes, peu poilues; massue oblongue, en pointe, plus claire. Prothorax un peu plus long que large, tronqué aux 2 bouts, plus large en avant, droit sur les côtés jusqu'au-delà du milieu, puis rétréci vers la base, convexe, ponctué-rugueux, orné d'une ligne dorsale droite et d'une autre latérale plus large de squamules pâles. Ecusson à peine visible. Elytres en ovale oblong, un peu plus larges en devant que la base du prothorax, arrondies aux épaules, puis arrondies jusqu'au-delà du milieu, rétrécies vers l'extrémité, 4 fois plus longues le prothorax, arrondies au bout, peu convexes, déclives par derrière, régulièrement et finement striées-ponctuées; interstries un peu convexes, avec des soies courtes, couchées, brunes. Dessous d'un noir de poix, obsolètement pointillé, densément squamuleux de gris. Pattes roux de poix, squamuleuses de gris et pubescentes; cuisses un peu en massue, armées d'une petite dent obsolète; tarses ferrugineux.

S'éloigne des autres espèces comme le *circumcinctus*, par ses cuisses légèrement dentées et de ce dernier par un prothorax plus long, ce qui lui donne un faciès tout diffé-

rent de tous les autres *Ptochus* ; il peut être plus large par devant, parallèle jusqu'au-delà du milieu et plus étroit vers la base ; il n'y a pas d'autre caractère qui le distingue du *circumcinctus*.

Perse.

8. PT. RUFIPES Gyl. Sch. Curc. II 1834. 487. — Seidl 42, 9.

Scrobes supérieures ; ongles libres ; prothorax tronqué à la base ; corps et élytres luisants, parsemés de squamules piliformes très-petites. — Long. 4 mill.

Très-distinct par l'absence de cette squamosité épaisse qui se trouve dans tous les autres *Ptochus* ; parsemé à la place de toutes petites squamules transverses, piliformes, pulvérulentes, qu'on peut à peine voir à l'œil nu, mais qui sont brillantes d'or à un plus fort grossissement. Tête un peu plus étroite que dans le *porcellus* ; rostre aussi large ; scrobes des antennes comme dans le *porcellus* ; prothorax assez fortement arrondi sur les côtés, 2 fois aussi large que long, grossièrement ponctué ; élytres profondément striées-ponctuées, avec les interstries un peu convexes. Cuisses pas aussi fortement en massue que dans le *porcellus* ; jambes et tarses aussi longs et aussi étroits.

Le *Ptochus rufipes* Gebl. Ledeb. I, Reise. III, 169, appartient, d'après Hochhuth, au *Phyllobius suratus* Sch., celui de Schöenherr ne s'y rapporte pas, puisque ce dernier doit avoir un rostre beaucoup plus étroit que la tête, tandis que notre insecte est un vrai *Ptochus*, et par conséquent a le rostre à peine plus étroit que la tête. La conformation de l'abdomen et du métasternum est chez lui aussi tout-à-fait celle des *Ptochus* et ne permet pas de le réunir aux *Phyllobius*.

Caucase.

9. PT. CARINIROSTRIS Bohm. Sch. Curc. VII 1843. 105. — Seidl. 43, 10.

Ongles libres ; prothorax bisinué à la base ; lobes oculaires très-obsolètes ; scrobes supérieures, divergentes par derrière ; corps densément squamuleux ; yeux oblongs. — Long. 6 mill.

Diffère tant par le prothorax qu'il doit être peut-être éloigné du genre. Il présente des lobes oculaires, mais très-légers et qui n'atteignent pas les yeux; ceux-ci n'ont pas la forme longitudinale transverse propre aux *Oxyophthalmus*, mais sont dirigés dans l'axe longitudinal de la tête et sont en pointe par devant. Le rostre est aussi différent, puisque il est très-fortement convergent par devant, tandis que les scrobes divergent par derrière. Antennes semblables à celles du *porcellus*. Prothorax plus large que long, à peine arrondi sur les côtés, profondément bisinué à la base, les élytres qui sont serrées fortement contre lui sont arrondies chacune à la base, exactement aussi larges et en pointe par derrière. Pattes semblables à celles du *porcellus*, seulement les ongles encore plus longs; abdomen et métasternum conformés comme dans les autres *Ptochus*. — Type seul, de Mongolie.

10. PT. LATIFRONS Hoch. Bul. Mosc. 1817. 504 (*Peritelus*). — Seidl. 44, 41.

M'est resté inconnu. Hochhuth le compare pour la forme au *Per. necessarius*, cependant il doit être beaucoup plus petit. Il doit être voisin du *fulvipes* dont il a la forme du prothorax, qui a devant et derrière une impression transversale. Le caractère suivant est remarquable : « l'extrême bord antérieur du prothorax est un peu élevé et forme une ceinture squamuleuse de blanc. »

Caucase.

11. PT. FULVIDIPES. — *fulvipes* Hoch. Bul. Mosc. 1851. 62 (*Peritelus*). — Seidl. Otiorh. 44, 12.

Il a en général la forme du *Pt. latifrons*, mais il s'en distingue aisément par son front plus étroit, ses yeux arrondis et bien plus saillants, et par sa couleur plus foncée. Tête presque aussi large que le prothorax, le front plan, avec une fovéole entre les yeux. Rostre court, fort élargi par devant, paraissant comme fendu, car il est longé par un sillon profond, assez large, s'oblitérant par en haut, comme tout l'insecte, densément squamuleux de gris-jaunâtre et garni de soies courtes, raides. Antennes

rouge-ferrugineux, atteignant le milieu des élytres, scape assez courbé, à peine épaissi au bout, 4 1^{ers} articles du funicule allongés et presque cylindriques, 3 derniers courts et fortement rétrécis à la base, le 1^{er} est le plus long, le 2^e d'un quart plus court que lui et les suivants devenant toujours de plus en plus courts; massue en ovale allongé et fortement en pointe. Prothorax près de 2 fois aussi large que long, légèrement étranglé tout près du bord postérieur, légèrement impressionné de chaque côté derrière le bord antérieur, d'ailleurs cylindrique; paraît densément garni de squamules, avec de gros points écartés, une ligne médiane légère, pas bientôt limitée, et de chaque côté une ligne longitudinale plus large qui n'atteint pas le bord antérieur, squamuleuses de blanc; les soies courtes, épaisses, noirâtres, sont dirigées un peu par devant, presque dressées, et on les aperçoit, ainsi que celles de la tête, lorsqu'on regarde l'insecte de côté à la loupe. Elytres un peu plus larges que le prothorax et 3 fois aussi longues que lui, faiblement élargies par derrière, médiocrement convexes, non saillantes à la suture, chacune terminée en pointe obtuse, assez densément et assez finement striées-punctuées et densément garnies de squamules rondes; quelques taches irrégulières sur la surface et la pointe sont blanches; dans les interstries il y a des rangées de soies courtes dirigées par derrière, qui vues d'en haut paraissent blanches, et de côté jaune obscur, et de derrière d'un terreux presque foncé. Pattes jaune-rougeâtre, densément garnies de squamules et de poils sétiformes très-courts, blanchâtres. — Long. 3,8 à 4,6 mill.

Steppes de Bucharie.

Cet insecte, qui m'est inconnu, s'éloigne du *bisignatus*, avec lequel il a de grands rapports, par ses ongles libres; du *latifrons* dont il a la forme générale, par son front plus étroit et sphérique, ses yeux beaucoup plus saillants, son scape fortement courbé et sa couleur foncée; le rostre court et très-élargi par devant ferait presque croire à un *Myllocerus*, cependant les épaules ne sont pas saillantes.

12. PT. BISIGNATUS Germ. Ins. Spec. 1824. 410, 555 (*Peritelus*). — Bohm. Sch. Curc. n 1834. 488, 10. — Seidl. 41, 13. — *grandicornis* Stev. Mus. Mosq. n 94 (Sec. Sch.).

Forme avec les deux espèces suivantes un petit groupe naturel qui est caractérisé par les scrobes convergentes en dessus et les ongles soudés.

Tête presque plus large que le prothorax, avec les yeux, qui sont fortement saillants. Front convexe. Rostre plus court que large, un peu rétréci par devant, vu de côté plus épais que long. Scrobes placées tout en dessus, convergentes par derrière, éloignées l'une de l'autre seulement de la moitié de l'intervalle qui sépare les yeux. Scape assez fortement courbé; funicule presque aussi épais que le scape; les 2^{1ers} articles longs, 3^e et 7^e courts; massue étroite, allongée. Prothorax beaucoup plus large que long, à peine arrondi sur les côtés, presque cylindrique, quelquefois plus large au bout qu'à la base; le prosternum beaucoup plus court que le pronotum. Les élytres sont ovales-allongées, fort convexes, arrondies sur les côtés. Leur squamiosité est grise ou brunâtre, comme sur le prothorax, irrégulière et mêlée de poils et couvrant, en partie aussi les stries, de sorte que la surface paraît rugueuse et vaguement squamuleuse. Taches de différentes extensions, ordinairement une de chaque côté, sont sans squamules, de là plus obscures, garnies seulement de poils. On voit en outre sur les élytres de petites soies dressées plus ou moins longues. Pattes rouges; cuisses plus foncées au milieu; ongles soudés à la base et petits. — Long. 2,5 à 3,5 mill.

Italie, Dalmatie, Hongrie. — Crimée (Sch.).

13. 4-SIGNATUS Bach. Sett. Zeit. 1856, 242. — Seidl. 45, 14.

Ongles soudés à la base; scrobes supérieures convergentes; scape courbé; rostre moins épais, plus étroit, pas plus haut que long; tête plus étroite que le prothorax; prothorax arrondi sur les côtés; front un peu déprimé; élytres fortement convexes, irrégulièrement squamuleuses, macules dénudées. — Long. 2,5 à 3 mill.

Ressemble aux *Pt. bisignatus* et *subsignatus*, dont il se distingue par son rostre plus étroit, qui, vu de côté, est beaucoup moins haut; en outre, le funicule est distinctement plus long et la squamosité peu serrée, les taches qui, dans *bisignatus*, consistent en espaces sans squamules, ont une plus grande étendue et forment, pour l'ordinaire, 2 bandes convergentes par derrière sur la dernière moitié des élytres, et 2 taches distantes sur la moitié basale. La squamosité irrégulière donne aux élytres un aspect encore plus rugueux que dans le *bisignatus*, et couvre en partie les stries. Pattes entièrement jaune-rouge.

Thuringe.

Présente avec le *Foucartia ptochoïdes* Bach une curieuse analogie dans la forme extérieure et la vestiture, produite par le même genre de vie, ce qui les fait rencontrer souvent ensemble. Leur ressemblance est si grande qu'on les confondrait aisément si on ne considérait le canal du rostre.

14. PT. SUBSIGNATUS Bohm. Sch. Curc. 1834. n° 489. — Seidl. 46, 15.

Ongles soudés à la base; scrobes supérieures, convergentes; rostre très-épais, très-court; tête avec les yeux plus étroite que le prothorax, front convexe; prothorax arrondi sur les côtés; élytres moins convexes, densément et régulièrement squamuleuses, stries exceptées; interstries sérialelement sétacés. — Long. 2,2 à 3,2 mill.

Ressemble beaucoup au *bisignatus*, dont il diffère par les points suivants: prothorax distinctement arrondi sur les côtés et distinctement plus large que la tête; élytres moins convexes, plus étroites, densément et régulièrement squamuleuses, par suite les stries dépourvues de squamules, sont profondes et nettement tracées, les interstries avec une rangée régulière de petites soies dressées; les squamules sont un peu allongées. Si la couleur uniforme grise des élytres présente des taches, elles sont formées de squamules plus foncées, et non de places dénudées comme dans *bisignatus* et *4-signatus*.

Crimée, Hongrie.

15. PT. PERITELOIDES Fuss. Verh. Sieb. 1861. 9, Pl. A. — Seidl. 46, 46.

Ongles soudés à la base; tarses très-larges; serobes presque supérieures, non convergentes par derrière; scape droit; squamules arrondies, très-denses. — Long 2,3 à 4 mill.

Se distingue de tous les autres *Ptochus*, à l'exception du *carinirostris*, en ce que les serobes ne sont pas tout-à-fait supérieures, mais creusées sur le côté et ne convergent pas derrière; on pourrait presque les dire latérales, cependant elles sont complètement visibles d'en haut, et l'insecte par conséquent peut très-bien se classer dans les *Ptochus*, dont il a la structure de l'abdomen et du métasternum, ce qui l'éloigne des *Peritelus*, dont il est, du reste, très-voisin. Le prothorax large et les élytres faiblement convexes, ainsi que le scape droit, et les serobes le distinguent du *bisignatus*; il ressemble beaucoup au *subsignatus* par sa faible convexité et sa couleur d'un gris-argenté uniforme, mais il s'en éloigne par le manque de petites soies dressées, et par les squamules rondes, qui sont si serrées que l'aspect paraît être très-lisse et se rapproche de celui des *Peritelus*. Les ♂, un peu plus étroits, ont quelque ressemblance par ex. avec les *Per. Schornherri* et *Gougeleti*, seulement ils sont beaucoup plus petits, de sorte que le nom est très-significatif.

Découvert à Hermanstadt, et décrit et figuré par Fuss. Commun dans les prairies; se trouve aussi en Servie.

XI. — NASTUS (ναστός, *pressé*) Sch. VII 1843. p. 405, 340.

— Lacd. Gen. VI p. 405. — Seidl. 23, 13.

Antennes médiocres, assez robustes; scape atteignant presque le prothorax, épaissi peu à peu; 1-2 articles du funicule obconiques, 3-7 courts turbinés, croissant successivement en largeur; massue pyriforme de 4 articles.

Rostre assez allongé, robuste, un peu épaissi vers le bout,

plan en dessus, échancré en arc à l'extrémité; ptéryges peu divariquées.

Yeux arrondis, peu convexes.

Prothorax court, tronqué devant et derrière, un peu arrondi sur les côtés, peu convexe en dessus.

Écusson petit, triangulaire.

Elytres en ovale allongé, faiblement échancrées ensemble à la base, convexes.

Pattes allongées, robustes; cuisses en massue subdentées; jambes grêles, antérieures un peu élargies au milieu, munies d'un petit onglet au bord apical interne; dernier article des tarses claviforme, biangulé.

Ce genre se distingue de tous ceux du groupe par la réunion de 3 caractères : le corps est squamuleux, les cuisses au moins les postérieures sont dentées et les ongles soudés. Le rostre est remarquable par sa forme étroite et plus long que la tête. Des 2 espèces connues jusqu'ici, *N. Goryi* Bohm. Sch. a 1 dent aux 4 cuisses postérieures, *N. humatus* Germ. en a une à toutes les cuisses; les 2 appartiennent à la faune de la mer Noire et se trouvent dans la Crimée et au Caucase. Les 2 espèces décrites par Lucas se rapportent comme synonymes au *Holcorhinus querulus*.

1. *N. GORYI* (Parreyss.) Bohm. Sch.* Curc. vii 1843. 406, 1.

Taille du *Liophleus nubilus*; mais elle varie jusqu'à devenir 2 fois moindre. Tête en carré oblong, épaisse, assez convexe en dessus, finement et densément pointillée, couverte de squamules lancéolées, cendrées, serrées, plus rares derrière les yeux; front obsolètement canaliculé; yeux petits subovales, peu saillants, bruns; rostre un peu plus étroit et plus long que la tête, épais, peu arqué, un peu dilaté vers l'extrémité, assez plan en dessus, obsolètement caréné du milieu jusque près du bout, où il n'est pas impressionné; couleur, ponctuation et vestiture de la tête. Antennes noires, squamuleuses de cendré et pubescentes; massue un peu en poire, d'un noir obscur. Prothorax plus court que large à la base, tronqué aux 2 bouts, plus étroit en devant, anguleusement dilaté au

milieu des côtés, peu à peu rétréci vers la base, avec les angles presque droits, assez convexe en dessus, densément et finement granulé-rugueux, caréné obsolètement sur le dos ; noir, vêtu de squamules piliformes grises, orné de chaque côté d'une bande étroite de squamules blanches, un peu arquée en dedans vers le milieu. Ecusson, petit, triangulaire ; noir, squamuleux de gris. Elytres ovales, légèrement échancrées ensemble par devant, un peu plus larges que la base du prothorax ; avec les épaules obliques-arrondies ; subitement dès la base dilatées-arrondies, rétrécies du milieu vers le bout, qui est ensemble subacuminé ; près de 4 fois plus longues que le prothorax, moins convexes sur le dos, déclives postérieurement, obsolètement ponctuées-striées, avec les points très-écartés, interstries plans ; noires, squamuleuses de gris, assez densément, mais plus obsolètement ponctuées de cendré. Dessous obsolètement et densément pointillé, noir, couvert de squamules piliformes, cendrées. Pattes allongées, robustes, noires, squamuleuses de gris et pubescentes ; cuisses en massue, antérieures dentées à peine, postérieures brièvement et obtusément. Jambes grêles, droites, plus menues à la base.

Ibérie, Crimée ; désert des Kirghises.

2. *N. HUMATUS* Germ. Spec. Ins. 1 1824. 354, 489. — Bohm. Sch. VII 407, 2.

Taille de l'*O. giraffa*. Tête médiocre, épaisse, peu convexe en dessus, finement et densément pointillée, noire, garnie en dessus, sur les côtés et en dessous de squamules grises et dorées entremêlées ; front marqué d'une petite fovéole arrondie. Yeux latéraux, arrondis, peu saillants, bruns ; rostre un peu plus long et près de moitié plus étroit que la tête, robuste, assez menu, peu arqué, un peu épaissi au bout, un peu plan en dessus, obsolètement caréné au milieu, couleur et ponctuation de la tête, peu squamuleux de gris. Antennes médiocres, fortes, noires, rarement pubescentes ; massue en poire, acuminée, plus claire au bout. Prothorax plus court que sa largeur médiane, tronqué aux 2 bouts ; assez obtusément

dilaté-arrondi sur les côtés, un peu convexe en dessus, finement et densément granulé-rugueux, caréné dans sa longueur sur le dos, noir, garni de squamules cendrées et cuivreuses entremêlées, peu nombreuses. Ecusson petit, subtriangulaire, de même couleur. Elytres ovales-oblongues, à peine échanquées en devant, un peu plus larges que la base du prothorax, avec les angles huméraux un peu saillants, arrondis; peu dilatées sur les côtés, atténuées par derrière, en pointe arrondie au bout, près de 4 fois plus longues que le prothorax, assez convexes sur le dos, déclives postérieurement, légèrement mais distinctement striées-ponctuées; interstries plans, très-finement coriaces; noires, squamuleuses de gris, obsolètement variées de blanc. Dessous densément pointillé, noir, avec la poitrine squamuleuse d'or vif, et le ventre de cendré. Pattes allongées, robustes, noires, parcimonieusement squamuleuses de cendré et pubescentes; cuisses en massue, armées en dessous d'une dent assez forte, aiguë; jambes grêles plus menues à la base, antérieures un peu élargies au milieu, onguiculées en dedans au bout.

Caucase.

II^e DIVISION.

La 2^e division, dans laquelle les scrobes sont latérales de préférence, contient beaucoup moins d'espèces que la 1^{re}. Des 46 genres qui lui appartiennent, 8 sont européens, 4 des contrées limitrophes de l'Asie, 3 de Madère et des Canaries, et 1 du sud de l'Afrique.

XII. — EPIPHANEUS (ἐπιφάνιος, *remarquable*). Sch.

Curc. VII 1843. p. 232, 323. — Lacd. Gen. VI 204.

Antennes longues, menues; scape dépassant les yeux, terminé en massue: 3 1^{ers} articles du funicule allongés, les autres un peu plus courts, tous obconiques; massue allongée, acuminée.

Rostre court, contigu à la tête, plan en dessus, profondément échanqué en arc au bout; scrobes latérales, courtes.

- Yeux latéraux, subarrondis, médiocrement saillants.
Prothorax petit, tronqué aux 2 bouts, peu arrondi sur les côtés, un peu rétréci en devant.
Ecusson nul.
Elytres amples, en ovale court, très-convexes.
Corps subovalaire, convexe, squamuleux, aptère, de grandeur moyenne.
Antennes de la longueur de la moitié du corps, insérées vers l'extrémité du rostre, menues, brisées, de 12 articles, 1^{er} (scape) dépassant les yeux, graduellement élargi vers le bout, en massue, droit; 2-4 allongés, graduellement raccourcis, les autres courts, égaux, tous obconiques; massue allongée, étroite, acuminée de 4 articles distincts.
Rostre un peu plus étroit que la tête, mais à peine plus plus court, un peu allongé, non épaissi au bout, presque plan en dessus, profondément échancré en cercle au bout; scrobes commençant près de l'extrémité du rostre, courtes, profondes, s'avancant vers les yeux et peu profondes en ce point.
Yeux latéraux, subarrondis, presque un peu oblongs, médiocrement convexes.
Prothorax petit, un peu plus court que large à la base, tronqué aux 2 extrémités, peu dilaté-arrondi sur les côtés, un peu plus étroit par devant, un peu convexe transversalement en dessus.
Ecusson invisible.
Elytres amples, ovales, à peine plus larges à la base que le prothorax, avec les angles huméraux arrondis, dilatées-arrondies au-delà du milieu sur les côtés, enveloppant les côtés de l'abdomen, un peu atténuées au bout, subacuminées ensemble, couvrant l'anus, très-convexes en dessus.
Pattes médiocres, égales en longueur, mutiques; cuisses renflées en massue médiocre au-delà du milieu; jambes grêles, droites, tronquées au bout; tarses spongieux en dessous, dernier article claviforme, biangulé.

Il diffère beaucoup du genre *Phellicodes*, dont il est très-voisin, par la structure des antennes et du corps.

1. E. MALACHITICUS Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 233, 1.

Taille de l'*O. nigrita*.

Tête presque carrée, épaisse, peu convexe en dessus, densément mais obsolètement pointillée, noire, garnie assez densément de squamules vert-argenté, creusée d'une courte cannelure entre les yeux. Yeux subarrondis, noirs. Rostre à peine plus long mais un peu plus étroit que la tête, épais, plan en dessus, coloré, ponctué et vêtu comme la tête. Antennes grêles, brun de poix, parcimonieusement squamuleuses et pubescentes; massue allongée, étroite, acuminée. Prothorax plus court que large au milieu, tronqué aux 2 bouts, un peu plus étroit par devant, peu dilaté-arrondi sur les côtés, un peu convexe transversalement en dessus, densément mais obsolètement pointillé, noir, assez densément vêtu de squamules vert-argenté. Ecusson non visible. Elytres amples, ovales, tronquées en devant, à peine plus larges que la base du prothorax, avec les angles huméraux arrondis, dilatées-arrondies sur les côtés aussitôt après la base jusqu'au-delà du milieu, ensuite atténuées vers l'extrémité qui est acuminée, 4 fois plus longues que le prothorax, très-convexes en dessus, déclives par derrière, finement striées-ponctuées; interstries larges, plans, très-finement coriacés; noires, vêtues partout assez densément de petites squamules rondes, vert-argenté. Dessous du corps obsolètement et densément pointillé, noir, finement squamuleux, dernier segment de l'abdomen dénudé au milieu. Pattes médiocres, noires, squamuleuses de vert et parcimonieusement pubescentes de pâle. — Long. 7,5 à 10 — larg. 3,5 à 4 mill.

Asie mineure.

XIII. — STROPHOMORPHUS Seidl. N. Gen. (στροφῶς, *tour*; μόρφη, *forme*). S.-Gr^e Seidl. Berl. Ent. Zeit. 1867. 181.

Scrobes latérales s'évanouissant avant les yeux.

2^e segment abdominal subarqué en devant.

Corps garni de squamules rondes.

Antennes dépassant à peine la base du prothorax ; 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}.
Yeux très-saillants.

En faisant une nouvelle révision du genre *Strophosomus*, je me suis aperçu que le sous-genre *Strophomorphus* a les scrobes antennaires comme la 2^e division de nos *Otiiorhynchides*, et que même le *Strophosomus albarius* Reiche possède tous les caractères génériques du *Pholicodes breviusculus* Mars. La place naturelle de ces insectes est en effet entre *Epiphaneus* et *Pholicodes*. Ils se distinguent des *Pholicodes* par les yeux fortement saillants (ce qui les a fait prendre pour des *Strophosomus*), par le rostre très-large, rétréci peu à peu en avant et par le 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}; des *Epiphaneus* par les antennes beaucoup plus courtes.

Ce genre renferme en ce moment 3 espèces :

A Scrobes plus longues; écusson nul; antennes atteignant à peine la base du prothorax; articles 3 à 6 du funicule courts; élytres hérissées de longues soies dressées et couvertes de squamules serrées; yeux subacuminés, tournés un peu en arrière.

1. *porcellus* (hispidus) Bohm. F^s R^s

A' Scrobes très-courtes; écusson ponctiforme distinct; antennes dépassant un peu la base du prothorax; articles 3 à 6 du funicule un peu allongés.

B Yeux semi-globuleux, non dirigés en arrière; corps densément squamuleux, hérissé en dessus de courtes soies dressées.

2. *albarius* Reiche. G T

B' Yeux acuminés, dirigés en arrière; corps parcimonieusement squamuleux; vêtu en dessus de très-courtes soies à demi-couchées.

3. *breviusculus* Mars. Syr.

1. STROPH. PORCELLUS Bohm. Sch. Curc. 1 1833. 543, 26. — In. Ménét. Cat. Rais. 1832. 213, 959 (*Eucorynus*). — *hispidus* Bohm. Sch. 1 1833. 544, 27 (*Cneorhinus*). — v 884, 26 (*Strophosomus*).

Facès du *Cneorhinus faber*, mais de moitié plus grand, plus oblong.

Ovale-oblong, noir de poix, antennes et pattes ferrugineuses, couvert de squamules cendrées, parsemé d'une pubescence obscure, épaisse, dressée. Tête courte, large, épaisse, peu convexe, à points écartés. Yeux latéraux petits, arrondis, peu saillants. Rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais, peu arqué, plan, à points écartés, assez profonds. Antennes grêles, massue oblongue, acuminée. Prothorax beaucoup plus court que large, tronqué au bout, rétréci devant et derrière, dilaté-arrondi sur les côtés, légèrement bisinué à la base, médiocrement convexe, moins densément et profondément ponctué, couvert de squamules cendrées avec 3 lignes obscures assez larges, médiane droite, latérales un peu arquées. Ecusson à peine visible. Elytres ovales-oblongues, tronquées à la base et un peu plus larges que le prothorax, 2 fois plus longues que larges, dilatées dès la base, avec les épaules arrondies presque droites ensuite jusqu'au-delà du milieu, rétrécies rapidement et déclives par derrière, acuminées au bout, convexes, distinctement et régulièrement striées-ponctuées; interstries larges, presque plans; noires, couvertes de squamules cendrées, souvent marquetées de brun. Dessous obsolètement pointillé. Pattes médiocres; cuisses médiocrement en massue, inermes; jambes grêles, assez droites, un peu élargies au bout, à peine mucronées en dedans.

Var. *comatus* (Dej.) Bohm. Sch. Curc. v 1839. 884. Plus densément squamuleux, élytres variées de squamules blanches.

France méridionale; Sicile, Croatie, Dalmatie; Crimée, Caucase; Algérie.

Le nom spécifique de *porcellus* ayant été publié un an avant l'autre dans le catalogue raisonné de Ménétrès où Schœnherr a fait les *Cuscutionides*, on doit le conserver quoique Schœnherr ait préféré lui-même (v 1839. p. 884, 26) le nom d'*hispidus* qui d'ailleurs ferait double emploi.

2. STROPH. ALBARIUS Reiche, Soc. Ent. France 1857. 668 (*Strophosomus*). — *lineolatus* Fairm. Soc. Ent. France 1859. civ.

Très-voisin du *Strophosomus hispidus* Bohm. Sch., il en diffère par sa couleur, son rostre un peu plus étroit que

la tête, son prothorax un peu arrondi en arrière, ses élytres plus acuminées et surtout par l'absence des poils ou cils raides qui hérissent l'*hispidus*.

Oblong, noirâtre, couvert d'une squamosité blanchâtre, farineuse et d'une pubescence blanche. Tête large, peu convexe. Yeux ovales, à peine saillants. Rostre court, un peu moins large que la tête. Antennes d'un roux ferrugineux, grêles, dépassant la base du prothorax. Prothorax légèrement convexe, 2 fois aussi large que la tête, un tiers moins long que large, bien arrondi sur les côtés, un peu plus rétréci en avant qu'en arrière, un peu arrondi à la base. Elytres en ovale oblong, moitié plus larges que le prothorax et près de 3 fois plus longues, atténuées vers l'extrémité qui est un peu en pointe, striées-ponctuées; interstries plans. Dessous d'un brun de poix, couvert, avec les pattes, de squamules blanchâtres à l'exception de l'abdomen dont les 4 derniers segments sans squamules ont une villosité blanchâtre. — Long. 7,5 — larg. 3,5 mill.

Turquie, Peloponnèse.

3. STROPH. BREVIUSCULUS Mars. Ab. v 1868. 196 (*Pholicodes*).

Voisin du *murinus*, mais moins trapu, à rostre plus étroit, à prothorax plus rétréci à la base, à élytres plus longues et plus en pointe; la couleur foncière est aussi moins obscure.

Pyriforme, assez convexe, brun de poix, avec les antennes et les tarses plus ferrugineux, couvert de petites squamules blanches, marbrées de brun sur les élytres, avec de petits poils blancs couchés dans les intervalles. Tête assez grosse, un peu renflée au vertex, plane sur le front, qui va en s'amincissant vers le bout du rostre, profondément entaillé. Yeux petits, ovales, globuleux, saillants sur les côtés à quelque distance du prothorax. Scrobes étroites, en crochet par devant, s'élargissant et devenant moins profondes vers les yeux. Antennes longues, très-grêles; scape inséré un peu avant l'extrémité des scrobes, renflé au bout, atteignant au moins le bord du prothorax; funicule de 7 articles obconiques, 1^{er} un peu moins long que le 2^e, celui-ci de la longueur des 3 suivants ensemble,

3-7 égaux entre eux; massue de 4 articles, en ovale pointu. Prothorax beaucoup plus large que long, tronqué aux 2 bouts, arrondi sur les côtés, plus large à la base qu'en devant, avec un vestige brunâtre peu apparent d'une ligne médiane et d'une autre arquée de chaque côté. Ecusson petit, en triangle. Elytres obovales, tronquées à la base et un peu plus larges que le prothorax, plus de 4 fois plus longues, arrondies à l'épaule, courbées sur les côtés, fortement rabattues au bout et terminées en pointe sinueuse, arrondie; 9 stries ponctuées peu profondes, parallèles, 4-5 réunies au bout; interstries égaux, plans; le sutural plus étroit. Hanches antérieures et intermédiaires globuleuses, saillantes, les unes adossées, les autres étroitement séparées, postérieures ovales. Pattes peu épaisses; cuisses inermes, renflées avant l'extrémité. Abdomen de 5 segments, 1-2 longs, inégaux, 3-4 courts, dernier en triangle équilatéral. — Long. 10 — larg. 4,5 mill.

Syrie, Liban.

NOTA. — M. de Marseul fait mention d'un *Pholicodes murinus* Bohm. auquel le *breviusculus* doit ressembler. Si c'est le *Brachyderes murinus* Sch., je suis porté à croire qu'il n'appartient ni au genre actuel, ni au genre *Pholicodes*, parce qu'il indique dans la description les antennes aussi longues que la moitié du corps. Ne serait-ce pas un vrai *Brachyderes*?

XIV. — PHOLICODES (φολικώδης, *squamuleux*) Sch. Curc.

Disp. 1826. 186, 102. — II 527, 168°. — VII 229, 322°. — Lacd.

Gener. VI 203.

Ce genre se distingue des *Strophomorphus* par les yeux peu saillants, par le rostre rétréci et subparallèle à partir de la base et par le 2^e article funiculaire qui n'est pas plus long que le 1^{er}. Je ne connais en nature que l'*inauratus*.

Rostre plus long et presque aussi large que la tête, robuste, parallèle, subarrondi aux angles, plan ou légèrement convexe en dessus, fortement échancré en

triangle au bout; scrobes latérales profondes, assez courtes, un peu élargies et évanescents en arrière.

Antennes médianes, longues et peu robustes; scape épaissi au bout, légèrement arqué, empiétant à peine sur le prothorax; funicule à 1-2 articles allongés, obconiques, 3-7 courts de même forme, subégaux; massue oblongo-ovale, articulée.

Yeux médiocres, peu saillants, oblongo-ovales et longitudinaux.

Prothorax transversal, cylindrique, arrondi sur les côtés, tronqué à la base et en avant.

Ecusson très-petit, triangulaire.

Elytres médiocrement ou assez convexes, ovales, à peine plus larges que le prothorax et légèrement échancrées en arc à leur base, avec les épaules subrectilignes.

Pattes médiocres; cuisses en massue; jambes antérieures faiblement arquées à leur extrémité; tarses assez longs et médiocrement larges, spongieux en dessous, leur 4^e article assez grand.

2^e segment abdominal pas plus long que les 2 segments suivants réunis, séparé du 1^{er} par une suture presque droite; saillie intercoxale assez large, tronquée en avant.

Corps oblongo-ovale, faiblement écailleux et pubescent.
(Ex Lacd.).

Propre aux parties les plus orientales de l'Europe et à l'Asie; on en connaît 8 espèces, toutes de taille médiocre et revêtues d'une livrée d'un gris blanchâtre à reflets cuivreux, opalins ou dorés, plus ou moins vifs; la sculpture des élytres consiste en points souvent peu apparents.

1. PH. PLEBEJUS Bohm. Sch. Curc. II 1834. 527, 1.

Stature et taille du *Thylacites muricatus*.

Ovale-oblong, bronzé obscur, antennes testacées; squamuleux de cendré un peu métallique. Tête courte, large, finement ponctuée-rugueuse, plane en dessus, parsemée de squamules cendrées un peu métalliques. Yeux arrondis, médiocrement saillants, noirs. Rostre court, épais, à peine plus long mais un peu plus étroit que la tête, plan en dessus, finement ponctué-rugueux, échancré au bout, cilié. Antennes dépassant la base du prothorax, grêles,

testacées; massue allongée, acuminée, brunâtre. Prothorax pas plus long que large, tronqué aux 2 bouts, plus étroit par devant, dilaté-arrondi sur les côtés, avec les angles de la base un peu saillants, médiocrement convexe en dessus, bronzé-obscur, finement et densément ponctué-rugueux, couvert de squamules cendrées d'un éclat métallique; milieu du dos dénudé et de chaque côté une ligne obscure obsolète. Ecusson, petit, triangulaire. Elytres un peu plus larges en devant que la base du prothorax, arrondies aux épaules, infléchies sur les côtés, un peu dilatées derrière l'épaule, rétrécies vers le bout qui est en pointe, 4 fois plus longues que le prothorax, convexes en dessus, striées-ponctuées; interstries plans; parsemées entièrement de squamules serrées, cendrées d'un éclat métallique, tachetées d'autres obscures. Dessous noir de poix, pointillé, squamuleux de cendré; squamules denses sur les côtés de la poitrine, plus rares sur le ventre. Pattes médiocres, pubescentes de cendré; cuisses en massue. Tarses allongés, brun de poix, spongieux de fauve en dessous. (Ex Bohm.).

Caucase.

2. PH. TRIVIALIS Bohm. Sch. II 1834. 528, 2.

Ressemble beaucoup au précédent, quant à la structure et à la forme des parties, mais un peu plus petit, autrement coloré, et rostre un peu plus long.

Ovale-oblong, noir. Antennes testacées. Tête courte, large, avancée, finement ponctuée, rugueuse, parsemée de squamules cendrées. Yeux peu saillants, arrondis, noirs. Rostre un peu plus long et à peine plus étroit que la tête, ponctué-rugueux, plan en dessus, parsemé de squamules cendrées, échancré en triangle mais non largement au bout, cilié. Antennes un peu plus longues que la tête avec le prothorax, grêles, testacées; massue à peine plus obscure, ovale-allongée, acuminée, pubescente de cendré. Prothorax un peu plus court que large, tronqué devant et derrière, un peu plus étroit au bout, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, angles de la base un peu saillants, médiocrement convexe en dessus, finement

ponctué-rugueux, couvert de squamules cendrées, dénudé sur le milieu du dos. Ecusson petit, triangulaire. Elytres un peu plus larges en devant que la base du prothorax, avec les épaules arrondies, 4 fois plus longues que le prothorax, infléchies sur les côtés, un peu dilatées derrière l'épaule, acuminées au bout, convexes en dessus, distinctement mais non profondément striées-ponctuées, couvertes de toutes parts de squamules cendrées-unicolores serrées. Dessous pointillé, parsemé de squamules cendrées. Pattes médiocres, d'un bronzé obscur, parsemées de squamules cendrées et d'une pubescence grise. Tarses allongés, brun de poix, avec des brosses fauves en dessous. (Ex Bohm.).

Caucase.

3. PH. NUBICULOSUS Bohm. Sch. Curc. II 1834. 529, 3. — Fald. Transc. II 205, 432. Pl. 5, 6, et III 191.

Stature et taille de l'*Otiorynchus meridionalis*.

Subovale, noir, antennes ferrugineuses. Tête médiocre, épaisse, un peu luisante, assez densément mais peu profondément pointillée. Front plan, avec une canalicule mince, raccourcie. Yeux petits, ovales-oblongs, médiocrement saillants, bruns. Rostre presque de la longueur de la tête, mais plus étroit qu'elle, épais, peu arqué, noir, un peu luisant, plan en dessus, densément ponctué-rugueux, légèrement impressionné vers le bout, qui est échancré en triangle. Antennes insérées non loin de l'extrémité du rostre, atteignant à peine la base du prothorax, un peu menues, ferrugineuses, peu velues; massue ovale-oblongue, acuminée, pubescente de cendré. Prothorax un peu plus court que la largeur de sa base, tronqué au bout, plus étroit par dessus, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, subarrondi à la base, étroitement rebordé, peu convexe en devant, un peu luisant, assez densément, moins profondément pointillé partout, parsemé de rares squamules blanches. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres en devant un peu plus larges et 4 fois plus longues que le prothorax, avec les épaules arrondies, dilatées tout de suite après la base, vite rétrécies vers l'extrémité, infléchies sur les côtés, subacuminées ensemble au bout, peu

convexes sur le dos, déclives par derrière, noires un peu luisantes, distinctement striées-punctuées ; interstries plans, très-finement coriacés, moins densément parsemées de squamules obscures mêlées de blanc cendré, d'où elles paraissent marquetées. Dessous du corps densément pointillé. Pattes médiocres, robustes, noir de poix, pointillées, parcimonieusement garnies de pubescence cendrée ; cuisses en massue, mutiques ; jambes droites, antérieures en crochet au bout ; tarses d'un ferrugineux obscur, garnies en dessous de brosses fauves. (Ex Bohm.).

Perse.

4. PH. INAURATUS Bohm. Sch. Curc. 1833. 562, 8 (*Brachyderes*).
— VII 230, 4. — *Leucophæus* Sch. Disp. 1826. 103.

♂ Plus étroit, plus parcimonieusement squamuleux de cendré, prothorax plus étroit. — ♀ De moitié plus large, densément squamuleux de cendré et de cuivreux, prothorax plus large.

Faciès d'un *Otiornychus*, taille de l'*æneopunctatus*.

Ovale-oblong, noir, pubescent de gris, vêtu de squamules cendrées mêlées de cuivreuses. Tête courte, large, densément et finement ponctuée, couverte de peu de squamules d'un cendré d'argent, avec un éclat cuivreux dans un certain sens, et de poils gris. Front obsolètement canaliculé. Yeux oblongs, peu saillants, brun obscur. Rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, échancré au bout, plan en dessus, couleur, ponctuation, vestiture de la tête. Antennes un peu plus longues que la tête avec le prothorax, un peu grêles, brun de poix ; massue ovale-oblongue, acuminée. Prothorax un peu plus court que large, tronqué aux 2 bouts, plus étroit par devant, dilaté-arrondi sur les côtés, médiocrement convexe en dessus, finement rugueux-ponctué, garni de squamules cendrées et cuivreuses peu nombreuses, et de poils gris couchés. Ecusson très-petit, subtriangulaire. Elytres un peu plus larges par devant que le prothorax à la base et 4 fois plus longues que lui, ovales-oblongues, peu à peu dilatées après la base, très-convexes en dessus, finement striées-punctuées ; interstries granuleux ; couvertes de squamules, ou

cuivreuses et cendrées, ou cendré obscur, en outre parsemées d'une pubescence grise couchée. Dessous noir de poix, finement coriacé, parsemé de squamules blanc cendré, souvent métallique luisant à la poitrine. Pattes noires squamuleuses de cendré et pubescentes. Tarses de poix, garnis en dessous de brosses fauves. (Ex Bohm.).

Sibérie, Caucase; se trouve aussi en Europe, M. Becker l'ayant trouvé près de Beschtan.

5. PH. BELLUS. — *lepidopterus* Bohm. Sch. Curc. VII 1843. 230, 5.

Voisin du *Ph. inauratus*, mais plus oblong, rostre un peu déprimé vers l'extrémité, faiblement caréné; prothorax moins arrondi de chaque côté, élytres plus profondément striées-punctuées.

Oblong-elliptique, noir, assez densément parsemé de squamules cuivreuses. Tête large, épaisse, peu convexe en dessus, finement et densément ruguleuse, punctuée, parsemée de squamules d'un éclat cuivreux et d'une pubescence couchée, cendrée. Yeux petits, ovales-oblongs, médiocrement saillants, brun obscur. Rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais, presque droit, plan en dessus, un peu déprimé vers le bout, avec une faible carène longitudinale au milieu, couleur, ponctuation et vestiture de la tête, échancré en triangle au bout, cilié. Antennes insérées au milieu du rostre, dépassant la base du prothorax, menues, brun de poix, peu pubescentes de cendré; massue oblongue, acuminée. Prothorax un peu plus court que large à la base, tronqué aux 2 bouts, plus étroit par devant, un peu dilaté-arrondi sur les côtés, assez convexe en dessus, noir, luisant, finement et densément pointillé, parsemé de squamules d'un éclat cuivreux et d'une pubescence cendrée, couchée. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres oblongues, tronquées par derrière, un peu plus larges que la base du prothorax, dilatées obliquement à partir de la base, avec les épaules un peu arrondies, atténuées par derrière, acuminées ensemble au bout, 4 fois plus longues que le prothorax, convexes en dessus, déclives par derrière, régulièrement et assez profondément striées-punctuées; interstries plans, densément et

finement rugueux ; un peu luisantes, parsemées de squamules d'un éclat cuivreux, condensées en taches par ci par là. Dessous noir, finement et densément pointillé, plus densément parsemé de pubescence cendrée et peu de squamules cuivreuses. Pattes médiocres, robustes, noires, avec une pubescence grise et des squamules cuivreuses rares ; jambes grêles, droites, submutiques au bout ; tarses peu dilatés, garnis en dessous d'une brosse grise.

(Ex Bohm.).

Perse occidentale.

6. PH. SYRIACUS Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 231, 6.

♂ Plus petit, de moitié plus étroit ; élytres plus acuminées vers l'extrémité ; jambes antérieures arquées vers le bout. — ♀ Plus grand, de moitié plus large ; élytres moins rétrécies vers le bout.

Taille presque du *Brachyderes incanus*.

Oblong, noir, assez densément garni de squamules cuivreuses et d'une pubescence couchée, cendrée. Tête courte, épaisse, médiocrement convexe en dessus, finement et densément pointillée, un peu luisante, parsemée de squamules d'un éclat cuivreux, peu nombreuses, et d'une pubescence déprimée, cendrée, plus dense ; marquée entre les yeux d'un canal raccourci, très-fin. Yeux petits, ovales-oblongs, assez saillants, glauques ou bruns. Rostre de la longueur et presque de la largeur de la tête, épais, droit, plan en dessus, muni ♀ d'une petite carène raccourcie obsolete, un peu luisant, finement et densément pointillé, vêtu comme la tête. Antennes insérées plus près de l'extrémité du rostre, dépassant la base du prothorax, moins grêles, brun de poix, pubescentes de cendré ; massue oblongue, acuminée. Prothorax plus court que large à la base, subcylindrique, tronqué aux 2 bouts, un peu plus étroit par devant, presque droit sur les côtés, médiocrement convexe en dessus, finement et densément pointillé, garni de squamules cuivreuses, peu nombreuses sur le dos, plus serrées sur les côtés et en dessous. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres tronquées en devant, un peu plus larges que la base du prothorax, mais un peu élargies

après la base, avec les épaules à peine arrondies; infléchies sur les côtés, atténuées postérieurement surtout dans ♂, acuminées ensemble au bout, 3 fois plus longues que le prothorax, médiocrement convexes en dessus, déclives par derrière, régulièrement et finement striées-ponctuées; interstries plans, finement et densément alutacés; noires, assez luisantes, assez densément garnies de squamules cuivreuses et de pubescence cendrée couchée. Dessous noir, un peu luisant, finement pointillé, parsemé de squamules cuivreuses. Pattes médiocres, fortes, avec peu de squamules cuivreuses et de pubescence cendrée; cuisses en massue médiocre, mutiques; jambes grêles; tarses peu dilatés, garnis en dessous d'une brosse grise. (Ex Bohm.).

Syrie.

7. PH. MURINUS Bohm. Sch. Curc. v 1839. 934, 9 (*Brachyderes*).

Ressemble beaucoup au *Brachyderes incanus* ♀, à peine plus étroit mais plus court, il s'en distingue par son prothorax subcylindrique, non dilaté sur les côtés, plus convexe sur le dos, et par ses élytres évidemment striées-ponctuées.

Ovale-oblong, noir, moins densément vêtu de squamules rondes, cuivreuses. Antennes testacées. Tête large, épaisse, médiocrement convexe, densément pointillée, couverte de squamules d'un cuivreux brillant, moins serrées. Front creusé d'une fine canalicule très-courte. Yeux latéraux, arrondis, peu saillants, glauques. Rostre de la longueur et presque de la largeur de la tête, épais, presque droit, plan en dessus, échancré en triangle au bout, cilié, densément pointillé, assez densément squamuleux. Antennes de la longueur de la moitié du corps, menues, d'un testacé pâle, peu poilues; massue oblongue, acuminée, obscure. Prothorax plus court que large, tronqué aux 2 bouts, à peine plus étroit par devant et presque droit sur les côtés, médiocrement convexe en dessus, parsemé de points serrés; squamules d'un cuivreux brillant, moins serrées. Ecusson à peine visible. Elytres ovales-oblongues, tronquées en devant, un peu plus larges que

la base du prothorax avec les épaules subanguleuses ; dilatées bientôt sur les côtés, se rétrécissant après le milieu, terminées ensemble en pointe à l'extrémité, près de 4 fois plus longues que le prothorax, peu convexes sur le dos, déclives postérieurement, médiocrement striées-punctuées ; interstries plans, densément alutacés, avec des squamules assez serrées, d'un cuivreux brillant. Dessous finement coriacé, squamuleux de cuivreux. Pattes allongées, robustes, couvertes de squamules cuivreuses ; cuisses médiocrement en massue, mutiques ; jambes grêles, droites. (Ex Bohm.).

Arabie ?

XV. — APREPES (ἀπρεπής, *laid*) Sch. Curc. Mant. 2^a, p. 57.

Gr^e 310^a 1847. — Lacd. Gener Col. vi 202.

Tête un peu allongée, plane sur le front. Yeux assez grands, peu convexes, oblongo-ovales, acuminés en avant et obliques. Rostre plus court et un peu plus étroit que la tête, robuste, subparallèle, arrondi aux angles, plan en dessus, un peu déclive et faiblement échancré au bout. Scrobes latérales, subapicales, très-petites, ponctiformes.

Antennes subterminales, médiocres, assez robustes ; scape grossissant peu à peu, n'atteignant pas tout-à-fait le prothorax ; funicule à articles 1-2 allongés, obconiques, subégaux, 3-7 décroissant et devenant peu à peu subturbinés ; massue oblongo-ovale, acuminée, articulée.

Prothorax court, convexe, arrondi sur les côtés, légèrement sinué au milieu de sa base et de son bord antérieur. Ecusson triangulaire. Elytres assez convexes, régulièrement ovales, aiguës en arrière, un peu plus larges que le prothorax et faiblement échancrées à leur base, avec leurs épaules subcalleuses.

Pattes assez longues ; cuisses atténuées à leur base, en massue allongée, munies d'une petite dent en dessous ; jambes légèrement sinueuses au côté interne. Tarses assez longs, finement spongieux en dessous, à articles 1-2 étroits, 3 large, 4 long.

2^e segment abdominal presque aussi long que les 2 suivants réunis, séparé du 1^{er} par une suture arquée dans son milieu. Saillie intercoxale médiocrement large, rétrécie et tronquée en avant. Corps oblongo-ovale, revêtu de petites squamules piliformes.

Genre très-distinct par la structure du rostre, la petitesse de ses scrobes, les cuisses dentées, etc. Il a pour type une espèce que M. Lacordaire décrit en quelques mots qui, joints aux caractères génériques longuement décrits sur cette espèce, le font connaître suffisamment.

1. APR. SPLENDENS. — *micans* Sch. Curc. Mant. 2^a, 1847. 57. — Lard. Gener. Col. vi 1863. 203.

Un peu plus grand que l'*Aomus pubescens*, d'un beau vert uniforme et à élytres faiblement ponctuées en stries. Sibérie, Kolyvan.

XVI. — AOMUS Sch. Syn. Curc. ii 1834. 532, 170.

(*α priv.*; ὠμος, épaule).

Corps ovalaire, finement pubescent.

Tête transversalement convexe sur le vertex, déprimée sur le front. Yeux médiocres, peu convexes, oblongs, longitudinaux. Rostre séparé par un sillon transversal, plus court et plus étroit que la tête, robuste, légèrement élargi en avant, arrondi aux angles, plan en dessus, triangulairement impressionné et faiblement échancré au bout, avec les mâchoires très-grêles, découvertes en entier. Scrobes latérales, profondes, subrectilignes, s'arrêtant loin des yeux.

Antennes submédianes, longues, grêles; scape grossissant graduellement, empiétant un peu sur le prothorax; funicule à articles 1-2 très-allongés, 3-7 courts, obconiques; massue oblongo-ovale, acuminée, articulée.

Prothorax transversal, arrondi sur les côtés, tronqué en avant et à sa base. Ecuillon nul. Elytres médiocrement convexes, régulièrement ovalaires, arquées en arrière,

un peu plus larges que le prothorax et à peine échan-
crées à leur base, avec les épaules arrondies.

Pattes assez longues ; cuisses graduellement en massue ;
jambes droites ; tarsi assez longs, finement villeux en
dessous, à articles 1-2 étroits, 3 large, 4 assez long.

2^e segment abdominal à peine aussi long que les 2 sui-
vants réunis, séparé du 1^{er} par une suture arquée ;
saillie intercoxale médiocrement large, tronquée en
avant.

Facès du genre *Laparocerus*, mais structure des antennes
bien différente. Il est voisin également du genre *Omius*,
mais il a le rostre et les antennes autrement conformés.
Ses antennes sont celles des *Otiorynchus*, mais les ptéryges
du rostre ne sont pas divergentes. Il ne renferme qu'une
espèce propre à la Perse occidentale.

1. A. PUBESCENS Bohm. Sch. Curc. II 1834. 533, 1. — Fald. Transc.
II 209. Pl. 5, f. 1.

Taille de l'*Otiorynchus juvenis*.

Ovale-oblong, noir, un peu luisant, densément vêtu
d'une pubescence blanc-cendré couchée. Tête médiocre,
épaisse, densément parsemée d'une pubescence blanche.
Front plan. Yeux latéraux, subarrondis, peu saillants.
Rostre un peu plus court et plus étroit que la tête, épais,
étranglé à la base, peu arqué, plan, densément ponctué,
impressionné au bout, garni d'une épaisse pubescence
blanche, couchée. Antennes insérées vers l'extrémité du
rostre, dépassant la base du prothorax, assez menues, fer-
rugineuses, poilues ; massue ovale-oblongue, acuminée,
pubescente de gris. Prothorax à peine plus court que
large, tronqué aux 2 bouts, médiocrement dilaté-arrondi
sur les côtés, rétréci devant et derrière, convexe en des-
sus, assez densément ponctué, garni partout d'une pubes-
cence blanche couchée. Ecusson petit, triangulaire, pu-
bescent de cendré. Elytres un peu tronquées à la base, de
moitié plus larges en devant que le prothorax et 4 fois
plus longues, avec les épaules arrondies, rétrécies vers le
bout, terminées ensemble en pointe assez aiguë, médioc-
rement convexes en dessus, régulièrement et finement

striées-punctuées ; interstries larges, plans, très-finement alutacés ; d'un noir un peu luisant, toutes garnies d'une épaisse pubescence blanche couchée. Dessous luisant, finement pointillé, garni d'une faible pubescence cendrée. Pattes médiocres, pubescentes de cendré ; cuisses médiocrement renflées en massue, mutiques ; tarses couleur de poix, spongieux de fauve en dessous. — (Ex Sch.).

♂ Un peu plus petit et élytres beaucoup plus étroites.

♀ Elytres plus larges, subdéprimées postérieurement.

Perse.

XVII. — ELYTRODON (ἐλυτρον, *élytre*; ὀδὼς, *dent*) Schœnh.

Curc. Disp. Méth. 1826. 209, 116. — II 628, 178. — VII 404, 229.

— Laed. Gen. VI 197. — Seidl. Ot. 48, 25.

Corps oblong ou ovale, revêtu d'une pubescence couchée ou soyeuse.

Sous-menton muni d'un pédoncule saillant ; mâchoires découvertes.

Rostre vertical, un peu plus étroit que la tête et rarement séparé par un sillon transversal, robuste, légèrement atténué en devant, avec ses ptéryges assez fortement divariquées, anguleux, plan et finement canaliculé en dessus, faiblement échancré au bout ; scrobes courtes, profondes. Yeux médiocres, un peu saillants, subarrondis.

Antennes antérieures, de longueur variable, grêles ; scape en massue allongée au bout, empiétant un peu sur le prothorax ; funicule à articles 1-2 allongés, subégaux, 3-7 décroissant peu à peu ou subégaux ; massue oblongue, articulée.

Prothorax imparfaitement contigu aux élytres, transversal, fortement arrondi dans son milieu sur les côtés, tronqué aux 2 bouts. Ecusson distinct, petit, triangulaire. Elytres oblongues ou ovales, médiocrement convexes, subrectilignes et pas plus larges que le prothorax à leur base, avec les épaules arrondies.

2^e segment abdominal un peu plus long que chacun des 2 suivants, séparé du 1^{er} par une suture légèrement

anguleuse; saillie intercoxale large, tronquée en avant. Pattes médiocres; cuisses graduellement en massue, munies en dessous d'une forte dent, (sauf l'*inermis*); jambes antérieures légèrement sinuées en dedans, parfois arquées ♂; tarses de longueur variable, assez larges et spongieux en dessous, 4^e article médiocre.

♂ Généralement plus grand que ♀, plus svelte dans les espèces de forme allongée. Les élytres sont constamment inermes, tandis que dans plusieurs de celles-ci (*bidentatus*, *bispinus*) elles sont munies au commencement de la partie déclive d'un tubercule conique et aigu; dans certaines espèces ces tubercules manquent dans les 2 sexes (par ex. le *Chevrolati*).

Ce sont d'assez grands insectes, propres à l'Europe orientale et méridionale, ainsi qu'aux contrées orientales de l'Asie. Ils sont remarquables par leur livrée consistant en linéoles ou taches plus ou moins apparentes d'un noir soyeux sur un fond roux ou grisâtre.

On n'en a décrit que 4 espèces d'une grande rareté et peu connues. Schœnherr présume que *E. bispinus* et *bidentatus* sont identiques, et d'après les descriptions il n'y a entre elles d'autre différence que le rostre un peu plus long dans l'une que dans l'autre. Le ♂ de *E. bidentatus* est dépourvu d'apophyse conique et est plus étroit. La 3^e espèce de Schœnherr l'*inermis* se distingue par ses cuisses inermes, et le *Chevrolati* de Reiche par les élytres courtes et arrondies. Un individu que je regarde comme le *Sciaphilus giganteus* de Fairmaire, se rapporte à ce groupe, et doit, d'après la description, coïncider avec l'*Holcorhinus lanosimanus* Chevrl.

A Cuisses dentées.

B Cuisses antérieures armées d'une forte dent, postérieures d'une dent obtuse; scape plus court que le funicule; prothorax étroit. 5. *giganteus* Fairm. Alg.

B' Toutes les cuisses armées d'une forte dent; scape de la longueur du funicule, prothorax large, dilaté-arrondi sur les côtés.

C Elytres ovales-oblongues, ♀ armées au bout d'un tubercule conique. 2. *bidentatus* Stev. T R^s

C' Elytres en ovale court, inermes dans les 2 sexes.

1. *dicatus* (Chevrolati Reiche). Syr.

A' Cuisses mutiques.

B Front excavé entre les yeux; élytres striées de grands points. 4. *lanosimanus* Chevrol. Alg.

B' Front plan; élytres faiblement striées-ponctuées.

5. *imbellis* (inermis Bohm.) Eur^s.

Cette dernière espèce appartient peut-être au genre *Aomus*, ou l'*Aomus pubescens* doit se réunir aux *Elytrodon*.

1. ELYTR. DICATUS. — *Chevrolati* Reiche, Syr. 1858. 200, 225. Pl. 1, f. 4.

Ovale, noir de poix, vêtu d'une pubescence soyeuse et dense, blanc-jaunâtre, variée de brunâtre. Tête large, peu convexe. Yeux latéraux, peu saillants, presque ronds. Rostre aussi long que la tête, épais, aplati, criblé de petits points, avec un petit sillon longitudinal, court, entre les yeux, et une impression vers l'extrémité du rostre. Antennes roussâtres, atteignant la base du prothorax; scape légèrement courbé et en massue, atteignant le bord antérieur; articles 1-2 du funicule presque de même longueur, subcylindriques, 3 obconique, 4-7 transverses suborbiculaires; massue ovale-oblongue, non acuminée. Prothorax de moitié plus large que la tête, d'un tiers moins long que large, très-atténué en devant, dilaté-arrondi jusqu'au-delà du milieu, puis rétréci vers la base, qui est tronquée droit, peu convexe, orné dans son milieu d'une large bande longitudinale brunâtre, jaune pâle sur les côtés, brunâtre en dessous, criblé de très-petits points enfoncés, très-serrés. Ecusson en triangle aigu, allongé. Elytres ovales, ventrues, de la largeur du prothorax à la base, 2 fois plus larges au milieu, striées-ponctuées; interstries finement granulés, jaunâtres, avec des taches irrégulières brunâtres; extrémité sans tubercule. Dessous d'un gris pâle uniforme. Pattes roussâtres; cuisses fortement unidentées près de l'extrémité. — Long. 5,5 à 7,5 — larg. 2,8 à 4 mill.

Se place entre le *bispinus* et l'*imbellis*; il se distingue de l'*imbellis*, auquel il ressemble, par ses pattes armées, ses

élytres courtes ; la ♀ ne se distingue du ♂ que par une forme plus renflée.

Syrie, Naplouse.

2. ELYTR. BIDENTATUS Steven. Mus. Mosq. n 96. — Bohm. Sch. Cure. n 1834. 638, 1. — *bispinus* Sturm. Cat. 1826. 143. — Bohm. Sch. Cure. n 1834. 639, 2.

Oblong, densément pubescent de cendré ; toutes les cuisses fortement dentées ; scape de la longueur du funicule ; prothorax dilaté sur les côtés ; élytres oblongues, faiblement striées.

Taille du *Chlorophanus viridis*.

Tête médiocre, noir de poix, finement ponctuée-rugueuse, parsemée d'une pubescence couchée, gris-brun. Yeux latéraux, arrondis, saillants, noirs. Front avec un sillon étroit. Rostre plus étroit et à peine plus long, presque droit, épais, plan, avec une impression médiane vers l'extrémité ; couleur, ponctuation et vestiture comme dans la tête. Antennes insérées derrière le milieu du rostre, atteignant la base du prothorax, assez épaisses, noires, pubescentes de gris, articles 1 à 3 testacés à la base. Prothorax plus court que large, plus étroit et tronqué en devant, très-dilaté-arrondi sur les côtés, subbisiné à la base, angles un peu saillants, médiocrement convexe en dessus, noir de poix, finement ponctué-rugueux, avec une étroite carène, impressionné de chaque côté au milieu et par devant, parsemé d'une pubescence gris-brun. Ecusson petit, subtriangulaire, noir de poix. Elytres ovales-oblongues, presque plus étroites en devant que la base du prothorax, avec les épaules obliquement arrondies, infléchies sur les côtés, obtusément anguleuses avant l'extrémité, 5 fois plus longues que le prothorax, avec l'extrémité terminée en pointe, munies en haut un peu avant l'extrémité d'un grand tubercule épais, subconique, un peu convexes en dessus, noir de poix, régulièrement et finement striées-ponctuées ; interstries convexes, garnis d'une pubescence couchée, gris-brun. Dessous roux-ferrugineux, obsolètement pointillé, pubescent de gris. Pattes robustes roux de poix ; cuisses en massue, armées vers le bout d'une forte dent aiguë ; jambes comprimées, menues à la

base, antérieures anguleuses à l'extrémité en dedans ; tarses dilatés, d'un ferrugineux plus clair, garnis en dessous d'une brosse fauve. — Long. 9 à 11 mill.

♂ Plus grêle, élytres atténuées au bout.

♀ Ample, élytres armées près de l'extrémité d'un tubercule conique.

Crimée, Turquie, Hongrie, Grèce.

3. ELYT. GIGANTEUS Fairm. Soc. Ent. Fr. 1860. xxxi 2 1866. 58 (*Sciaphilus*).

Cuisses dentées, antérieures fortement, postérieures obsolètement, élytres simples au bout, interstries garnis de séries de soies, alternes un peu élevés.

Oblong, brun, assez densément pubescent de cendré. Antennes ainsi que les pattes roux de poix, avec la massue noirâtre à la base. Rostre marqué d'une impression au milieu. Prothorax subimpressionné transversalement, parsemé de gros points. Elytres comprimées latéralement, marquetées de gris, légèrement striées de gros points ; interstries alternes plus convexes. Abdomen fortement impressionné à la base. Cuisses antérieures armées d'une dent obtuse. — Long. 6 à 7,5 mill.

♂ Grêle, élytres de moitié plus larges que le prothorax, épauls non marquées, antennes plus longues.

♀ Ample, élytres 2 fois plus larges que le prothorax, épauls grandes, antennes plus courtes.

Le ♂ imite pas mal la figure d'un *Sciaphilus costulatus* ou *joncus*, ce qui m'a fait croire que c'est en effet le *Sciaphilus giganteus* Fairm. Sa diagnose ne s'y oppose pas, et ces mots : *sat dense cinereo-pubescent*, — *elytris cinereo-tessellatis*, s'appliquent exactement à notre insecte.

Oran.

4. ELYT. LANOSIMANUS Chev. Guer. Rev. Zool. 1860. 452, 58 (*Chærorhinus* et *Chærocephælus*).

Rugueux, d'un brun opaque, recouvert d'un poil gris, lanugineux, très-épais, incliné en arrière. Tête aplatie par devant, étroitement convexe sur le vertex, avec une impression ponctiforme au milieu. Antennes et pattes ferrugineuses. Prothorax légèrement convexe, presque

anguleux sur le devant des côtés, couvert de points excavés entremêlés de rides. Elytres marquées de 9 stries de points assez grands, presque carrés, à interstries alternes un peu élevés. Poitrine et abdomen avec des points assez gros et serrés. Jambes garnies en dedans vers l'extrémité et côtés des tarses de poils blancs. — Long. 6 — larg. 3,3 mill.

Je dois à l'obligeance de l'auteur d'avoir examiné le type de cette espèce, et j'ai pu m'assurer qu'elle appartient au genre actuel. La description cadre assez bien avec le type, mais les élytres ne sont pas « déhiscentes et bidentées » à l'extrémité, et les interstries alternes ne sont pas élevés.

Algérie, Blidah, sous une pierre.

M. Chevrolat avait formé avec cette petite espèce un genre sous le nom de *Chorrorhinus* (χοῖρος, porc; ῥῆν, museau) dont il a tracé les caractères suivants :

Tête large, étroitement convexe sur le vertex, aplatie, déprimée en avant, avec un point au milieu. Rostre plus court, épais, plan sur les 4 faces, renflé au sommet, avec une plaque oblique en avant, comme dans les *Coptorhinus*, marqué d'une carène en Y, échancré en angle au bout. Antennes insérées sur les côtés en avant du rostre; scape mince, subitement renflé au bout et dépassant le bord antérieur du prothorax; funicule de 7 articles, 1-2 allongés, coniques, égaux, du double plus longs que les suivants, 3-5 moniliformes, 6 et 7 lenticulaires, perfoliés et velus; massue assez forte, obovale-allongée, paraissant de 4 articles dont le 1^{er} luisant en occupe la moitié, les derniers revêtus d'une fine pubescence cendrée; scrobes cintrées sur le côté interne, à sommet au-dessus de l'insertion. Yeux étroits, oblongs, verticaux. Prothorax aussi haut que large, droit aux 2 bouts, presque anguleux près du bord antérieur, couvert de points excavés, entremêlés de plis rugueux. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres oblongues, régulièrement convexes et arrondies sur la déclivité postérieure, ayant le sommet de la suture faiblement déhiscent et bidenté. Pattes rapprochées, épaisses, velues; cuisses subitement renflées vers les 2/3, brève-

ment évasées au sommet interne ; jambes robustes, élargies et un peu crochues sur l'extrémité, presque droites. Tarses antérieurs à 1^{er} article triangulaire, épais, 2^e arrondi et transverse, à 3^e largement bilobé, à dernier grand, arqué ; crochets courts, soudés, échancrés au sommet ; corps brun, recouvert d'un poil lanugineux, épais et incliné en arrière.

5. ELYTR. IMBELLIS. — *inermis* Bohm. Sch. Curc. VII 1843. 404, 3.

Faciès et forme du *E. bidentatus*, mais 3 fois plus petit, s'en distingue aisément par ses élytres inermes au bout, ainsi que les cuisses.

Tête médiocre, épaisse, peu convexe, noir de poix, finement et densément ponctuée-ruguleuse. Rostre de la longueur de la tête, mais plus étroit, épais, peu arqué, plan, avec une impression longitudinale au milieu, ponctué et coloré comme la tête. Yeux latéraux, subarrondis, peu saillants, noirs. Antennes insérées au milieu du rostre, atteignant la base du prothorax, moins menues, ferrugineuses, peu densément pubescentes de gris ; massue oblongue, acuminée, plus claire au bout. Prothorax beaucoup plus court que large, tronqué et rétréci aux 2 bouts, très-dilaté-arrondi sur les côtés, médiocrement convexe, noir de poix, avec de gros points varioliques, moins serrés, avec les intervalles finement alutacés, parsemé de poils cendrés couchés. Ecusson petit, triangulaire, noir, à peine ponctué. Elytres ovales-oblongues, tronquées et à peine plus larges à la base que le prothorax, rétrécies vers le bout, avec les épaules arrondies, dilatées à partir de la base, rétrécies vers le bout, subcomprimées, subacuminées ensemble, convexes en dessus, déclives par derrière, noir de poix, bordées de ferrugineux, régulièrement mais moins profondément ponctuées-striées ; interstries un peu convexes, très-finement coriacées, vêtues assez densément d'une pubescence couchée, cendrée, plus condensée par ci par là. Dessous d'un ferrugineux obscur, densément et obsolètement pointillé, peu pubescent de gris. Pattes allongées, robustes, ferrugineuses, finement pointillées et pubescentes de cendré ; cuisses en massue,

mutiques, plus obscures; jambes grêles, minces à la base, un peu arquées, dilatées angulairement en dedans vers le bout; tarses dilatés, garnis en dessous de brosses fauves.

Europe méridionale.

NOTA. — Peut-être est-ce un *Aomus*? Peut-être aussi ce dernier genre doit-il se réunir aux *Elytrodon*?

XVIII. — BUBALOCEPHALUS (βούβαλος, *bufle*; κεφαλή, *tête*)

Capim. Soc. Ent. Fr. 1867. p. 485, 405. — Seidl. 49, 26.

Scrobes latérales, oblitérées par derrière, n'atteignant pas les yeux.

Rostre assez grêle, plus étroit que la tête.

Yeux arrondis.

Antennes allongées; scape dépassant les yeux.

Corps garni de squamules bifides, piliformes.

2^e segment de l'abdomen séparé du 1^{er} par une suture anguleuse; appendice intercoxal large, tronqué.

Cuisses mutiques; 4^e article des tarses très-long.

Ongles grands, libres.

Très-voisin du genre *Elytrodon* dont il se distingue principalement par la suture anguleuse entre le 1^{er} et le 2^e segments de l'abdomen, et ses ongles grands et libres.

Ce genre renferme 2 espèces qui pourraient bien n'en faire qu'une; mais peut-être l'*Elyt. inermis* en fait-il partie.

♂ Plus petit et presque de moitié moins large des élytres que ♀, rostre bien plus étroit; antennes plus grêles, plus allongées; scape dépassant manifestement le bord supérieur des yeux, tandis qu'il l'atteint seulement ♀; dernier segment de l'abdomen plus grand, 3 à 4 au contraire plus courts; ponctuation des stries plus profonde; pattes plus grêles, plus allongées; jambes antérieures visiblement sinueuses et recourbées en dedans avant l'extrémité.

1. BUB. BISON. — *Kiesenwetteri* Capiom. Soc. Ent. Fr. 1867. 488,
2. — Seidl. p. 50.

Le *B. bison* ressemble d'une manière frappante à un *Phytonomus*, avec lesquels il vit en société sur la Sierra Nevada et dans de semblables conditions. Il s'en éloigne par ses yeux non transverses et déprimés, mais arrondis et saillants, et le scape des antennes les dépassant par derrière.

Ovale, noir, garni de squamules piliformes et d'une pubescence couchées, obscures, mêlées de soies grises. Tête très-convexe et large. Rostre plus étroit et plus court qu'elle et assez arrondi. Prothorax fortement rétréci à la base, presque plus qu'au bout, très-fortement dilaté-arrondi sur les côtés. Elytres en ovale court, avec les épaules tout arrondies, arrondies par derrière, distinctement ponctuées-striées. Toute la surface garnie de squamules bifides piliformes, comme dans quelques *Phytonomus* et dans le *Platytarsus setulosus*, et en outre rudement parsemées de soies ou poils demi-dressés. Pattes proportionnellement longues; cuisses inermes; tarses assez larges, 4^e article surtout long, plus long que les 3 1^{ers} ensemble et terminé par 2 grands ongles libres. — Long. 5 à 6,5 — larg. 2,5 à 3 mill.

NOTA. — Les squamules sont bifides.

Espagne, Sierra-Nevada, sous les pierres, près des neiges.

2. BUB. ROTUNDICOLLIS Capiom. Soc. Ent. France, 1867. 486. 1.

Ovale, noir, vêtu de squamules piliformes cendrées et de soies blanches. Tête grosse, arrondie, convexe, finement pointillée, avec des poils blanc-cendré, couchés. Rostre plus court que la tête, large, épais, anguleux, déprimé transversalement à la base, plan, déclive au bout, ruguleusement ponctué, hérissé de poils cendrés plus nombreux à la base; fossette interoculaire très-petite; sillon médian assez long, mal limité. Yeux ronds, médiocres, très-saillants. Antennes assez longues, d'un ferrugineux clair; scape dépassant le sommet des yeux; 1^{er} article du funicule plus grand que le 2^e, celui-ci un peu

moins long que les 2 suivants réunis, les derniers à peine aussi longs que larges, diminuant de longueur; massue oblongue, acuminée, à pubescence rare, grisâtre. Prothorax plus court que large, en ovale transverse, presque aussi rétréci en devant qu'à la base et tronqué aux 2 bouts, très-convexe et densément ponctué, assez densément pubescent de cendré. Ecusson visible, arrondi, pubescent. Elytres régulièrement ovales, à peine plus larges à la base que le prothorax, plus de 3 fois plus longues que lui, arrondies à l'épaule, fort dilatées sur les côtés jusqu'au milieu, rétrécies ensuite graduellement jusqu'à l'extrémité qui est en pointe obtuse, convexes, déclives par derrière, fortement ponctuées-striées; interstries légèrement convexes, très-finement chagrinés; recouvertes de squamules piliformes cendrées et notées sur les interstries alternes de taches brunes et blanchâtres assez espacées; on remarque des soies blanchâtres pas très-longues, mi-dressées, assez rapprochées sur la tête, la base et les côtés du prothorax, plus espacés sur les élytres. Dessous garni de poils cendrés. Abdomen chagriné, dernier segment transversalement impressionné au milieu. Pattes assez grandes, robustes, pubescentes de blanc-grisâtre; cuisses en massue; jambes médiocres; tarses dilatés, d'un ferrugineux obscur; crochets médiocres. — Long. 8 — larg. 4,5 mill.

Espagne méridionale.

Sa taille, sa couleur, son front moins bombé, ses interstries à peine convexes, etc., le font aisément distinguer du *bison*.

NOTA. — Cette espèce m'est inconnue; M. Capiomont ne dit rien de la forme des squamules qui sont probablement bifides.

XIX. — ANEMOPHILUS (ἀνεμος, *vent*; φίλος, *ami*) Wollast.

Ins. Mader. 1854. 385. Pl. v, f. 7, 9.

Corps ovale, finement pubescent.

Yeux très-petits, arrondis, déprimés. Rostre notablement

plus court que la tête, robuste, parallèle ou faiblement atténué en avant, anguleux, plan en dessus, et entier au bout; scrobes latérales très-courtes.

Antennes terminales médiocres, peu robustes; scape plus ou moins arqué, en massue au bout, empiétant un peu sur le prothorax, funicule à 1^{er} article beaucoup plus gros et plus long que les suivants, obconique, 2^e plus court, subcylindrique, 3-7 très-courts et très-serres; massue forte, ovale, faiblement articulée.

Prothorax assez court, convexe, arrondi sur les côtés et un peu moins à sa base, coupé carrément en avant. Ecusson tantôt à peine, tantôt assez distinct. Elytres assez convexes, régulièrement ovales, pas plus larges que le prothorax et échancrées en arc à leur base.

Pattes courtes; cuisses en massue; jambes antérieures plus ou moins épaissies au bout, les postérieures dilatées à leur extrémité, avec leurs angles interne et externe aigus. Tarses des *Scoliocerus* (Cathormiocerus).

Ce genre, propre à Madère, est très-voisin de ces derniers, mais son faciès est fort différent, ce qui est dû à la forme plus courte, plus convexe et plus ovale de ces insectes, à leur prothorax autrement fait et non débordé par les élytres, et à leur vestiture, qui consiste en poils très-fins, courts et caducs. Ils ont une analogie bien marquée avec certains *Laparocerus* madériens, mais la structure de leurs antennes suffit pour montrer qu'ils n'appartiennent pas au même groupe.

Ils vivent sous les pierres, dans les endroits les plus arides, ou parmi les lichens qui croissent dans les crevasses des rochers.

On n'en compte que 3 espèces.

A Jambes très-dilatées au bout; antérieures un peu prolongées à l'angle externe. Scape des antennes légèrement courbé. Ecusson très-petit, ponctiforme.

1. A. CRASSUS Wollast. Mader. 1854. 386, 295. Pl. VII f. 7. — Cat. Mad. 117, 341. — Col. Atlant. 326, 908.

Court, ovale-arrondi, convexe, noir-brunâtre ou d'un

brun entièrement ferrugineux, moins densément vêtu d'une pubescence excessivement fine, couchée et un peu cendrée, qui, vue de côté, présente un reflet cuivreux. Rostre très-court et épais, fort atténué vers le bout. Yeux très-petits et déprimés. Prothorax convexe, régulièrement et fortement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, rugueux et peu distinctement ponctué. Ecusson extrêmement petit et ponctiforme. Elytres convexes, surtout après le milieu, et très-brusquement rétrécies ou rabattues vers le bout; très-légèrement ponctuées-striées sans la plus petite trace de poils ou de soies, avec les interstries alternes non marquetés. Antennes et tarses (et quelquefois les jambes entières) d'un ferrugineux brunâtre, celles-ci considérablement dilatées, avec les 2 angles apicaux presque également prolongés. — Long. 3,5 à 4 mill.

Cette espèce ressemble au *subtessellatus* par son écusson très-petit, ponctiforme, et par la courbure de son scape, elle en diffère par son corps plus court et plus renflé, par sa surface moins obscure et beaucoup plus densément pubescente, par ses antennes plus courtes et par l'absence de poils et de marqueteries sur les élytres, ses jambes sont beaucoup plus dilatées au bout, et les antérieures, au lieu d'être un peu arrondies, sont légèrement prolongées à leur angle externe.

Se trouve sous les pierres, dans les fissures des roches et parmi les lichens qui y naissent, commun en hiver et au printemps; Pic d'Anna Ferreira à Porto-Santo.

A' Jambes moins dilatées au bout, antérieures subtronquées à l'angle externe.

B Scape des antennes légèrement courbé; écusson très-petit, ponctiforme.

2. A. SUBTESSELLATUS Wollast. Mader. 1854. 387, 296. — Cat. Mad. 117, 342. — Col. Atl. 326, 909.

Ovale, mais pas tout-à-fait aussi rond ou aussi convexe que le *crassus*; aussi d'une teinte plus obscure et moins ferrugineuse et plus densément velu; la pubescence étant d'une couleur beaucoup plus vert-jaunâtre. Rostre,

prothorax et écusson comme dans cet insecte, si ce n'est que le 1^{er} est peut-être un peu plus long et le 2^e pas aussi convexe ou aussi large au milieu. Les yeux pas tout-à-fait aussi petits et un peu plus proéminents. Elytres moins convexes que dans celui-ci et pas si brusquement raccourcies par derrière, très-légèrement striées-punctuées, densément garnies sur toute leur surface de soies extrêmement petites (quoique fortes), qui dans quelques individus ne sont visibles que vues de côté, avec les interstries alternes obtusément marquetés en échiquier surtout par derrière. Antennes et pattes comme dans cette espèce, si ce n'est que celles de devant sont un peu plus longues et les dernières ont les jambes beaucoup moins dilatées à leur extrémité, l'angle apical externe moins saillant. — Long. 3 à 3,6 mill.

Avec le précédent et aussi abondant à Porto-Santo (Pic d'Anna Ferreira), depuis l'automne jusqu'au premier printemps, dans les lichens qui naissent dans les fissures des rochers ; rarement sous les pierres.

B' Scape des antennes très-courbé ; écusson distinct, triangulaire.

3. A. TROSSULUS Wollast. Mader. 1854. 388, 297. Pl. vii f. 9. — Cat. Mad. 117, 343. — Col. Atl. 327. 910.

Ovale et convexe, mais beaucoup plus oblong et plus parallèle que nul des précédents, d'un cuivreux de poix et luisant (en particulier sur les élytres), moins rarement vêtu d'une pubescence très-robuste, couchée, d'un cendré cuivreux ou jaunâtre. Rostre beaucoup plus large au bout, que dans aucune des autres espèces ; yeux un peu plus larges et plus saillants. Prothorax régulièrement et presque également arrondi sur les côtés, profondément punctué, points grands et oblongs, entremêlés de petits ronds. Ecusson beaucoup plus grand que dans les autres espèces et triangulaire. Elytres subparallèles vers la base et arrondies par derrière ; avec des points superficiels sur toute la surface, quelques-uns ayant une tendance, à peine sensible, à former des raies longitudinales, parsemées, comme le prothorax, de poils mous, dressés, peu

épais, avec les interstries alternes visiblement non marquetés. Antennes courtes avec leur scape fort-courbé; d'un ferrugineux brunâtre-foncé, funicule généralement plus obscur. Pattes ferrugineuses avec les 4 jambes postérieures légèrement dilatées au bout, et celles de devant avec l'angle apical externe arrondi. — Long. 3 à 3,5 mill.

S'éloigne des autres espèces et par sa forme plus petite et plus oblongue, son rostre moins acuminé, et par son écusson grand et triangulaire, sa surface luisante cuivreuse (avec des vestiges de poils dressés), son prothorax profondément ponctué et ses élytres à peine visiblement striées. Il diffère peu pour la forme des antennes et des pattes.

Ne vit pas aux dépens des lichens, mais se trouve sous les pierres, dans les lieux de plaines et peu élevés. — Campo de Baxo, Porto-Santo.

XX. — LICHENOPHAGUS (λιχην, *lichen*; φαγεῖν, *manger*)

Wollst. Mader. 1854. 389. Pl. viii f. 1 et 3.

Corps oblong, finement pubescent en dessous, à peine convexe, couvert de squamules très-serrées et variées. Yeux petits, arrondis, peu saillants.

Rostre aussi large et à peine plus long que la tête, épais, parallèle, anguleux, plan en dessus et faiblement échancré au bout.

Scrobes latérales, profondes en devant, superficielles en arrière, atteignant presque les yeux.

Antennes terminales, médiocres, peu robustes; scape très-grêle à sa base, en massue allongée au bout, fortement arqué, empiétant un peu sur le prothorax; funicules à articles obconiques: 1-2 allongés, celui-là plus long et plus gros; 3-7 très-courts, décroissants peu à peu; massue assez forte, ovale, acuminée, articulée.

Prothorax aussi long que large, subcylindrique, largement saillant en avant, tronqué à sa base. Ecusson nul.

Elytres médiocrement convexes, régulièrement oblongo-ovales, pas plus larges que le prothorax, et échancrées en arc à leur base.

Pattes médiocres; cuisses graduellement en massue; jambes droites avec leur angle interne un peu saillant; tarses courts, étroits, finement villeux en dessous, à article 3 un peu plus large que 1-2, 4 médiocre.

2^e segment abdominal presque aussi long que les 2 suivants réunis, séparé du 1^{er} par une suture arquée; saillie intercoxale médiocrement large, tronquée en en avant.

Ces insectes ressemblent à des *Trachyplaus* de forme allongée, mais ils s'en distinguent très-bien par leurs antennes, les crochets de leurs tarses et la saillie intercoxale moins large.

M. Wollaston, qui a créé ce genre dans ses *Insecta maderensia* en 1834, n'en connaissait alors que 2 espèces, *frutillus* et *acuminatus*, qui n'est peut-être, selon lui, qu'une variété locale du premier. Dans son *Catalogue des Coléoptères des Canaries*, il en a décrit 6 autres, et enfin 1 remarquable dans l'Appendice à ses *Coléoptères des îles Atlantides*.

§ 1. — Corps assez petit, yeux petits, arrondis, saillants. 2^e article du funicule un peu plus court que le 1^{er} (*Lichenoph.* propres.

1. L. FRITILLUS Wollst. Ins. Mader. 1854. 390, 298 pl. viii f. 1.

Ovale-allongé, d'un noir brunâtre ou ferrugineux, très-densément vêtu de squamules brunâtre-pâle ou cendré-brunâtre, aplaties, étroitement serrées. Rostre large, sub-parallèle à peine atténué vers le bout. Antennes à scape d'un brunâtre de poix foncé; funicule et massue ordinairement un peu plus larges. Prothorax arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur aussitôt après le milieu; plus prolongé en devant; profondément ponctué, et plus ou moins varié avec des squamules cendrées et brunes. Elytres un peu convexes (et d'ordinaire un peu élargies) au-delà du milieu, soudainement rétrécies vers le bout; striées-ponctuées; interstries alternes en général très-distinctement et joliment tachetées de taches squamuleuses plus pâles et plus obscures. Pattes plus ou moins brunâtres de poix. — Long. 4,6 mill.

Porto-Sancto, assez commun dans les régions montagneuses parmi les lichens croissant dans les fissures des rochers, en hiver et au printemps très-abondant sur le pic d'Anna-Ferreira.

Diffère de l'*acuminatus* par sa forme ovale, sa surface plus pâle, plus profondément sculptée, et en général joliment marquée.

2. L. ACUMINATUS Wollst. Ins. Mader. 1854. 391, 299. Pl. viii f. 3.

Plus svelte que le *fritillus*, moins ovale, étant plus parallèle et oblong; aussi d'une couleur plus obscure et d'un brun plus ferrugineux, étant moins varié de squamules plus pâles et plus foncées; densément garni sur toute sa surface de soies courtes, fortes et dressées, lesquelles sont plus longues et plus visibles sur les élytres que sur le prothorax. Rostre et prothorax comme dans celui-ci, excepté qu'ils ne sont pas tout-à-fait aussi profondément ponctués, et que la plus grande largeur est peut-être plus exactement au milieu. Elytres beaucoup moins profondément striées-ponctuées, plus parallèles à la base et moins rétrécies par derrière, l'extrémité étant proportionnellement avancée ou acuminée; les interstries alternes beaucoup moins marqués, paraissant presque de la même couleur que le reste de la surface. Antennes et pattes comme dans le *fritillus*, si ce n'est que les dernières sont un peu plus longues, avec les tarses d'un testacé plus obscur ou ferrugineux. — Long. 4,6 mill.

Deserta-Grande, sous les pierres, sur les hauts sommets, à l'extrémité nord de l'île. Il pourrait n'être qu'une forme insulaire du *fritillus*.

§ 2. *aberrants*. — Corps plus grand, yeux petits, ovales, déprimés; 2^e article du funicule plus au moins distinctement plus long que le 1^{er}.

3. L. AUCTUS Wollst. Cat. Canar. 1864. 363, 561.

Très-densément et obscurément marqué de squamules très-petites, d'un noir sombre et d'un cendré obscur sub-métallique, mais dépourvu presque de soies. Yeux petits, déprimés; rostre largement concave, avec une étroite canalicule bien accusée, plus pâle en devant. Prothorax assez court, fortement arrondi sur les côtés, bien mais à

peine grossièrement ponctué, obscurément et irrégulièrement marqué de 3 lignes pâles, muni à la base d'une carène médiane, lisse, très-courte. Elytres un peu ovales-allongées (subarrondies chacune à la base et brusquement recourbées par derrière); suture et interstries marquetés de pâle. Antennes courtes, scape épais, robuste; 2^e article du funicule renflé, plus grand que le 1^{er}; les autres très-courts, moniliformes, subégaux. — Long. 5,4 à 5,7 mill.

En dehors de quelques différences plus légères, *auctus* est remarquable par son 2^e article du funicule proportionnellement renflé, — qui est un peu plus grand que le 1^{er} (non-seulement en longueur mais encore en largeur), tandis que les autres articles sont excessivement courts, subégaux et moniliformes. On peut le reconnaître aussi à son prothorax plus court, fortement arrondi sur les côtés, avec des points bien nets, mais pas très-grands, et avec des rudiments d'une crête glabre médiane tout-à-fait à la base; à ses élytres (pas très-grossièrement striées-ponctuées), de forme ovulaire (c'est-à-dire un peu rétrécies en devant, avec les épaules bien effacées, brusquement arquées au bout et arrondies séparément le long de leur base); aux soies couvrant toute sa surface qui sont si petites qu'on ne les aperçoit qu'à un fort grossissement; à ses antennes raccourcies, avec le scape pas très-courbé.

Hierro, recueilli sous les pierres, en petit nombre, en février, à mi-côte, entre la ville Valverde et la mer.

4. L. TESSERULA Wollst. Cat. Canar. 1864 364, 562.

Semblable au précédent, mais d'ordinaire bien plus gentilletement marqueté et garni de soies courtes, mais devenant peu à peu plus longues. Rostre plus pâle non-seulement au bout mais dans toute son étendue. Antennes à peine plus longues, scape plus arqué, et plus robuste à la base, funicule plus grêle, 2^e article plus étroit que le 1^{er}, les autres courts (mais pas très-courts). Prothorax un peu plus long, moins arrondi sur les côtés, ponctué de grands points plus profonds, sans carène médiane même à sa base. Elytres un peu plus oblongues, plus droites sur les côtés, échancrées à la base, peu dilatées obliquement à

l'épaule et moins brusquement rétrécies par derrière. — Long. 5,3 à 6 mill.

Diffère de l'*auctus* par ses mouchetures plus éclatantes, les soies raides et très-visibles (quoique courtes), qui le couvrent tout entier ; son prothorax plus grossièrement ponctué, un peu plus long, moins arrondi sur les côtés, et dépourvu de crête glabre courte, qui est si bien marquée dans celui-ci ; par ses élytres plus oblongues (ou un peu plus étroites sur les côtés avec les épaules plus saillantes mais obliquement tronquées et légèrement échancrées ensemble le long de la base), plus profondément striées-ponctuées, et plus étendues vers l'extrémité ; par ses antennes peut-être un peu plus longues, avec le scape encore plus épais et plus courbé, et leur funicule plus menu ; le 2^e article distinctement plus étroit que le 1^{er}, et les autres un peu moins moniliformes.

Répandu dans le nord de Ténériffe, en hiver et surtout au printemps, à une élévation de 3,000 pieds au-dessus du niveau de la mer ; très-abondant, par places, sous les pierres.

5. *L. PERSIMILIS* Wollst. Cat. Canar. 1864. 365, 563.

Ressemble tellement au *tesserula* que je l'ai regardé longtemps comme une de ses variétés ; cependant ses antennes sont toujours plus longues et leur scape distinctement plus grêle. Il est un peu plus grand et couvert de squamules d'une couleur plus pâle. En outre, il n'est pas confiné dans un seul district, ni même dans une seule île, mais on le trouve à la fois dans les îles de Ténériffe et de Palma. On rencontre, dans cette dernière, une variété (*seriesetosa*) à élytres parsemées de squamules plus longues et plus pâles, alignées longitudinalement. — Long. 5,8 à 7 mill.

Trouvé en grand nombre, en mai, sous les pierres, à Ycod el Alto (Ténériffe), et la variété, quoique moins abondante, au-dessus de Santa-Cruz (Palma).

6. *L. SUBNODOSUS* Wollst. Cat. Canar. 1864. 366, 564.

On peut le reconnaître à ses élytres parsemées de soies un peu allongées et très-fortes (souvent presque en masse), à interstries plus ou moins élevés et interrompus,

de manière à former des nodules plus ou moins grands. Il ressemble, en ces deux points, à l'*impressicollis*. A ces caractères très-saillants, on peut en ajouter d'autres en dehors des différences sexuelles que présentent ses jambes. Il varie beaucoup pour la couleur de ses squamules; les individus sont généralement d'un brun foncé uniforme; d'autres plus développés ont souvent une teinte cendré-obscur (et occasionnellement jaunâtre ou légèrement métallique) avec la région suturale et quelquefois la latérale plus pâle.

Les exemplaires récoltés à Hierro, sur les collines qui dominent la ville de Valverde, ont les soies beaucoup plus courtes que ceux de Ténériffe. J'en ai fait une variété sous le nom de *subcalva*; je n'ai pu y constater aucune différence sexuelle dans les jambes. — Long. 5,8 à 7 mill.

Largement répandu dans les districts couverts de bois; je l'ai pris dans les montagnes couvertes de lauriers au-dessus de Taganana, à Las Mercedes, la Esperanza, la Agua Garcia et Agua Mansa.

7. L. SCULPTIPENNIS Wollast. Cat. Canar. 1864. 367, 565.

Intermédiaire entre *subnodosus* et *impressicollis* sous certains rapports; il se distingue à première vue de l'un et de l'autre, sans compter d'autres caractères de moindre valeur, par la grosseur de sa ponctuation (les points des stries très-grands, presque confluent et comme serrés). Il ressemble bien plus au 1^{er} qu'au 2^e par sa forme et sa couleur, le devant de la tête moins profondément excavé, son prothorax sans impression, et ses soies plus courtes, mais il s'en éloigne beaucoup par sa sculpture plus grossière et ses nœuds plus élevés, joints à ses antennes et à son rostre un peu plus longs. — Long. 4 à 7 mill.

Quelques individus, d'une taille plus petite, ont les élytres un peu moins fortement sculptées. Ils pourraient ne constituer qu'une variété locale du *subnodosus*, dont ils ne diffèrent que par les stries des élytres plus grossièrement ponctuées.

Habite Palma, où je l'ai trouvé, en juin 1858, assez rarement, à des hauteurs moyennes, dans le Barranco, au-dessus de Santa-Cruz, ainsi que dans les bois de lauriers sur la côte de Cumbre, au-dessus de Buenavista.

8. *L. FOSSICOLLIS*. — *impressicollis* Wollast. Cat. Canar. 1864. 368, 566.

Très-voisin de *L. subnodosus* et de *sculptipennis*, mais d'ordinaire un peu plus grand et plus noirâtre ; sa surface un peu plus obscure est souvent, dans les individus frais et bien colorés, ornée de quelques petits traits de squamules blanc de neige, particulièrement aux épaules et transversalement sur le disque postérieur des élytres, où ils prennent la forme d'une fascie transverse interrompue ; il se distingue bien, en outre, par le devant de la tête, ou plus exactement la base du rostre, très-largement et profondément concave ; par son prothorax (distinctement plus étroit à la base et très-profondément ponctué) inégal (c'est-à-dire avec une large et un peu superficielle impression le long de la partie antérieure du disque, qui est graduellement rétrécie postérieurement et de chaque côté vers le milieu une fovéole plus obscure et arrondie), et par ses élytres comparativement carrées, beaucoup plus larges aux épaules que le prothorax, avec leurs nœuds très-développés, et garnis de très-longues soies peu nombreuses. Il est un peu plus large qu'aucun autre *Lichenophagus*.

Une autre particularité distingue encore cette espèce : c'est la seule en qui j'aie découvert quelques différences sexuelles, dans les jambes antérieures. Ces jambes ♂ sont garnis en dedans de très-petits denticules et distinctement sinuées ou un peu échancrées vers le bout, tandis que dans la ♀ elles sont non-seulement un peu plus larges et moins visiblement échancrées ou sinuées, mais encore glabres inermes et d'un roux ferrugineux en dedans. — Long. 5,6 à 7 mill.

Varie par ses élytres ornées de squamules blanc de neige vers les épaules et par la fascie au-delà du milieu très-interrompue et plus ou moins obsolète.

Insecte éminemment forestier ; je ne l'ai trouvé que dans les forêts de lauriers, sur les montagnes du nord-est de Ténériffe, à Las Mercedes, Taganana, et vers Point-Anaga, sous les pierres et les troncs de bois pourris dans les lieux humides et ombragés.

9. LICH. BUCCATOR Wollast. Col. Atlant. 1865. 332, 923. — App. 54.

C'est l'espèce la plus remarquable du genre ; sa taille gigantesque, ses élytres en ellipse renflées (fort élargies au milieu et très-rétrécies devant et derrière) ; ses antennes plus grêles et les ptéryges fortement divariquées, lui donnent un faciès qui lui est propre. Ses différences sexuelles sont aussi plus tranchées que dans aucune autre ; le ♂ a les pattes plus épaisses et les jambes plus courbées au bout ; la ♀ présente au milieu du prothorax une carène très-raccourcie, très-obtuse et terminée brusquement. Très-densément couvert de squamules très-petites brunes ou d'un cendré obscur, presque dépourvu de soies, opaque sous les squamules. Antennes allongées, grêles, d'un testacé de poix. Rostre légèrement concave, mais nettement canaliculé, muni au bout de ptéryges largement divariquées. Yeux déprimés. Prothorax court, très-arrondi sur les côtés, à points épars, avec des lignes cendrées de chaque côté, ainsi qu'au milieu, plus ou moins obscures, parfois obsolètes. Elytres convexes, renflées, ovales-elliptiques, fortement et également arrondies sur les côtés (graduellement très-rétrécies par devant, striées-punctuées ; interstries alternes plus ou moins distinctement marquetés. Pattes robustes ; tarses d'un testacé de poix. — Long. 7 à 8 mill.

Gomère, sur les montagnes les plus élevées au-dessus de Hermigua, en battant les *sedum*.

XXI. — LAPAROCERUS (λαπαρός, délié ; κέρας, corne)

Schönh. Curc. II 1834. 530. — Lacd. Gener. VI 198. — Wollast.

Ins. Mad. 360. — Canar. Coleopt. 340, 213.

Propres aux groupes d'îles de Madère, des Canaries et des Açores dont ils caractérisent la faune, ces insectes varient extrêmement. Wollaston les a repartis en 3 genres : *Laparocerus* proprement dits, *Cyphoscelis* et *Atlantis*, que nous considérons comme des sous-genres et dont nous reproduisons les caractères.

1^{er} S.-Gr. — *Laparocerus*.

Oblong ou ovale, revêtu d'une pubescence couchée, rarement presque glabre.

Tête très-souvent munie d'un court sillon ou d'un point enfoncé entre les yeux.

Rostre rarement aussi long que la tête, presque aussi large, épais, parallèle ou légèrement atténué en avant, avec ses ptéryges souvent un peu saillantes, subanguleux et souvent sillonné en dessus, plus ou moins échancré au bout.

Scrobes assez profondes, rapidement évasées en arrière et atteignant les yeux.

Antennes très-longues, grêles; scape droit ou un peu arqué, en massue allongée au bout, empiétant fortement sur le prothorax; funicule à articles obconiques : 1-2 allongés, 3-7 plus courts, décroissant peu à peu; massue allongée, oblongo-ovale, acuminée, articulée.

Yeux médiocres, en général assez saillants, ovales ou oblongo-ovales, longitudinaux.

Prothorax imparfaitement contigu aux élytres, transversal ou non, médiocrement convexe chez la plupart, plus ou moins arrondi sur les côtés, tronqué en avant et à sa base.

Ecusson de grandeur variable, en triangle rectiligne.

Elytres oblongo-ovales ou ovales, plus ou moins convexes, un peu plus larges que le prothorax et non ou à peine échancrées à leur base, avec les épaules arrondies.

2^e segment abdominal aussi long au moins que les suivants réunis, séparé du 1^{er} par une suture fortement arquée ou anguleuse; saillie intercoxale médiocrement large, tronquée en avant.

Pattes médiocres; cuisses en massue; jambes variables selon les espèces et les sexes; tarses assez longs, villex, spongieux en dessous, à articles 1-2 beaucoup plus étroits que 3-4; crochets très-grêles.

1. L. CLAVATUS Wollst. *Mad.* 1854. 363. 277. Pl. vii f. 3. — *Cat. Mad.* 113, 325. — *Atlant.* 315, 872.

Ovale-elliptique, svelte, un peu acuminé devant et der-

rière, noir de poix et vêtu d'une pubescence couchée fauve ou d'un brun légèrement doré, qui paraît n'être pas très-serrée. Antennes testacées, 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux, massue grêle et ovale-allongée. Rostre un peu plus long et plus grêle que dans aucune autre espèce, légèrement dilaté au bout, rugueusement pointillé, avec un court sillon longitudinal au milieu entre les yeux, qui sont petits, parfaitement ronds et très-saillants. Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, ayant sa plus grande largeur après le milieu; densément et grossièrement ponctué. Élytres ovales, tronquées à la base, avec les angles huméraux légèrement saillants; surface un peu ondulée ou inégale, striées-ponctuées, sans aucun de ces longs poils additionnels dressés; suture plus densément et uniformément pubescente, interstries, particulièrement les alternes, marquées dans leur longueur d'une pubescence pâle-fauve ou un peu brun-doré. Pattes testacées quoique en partie rembrunies; crochets noirs. — Long. 8 mill.

Très-rare, à Madère, sous les pierres et dans les fissures des rochers.

2. *L. UNDULATUS* Wollst. Ann. Hist. nat. x 1862, 332. — Atlant. 315, 873. Append. 51.

Assez grêle, noir, peu densément parsemé d'une courte pubescence couchée, d'un cendré vert, presque sans poils additionnels. Antennes ferrugineuses allongées, très-grêles, 2^e article sensiblement plus long que le 3^e. Tête à peine sculptée; yeux ovales saillants; rostre allongé assez grêle, sensiblement dilaté à l'extrémité. Prothorax avec des points profonds, peu nombreux, obsolètement caréné, légèrement biimpressionné sur la partie postérieure du disque. Élytres profondément striées-ponctuées, obsolètement ondulées et inégales. — Long. 8 mill.

♂ Pattes robustes; jambes garnies de longs poils, antérieures fortement et subitement arquées vers l'extrémité, postérieures dilatées au bout, largement échancrées du milieu à l'extrémité; arête externe arrondie très-pubescente; tarses larges.

1 seul exemplaire recueilli à Madère à une fort grande

hauteur. Cette espèce et la précédente s'éloignent des autres *Laparocerus* par le rostre étroit, allongé, dilaté au bout, et ont ensemble une grande affinité. L'*undulatus* est non-seulement plus grand que le *clavatus* et de couleur différente, mais encore sa tête et son rostre sont presque sans sculpture; ses yeux un peu plus grands, plus ovales et moins saillants, son prothorax beaucoup plus profondément et moins ponctué, et plus inégal par derrière, et le 1^{er} article du funicule est visiblement plus long que le 2^e.

3. L. MORIO Bohm. Sch. Curc. II 1834. 531, 1. — Wollst. Mad. 1854. 360, 276. Pl. VII f. 1. — Cat. Mad. 113. — Cat. Canar. 341. — Atlant. 316, 874.

Ovale-oblong, presque oblong, convexe, noir ou noir de poix, avec plus ou moins de pubescence couchée, cendrée, excessivement petite, parfois nulle. Antennes ferrugineuses, de la longueur de la moitié du corps, grêles, avec la massue allongée, aiguë. Tête médiocre, très-finement et densément pointillée; front plan, strigieux, avec un sillon médian, assez profond; yeux petits, ovales, saillants. Rostre court, de la longueur de la tête et presque aussi large, rétréci en avant, strigieux et canaliculé. Prothorax un peu plus large que long, extrêmement convexe, subglobuleux, régulièrement et également arrondi sur les côtés, avec sa plus grande largeur vers le milieu, assez densément mais pas très-profondément ponctué avec de petits points dans l'intervalle. Elytres ovales ou un peu oblongues, plus ou moins profondément striées-ponctuées; interstries très-finement ruguleux, parsemés, surtout par derrière, de petits tubercules espacés avec une apparence de marqueterie de squamules pâles, qui prennent quelquefois une teinte opaline, par suite d'un reflet vert bleuâtre ou jaunâtre. Extrémité des tarses ferrugineuse; jambes densément garnies en dedans d'une pubescence longue et pâle; cuisses et jambes noires, rembrunies ou entièrement d'un ferrugineux brunâtre terne. — Long. ♂ 10,3 à 15 — ♀ 8 à 10,3 mill.

♂ Pattes larges et robustes, jambes distinctement crénelées en dedans, 4 antérieures munies à l'extrémité in-

terne d'une forte épine dirigée en dedans, les 2 antérieures considérablement courbées à l'extrémité, les intermédiaires un peu moins ; postérieures graduellement dilatées dès la base, avec l'angle apical interne largement échancré, externe légèrement avancé, cilié.

♀ Plus étroite, pattes beaucoup plus grêles et plus courtes, jambes peu distinctement crénelées en dedans, avec une très-petite épine à l'extrémité interne, antérieures très-faiblement arquées au bout, les 4 autres simples.

Très-abondant, sous les pierres, en toutes saisons, depuis les bords de la mer jusqu'au sommet des plus hautes montagnes.

Madère, Salvages ; Canaries, Ténériffe et Gomère.

On le reconnaît à sa couleur obscure et terne, à sa surface très-finement pubescente, à son prothorax subglobuleux et à la structure de ses jambes.

4. L. SCULPTUS Brul. Can. 1838. 71. (*Otiorynchus*). — Wollst. Cat. Can. 341, 531. — Atlant. 317, 875.

Noir brun, presque mat, avec une sculpture petite et très-serrée, et garni partout d'une pubescence couchée, très-petite et très-courte. Antennes d'un roux ferrugineux, ainsi que les pattes. Prothorax étroit, finement et très-densément pointillé. Elytres convexes, tronquées presque droit à la base, avec le calus huméral épaissi, striées-crénelées ; avec des interstries un peu strigieux de rides transversales, très-petites et très-serrées. — Long. 13 mill.

Cette grande espèce est bien caractérisée par sa surface presque mate et très-finement pubescente, par sa sculpture excessivement dense, mais extrêmement fine, la tête et le prothorax étant très-densément et très-finement pointillés, tandis que les élytres sont parsemées de petits points confluent transversalement en forme de stries irrégulières. Son prothorax, comme dans l'*undatus*, est un peu étroit et légèrement conique ; il est d'un brun plus ou moins rougeâtre, lorsqu'il est immature, sauf les pattes, qui sont d'un ferrugineux pâle.

Rare, dans les forêts de lauriers de l'île de Palma.

5. L. UNDATUS Wollst. Cat. Can. 1864. 342, 532. — Atlant. 317, 876.

Se reconnaît à sa forme elliptique, acuminée devant et derrière, à sa surface médiocrement luisante, noir opaque, avec une teinte métallique peu visible, à ses interstries undulés, moins distinctement striguleux transversalement que dans le *sculptus*, mais avec quelques points très-grands, quoique très-légers, émettant chacun 1 poil dressé.

Ovale-allongé, terminé en pointe à chaque extrémité, noir avec une faible teinte métallique, assez luisante. Tête peu convexe, très-finement strigieuse, avec une étroite fovéole entre les yeux, qui sont ovales-déprimés; rostre assez long, plan, parallèle, peu ponctué. Antennes très-grêles, dépassant le milieu du corps, ferrugineuses; scape droit, un peu en massue; 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e; massue étroite, oblongue. Prothorax aussi long que large, convexe, dilaté-arrondi au milieu des côtés, également rétréci aux 2 bouts, densément pointillé sur le fond avec de gros points entremêlés. Ecusson en triangle. Elytres tronquées droit à la base, plus larges et 3 fois plus longues que le prothorax subdéprimées, avec les épaules saillantes, presque parallèles sur les côtés, atténuées et rabattues en pointe par derrière, striées de points très-serrés, interstries finement strigieux et un peu bosselés, avec des points pilifères rares. Cuisses renflées en massue; jambes pubescentes de jaune, épaissies au bout; antérieures échancrées en arc intérieurement. — Long. 14 — larg. 6 mill.

Ténériffe, dans des bois de lauriers, au-dessus de Taganana. Rare.

6. L. EXCAVATUS Wollst. An. Hist. nat. xi 1863, 219. — Cat. Can. 343, 533. — Atlant. 317, 877.

Se reconnaît à sa surface obscure, luisante et presque glabre; à son prothorax convexe, très-arrondi sur les côtés, avec de petits points fins, serrés, mêlés de points épars plus grands et plus profonds; aux jambes antérieures ♂ profondément échancrées en dedans, postérieures fortement crénelées; à ses élytres un peu bisinuées à la

base, avec le calus huméral très-développé et les interstries à strigosités transverses et à points très-espacés, assez grands en dehors.

Certains exemplaires un peu plus grands et moins luisants ont le prothorax plus densément sculpté, les interstries plus plans et la surface encore plus glabre.

Ovale-allongé, noir de poix, luisant, presque glabre. Antennes grêles, testacées; scape presque droit, clavi-forme; 1^{er} article du funicule à peu près de la longueur du 2^e; massue longue, étroite, en pointe. Tête pointillée, ruguleuse; rostre court, plan, parallèle, à peine pointillé, faiblement canaliculé au milieu; fovéole frontale profonde, étroite. Prothorax beaucoup plus large que long, bombé, fortement dilaté-arrondi au milieu des côtés, très-rétréci et transversalement impressionné en devant et à la base, surface densément pointillée avec de plus gros points espacés sur le dos et plus rapprochés latéralement. Ecusson petit, triangulaire. Elytres bisinuées à la base avec les épaules saillantes, subdéprimées, parallèles au milieu des côtés, 3 fois plus longues que le prothorax, atténuées vers le bout et terminées en pointe arrondie; striées-punctuées; stries profondes sur le bord infléchi; dernières interrompues au niveau de l'échancreure erurale; échancrées au niveau des hanches postérieures; interstries plans, densément strigueux en travers, avec quelques points écartés plus distincts. Pattes pubescentes, cuisses renflées en massue; jambes brunes, tarses ferrugineux. — Long. 11 — larg. 4,5 mill.

♂ Jambes antérieures profondément échancrées en dedans avant l'extrémité, postérieures fortement mais peu densément dentelées.

Ténériffe, Gomère, dans les bois sur les montagnes, dans les mousses et lichens et sous le bois mort.

7. L. GROSSEPUNCTATUS Wollst. Cat. Can. 1864. 344, 534. — Atlant. 318, 878.

Se reconnaît aisément à son rostre assez étroit et profondément canaliculé, à son prothorax assez petit et grossièrement punctué, à sa surface plus ou moins parcimonieusement marquée de squamules métalliques et par

les gros points de ses interstries; ce dernier caractère, joint à son rostre un peu plus étroit et à son prothorax sans carène et moins rebordé à la base, le distingue principalement du *squamosus*.

Subelliptique, noir, peu luisant, avec des squamules métalliques peu nombreuses. Antennes roux-ferrugineux. Rostre assez grêle, grossièrement ponctué, profondément canaliculé. Prothorax petit, profondément ponctué avec de petits points intermédiaires assez serrés, sans carène au milieu. Elytres acuminées au bout, avec le calus huméral presque obsolète, profondément striées-ponctuées; interstries inégaux, marqués de très-grands points, profonds, peu nombreux, et garnis de poils dressés très-écartés, surtout par derrière. Pattes brun de poix. — Long. 9 mill.

♂ Jambes antérieures légèrement échancrées-sinuées vers le bout, postérieures droites en dedans et très-finement crénelées.

♀ Jambes presque simples.

Très-rare dans les bois de lauriers humides de Ténériffe, avec le précédent.

8. L. SQUAMOSUS Brul. Can. 1838. 71. (*Otiorrhynchus*). — Wollast. Cat. Can. 344, 535. — Atlant. 318, 879.

Le prothorax plus petit, profondément et assez densément ponctué de cette espèce, qui est obsolètement caréné après le milieu et étroitement rebordé à la base; son rostre grossièrement sculpté dans sa longueur, profondément canaliculé; ses élytres grossièrement striées-ponctuées, qui semblent parsemées de squamules rares et marquées, surtout par derrière, de poils dressés courts, très-écartés, peuvent le distinguer de ses voisins; ses interstries parsemés d'un très-petit nombre de points faibles très-écartés, qui disparaissent presque vers la suture, et les jambes postérieures ♂ droites en dedans et très-finement crénelées.

Noir ou noir de poix, peu luisant, avec des squamules métalliques peu nombreuses. Antennes roux-ferrugineux. Rostre assez épais, grossièrement ponctué-strigieux, profondément canaliculé. Prothorax assez étroit, profondé-

ment ponctué, avec de petits points dans l'intervalle, obsolètement caréné au milieu, étroitement rebordé à la base. Elytres à calus huméral presque obsolète, profondément striées-ponctuées; interstries marqués de points légers très-peu nombreux et garnis surtout par derrière de poils courts redressés, écartés. Pattes roux de poix. — Long. 8 à 9,3 mill.

♂ Jambes antérieures échancrées en arc par dedans avant l'extrémité, postérieures droites et finement crénelées en dedans.

♀ Jambes presque simples.

Ténériffé, dans les forêts de moyenne hauteur. Très-rare.

9. L. CRASSIROSTRIS Wollst. Cat. Canar. 1864. 345, 536. — Atlant. 319, 880.

Allongé assez étroit, subdéprimé, brun de poix, assez luisant, marqueté de squamules métalliques peu nombreuses, manquant presque de poils additionnels. Antennes roux-ferrugineux. Tête épaisse, très-finement et très-densément pointillée. Rostre court, épais, quadrangulaire, à peine canaliculé, mais marqué entre les yeux d'une grande fovéole profonde. Prothorax court, tronqué, subsinué en devant, finement et densément pointillé, avec des points plus grands assez serrés. Elytres allongées, striées-ponctuées. Pattes roux de poix; jambes simples en dedans ♂. — Long. 8,3 mill.

L'exemplaire unique trouvé en avril dans une sapinière élevée de Tarajana (Grande-Canarie), ressemble à première vue à un *Brachyderes* par sa forme étroite, allongée; son rostre court et épais, et son prothorax tronqué au bout; toutefois, ses antennes plus longues, ses scrobes différentes de structure, jointes à l'extrémité du rostre profondément excavée et l'épine subhorizontale excessivement petite de l'angle interne des jambes l'en éloignent. Il est remarquable entre les *Laparocerus* par sa forme svelte, allongée, et sa surface relativement déprimée, d'un brun de poix; par son rostre court, épais, carré, densément et finement pointillé, légèrement canaliculé; par son front épais ayant une profonde fovéole entre les yeux; par son

prothorax un peu raccourci, bien tronqué en avant, et sa double ponctuation serrée et nette.

10. L. CRASSIFRONS Wollst. An. Hist. nat. xi 1863. 220. — Cat. Can. 346, 537. — Atlant. 319, 881.

Noir ou noir de poix, peu luisant, plus ou moins densément et grossièrement marqueté de squamules métalliques. Antennes roux-ferrugineux. Tête convexe, épaisse; rostre épais, subtriangulaire, grossièrement et densément ponctué et profondément canaliculé; yeux assez petits, arrondis. Prothorax convexe, ponctué et densément pointillé. Elytres en ovale oblong, avec le calus huméral obsolète, striées-ponctuées; interstries à peine pointillés et garnis, surtout par derrière, de poils courts dressés, écartés. Pattes roux de poix. — Long. 8 à 11,6 mill.

♂ Plus étroit, plus luisant, élytres plus profondément striées.

♀ Plus large, un peu plus opaque, élytres moins profondément striées.

Cette espèce se reconnaît à sa tête convexe et épaisse, à son rostre en triangle, fortement ponctué; à son prothorax convexe et densément ponctué, avec la double ponctuation bien marquée; à ses élytres un peu ovales-oblongues, à calus huméral et à points des interstries obsolètes; à sa surface plus ou moins garnie de squamules piliformes fortes, brun-jaunâtre, mais faiblement métallique.

Cette espèce est particulière aux contrées les plus basses de Ténériffe, caractérisées par la présence du *Spartium nubigena*, de 6 à 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer; il est abondant au printemps, sous les pierres, sur le sommet joignant les *Canadas* et sur le sommet opposé, au-dessus de Agua-Mansa.

11. L. WOLLASTONI. — *scapularis* Wollast. Cat. Can. 1864. 347, 538. — Atlant. 319, 882.

Ressemble beaucoup au *crassifrons*, mais il s'en distingue aisément par sa taille beaucoup plus petite; par son rostre plus grêle et, quoique à peine plus long, un peu plus droit sur les côtés ou moins triangulaire; par ses yeux plus petits, plus ronds et plus saillants; par son

prothorax moins profondément et plus densément ponctué ; par ses élytres généralement peut-être un peu plus velues et plus distinctement abaissées au bout ; par ses antennes et pattes plus courtes et plus pâles, scape plus courbé et tarses distinctement plus étroits. — Long. 5,8 à 7 mill.

Se trouve en compagnie avec le *crassifrons* sur les sommets élevés de Ténériffe, de 6 à 9,000 pieds au-dessus de la mer, sous les pierres entre les *Retama* ; moins abondant.

12. L. *ÆTHIOPS* Wollst. Cat. Can. 1864. 317, 539. — Atlant. 319, 883.

Noir, luisant, glabre. Antennes ferrugineuses. Rostre concave, légèrement canaliculé, avec des points assez profonds. Prothorax un peu convexe, arrondi sur les côtés, également et assez profondément ponctué, et parsemé de très-petits points intermédiaires peu distincts. Elytres striées-ponctuées ; interstries pointillés de très-petits points peu nombreux. Tarses ferrugineux, cuisses et jambes d'un noir de poix, genoux roussâtres. — Long. 8 à 9,3 mill.

La surface glabre, luisante et d'un noir intense, jointe au rostre concave ; le prothorax uniformément ponctué et arrondi sur les côtés, et le pointillé excessivement fin des intervalles, serviront à le distinguer de tous les autres *Laparocerus*.

Pris en février, sous les pierres, dans l'île de Hierro, sur les sommets herbeux ; découvert immédiatement au-dessus de *El Golfo*.

13. L. *HIRTUS* Wollst. Cat. Can. 1864. 348, 540. — Atlant. 320, 884.

Noir, à peine bronzé, luisant, peu densément marqué de squamules métalliques et garni, surtout sur les élytres, de très-longs poils dressés, mous. Antennes et tarses ferrugineux, cuisses et jambes brun de poix. Prothorax petit, assez court, un peu convexe, grossièrement ponctué, pointillé intermédiaire très-fin, presque obsolète. Elytres oblongues, profondément striées-ponctuées ; interstries alternes, surtout par derrière et sur les côtés, rendus inégaux par des tubercules, garnis de faisceaux de squamules. — Long. à peine 7,3 mill.

Les poils dressés et mous excessivement longs qui garnissent densément cette espèce, surtout sur les élytres, joints aux grands points peu profonds de son prothorax petit et transversal, dont le pointillé paraît obsolète, et à ses élytres oblongues et profondément striées-punctuées, qui ont leurs interstries alternes undulés de gros tubercules, faiblement squamuleux, suffisent pour le caractériser.

Un seul exemplaire pris au printemps sur les montagnes de Grande-Canarie. Il est possible que ce ne soit qu'une variété, propre à cette île, de l'espèce suivante.

14. L. INÆQUALIS Wollst. An. nat. Hist. xi 1863. 220. — Cat. Can. 348, 541. — Atlant. 320, 885.

Se reconnaît aisément à sa teinte bronzée; à sa surface plus ou moins parcimonieusement garnie de squamules d'un brunâtre doré ou jaune-métallique terne, ainsi que de poils fauves dressés et écartés, particulièrement sur les élytres; à son prothorax étroit, cylindro-conique, parsemé de gros points, peu profonds, entremêlés d'un pointillé serré et visible; à ses élytres larges, en carré oblong, à interstries alternes plus fortement ondulés et fasciculés, avec de grands tubercules squamuleux, comme dans le *hirtus*.

Noir-bronzé, luisant, marqueté de squamules un peu métalliques, peu nombreuses, et garni surtout sur les élytres de poils dressés plus ou moins longs, fauves. Antennes ferrugineuses, très-grêles; scape subsinué, renflé au bout; 1^{ers} articles du funicule allongés, presque égaux; massue allongée, étroite, en pointe. Tête pointillée. Front plan, avec une profonde impression entre les yeux, qui sont arrondis et assez saillants. Rostre court, épais, concave. Prothorax transverse, arrondi sur les côtés, tronqué droit et plus rétréci devant que derrière, finement et densément pointillé, avec quelques points plus gros, épars. Ecusson très-petit. Elytres tronquées à la base et beaucoup plus larges, 3 fois $1/2$ plus longues que le prothorax, avec les épaules saillantes, atténuées et rabattues en pointe aiguë à l'extrémité, peu convexes; striées-punctuées; interstries alternes marqués de gros tubercules squamuleux

espacés, garnis de squamules couchées vertes et de poils dressés jaunâtres. Pattes grêles; cuisses un peu renflées; jambes brunes, pubescentes, ainsi que les tarses. — Long. 6,5 à 8 — larg. 3 à 4 mill.

Ténériffe, bois de lauriers humides, dans les lieux élevés.

15. *L. GLOBOSIPENNIS*. — *globulipennis* Wollast. Cat. Canar. 1864. 349, 542. — Atlant. 320, 886.

Cette espèce paraît représenter à Palma l'*inæqualis* de Ténériffe, 2 exemplaires ont été pris en mai dans les bois humides de lauriers au Barranco de Galga. On peut le reconnaître à la couleur foncée de sa surface et de sa vestiture; à ses élytres un peu plus rondes et plus ventrues, avec les points des stries beaucoup plus grands, les poils un peu plus longs, plus mous et moins roussâtres, avec les interstries alternes moins ondulés, les tubercules obtus étant et moins élevés, moins nets, mais moins densément garnis de squamules couchées. — Long. 9,3 mill.

16. *L. OCCIDENTALIS* Wollast. Cat. Can. 1864. 350, 343. — Atlant. 320, 887.

On peut reconnaître aisément cette espèce à sa grande taille et à sa surface d'un noir obscur, rarement brunâtre, faiblement brillant; à son rostre plan, avec le sillon médian pas très-marqué; à son prothorax régulièrement, également et profondément ponctué, les petits points intermédiaires serrés et distincts; à ses élytres épaisses, ovales et convexes, les interstries alternes sans tubercules; à ses antennes et à ses pattes, particulièrement les postérieures, courtes et robustes, à scape assez arqué; à ses squamules d'un brunâtre métallique terne et à sa surface dépourvue de poils surnuméraires dressés, avec les élytres garnies spécialement par derrière de soies petites et excessivement courtes. — Long. 10,3 mill.

Les *L. occidentalis*, *globosipennis*, *inæqualis* et *hirtus*, quoique distincts les uns des autres, appartiennent à un même type, et peut-être faut-il y joindre l'*obtriangularis*.

Un seul individu trouvé en février près des rochers élevés d'El Golfo, dans l'île de Hierro.

17. *L. OBTRIANGULARIS* Wollast. Cat. Can. 1864. 351, 544. — Atlant. 321, 888.

Noir, à peine un peu bronzé, luisant, marqueté de squamules métalliques peu nombreuses et garni sur les élytres de longs poils dressés, robustes, noirâtres. Rostre étroit, allongé. Yeux déprimés. Prothorax subcylindrique, grossièrement et profondément ponctué-rugueux, légèrement canaliculé sur la partie antérieure du disque. Elytres obtriangulaires, larges et tronquées à la base, avec les épaules assez saillantes, graduellement terminées en pointe, profondément striées-ponctuées. Antennes et tarses ferrugineux; cuisses et jambes d'un brun de poix. — Long. 7 mill.

Un seul exemplaire ♀ pris dans les forêts de Ténériffe à Agua Mansa.

Se reconnaît de suite à son rostre plus allongé, à son prothorax subcylindrique rugueusement ponctué, à la forme triangulaire de ses élytres garnies de soies peu nombreuses, et à sa surface marquetée de squamules fortes, d'un métallique verdâtre.

18. *L. ELLIPTICUS* Wollast. An. Nat. Hist. xi 1863. 220. — Cat. Can. 351, 545. — Atlant. 321, 889.

Ferrugineux ou brun de poix, assez luisant, orné de marqueteries de squamules soyeux-métallique, denses et grandes, et garni vers l'extrémité des élytres de longs poils dressés. Antennes assez robustes, d'un roux ferrugineux. Rostre épais, légèrement canaliculé. Yeux grands. Prothorax petit, étroit, subcylindrique, rugueux-alutacé, à points légers et peu nombreux, subsinué à la base. Elytres convexes, en ovale elliptique, rétrécies vers les épaules, élargies graduellement à partir de là jusqu'au-delà du milieu et peu brusquement terminées en pointe, trisinuées ensemble à la base, légèrement striées-ponctuées; interstries alternes plus ou moins marquetés. Pattes d'un roux ferrugineux; cuisses et jambes souvent plus obscures. — Long. 9,3 à 11,6 mill.

♂ Un peu plus petit, plus étroit; jambes un peu plus arquées, avec un crochet apical interne plus distinct.

♀ Un peu plus grande, plus large; jambes un peu plus droites, presque simples au bord apical interne.

Ce grand et beau *Laparocerus*, qui se trouve sous les écorces ou dans les mousses et les lichens des arbres dans les forêts élevées de Ténériffe, de Gomère et de Palma, est remarquable par sa surface soyeuse, densément garnie de squamules vert métallique obscur, cuivreux pâle ou brun doré, et par sa forme particulière, le prothorax étant extrêmement petit et étroit, tandis que les élytres sont renflées et convexes. On peut le reconnaître en outre à ses grands yeux, à son prothorax marqué de points plus fins et assez distants, à ses élytres dont les interstries alternes sont plus ou moins visiblement marquetés et garnis par derrière de quelques poils longs, dressés, et à ses antennes un peu plus épaisses que de coutume.

19. L. TUMENS. — *inflatus* Wollast. Atlant. 1865. 321, 890. Append. 51.

Noir de poix, assez luisant, densément et grossièrement marqueté de squamules métalliques, et garni partout sur les élytres de très-longes poils dressés. Antennes d'un roux ferrugineux clair. Rostre assez large, profondément canaliculé par derrière. Yeux grands, saillants. Prothorax arrondi sur les côtés, à points profonds et écartés, mêlés de très-petits points. Elytres convexes, oblongues-elliptiques, tronquées à la base, acuminées par derrière, striées-punctuées. Pattes d'un rouge ferrugineux; cuisses un peu plus obscures. — Long. 10,3 mill.

Un seul exemplaire pris sur les montagnes de Gomère.

Tient le milieu entre *ellipticus* et *lepidopterus*, peut-être se rapproche-t-il davantage du dernier. Il diffère du 1^{er} par son rostre plus large et moins concave, son prothorax plus large, beaucoup moins arrondi sur les côtés et plus profondément ponctué, ses élytres moins elliptiques, élargies à la base et garnies partout de très-longes poils dressés et ses antennes plus grêles. Il diffère du 2^e par sa surface moins opaque, son rostre un peu plus large et ses yeux plus saillants, son prothorax à points plus profonds et plus rares, ses élytres plus aiguës par derrière, leurs

poils dressés plus longs et plus écartés, et ses pattes plus allongées et un peu plus pâles.

20. L. BELLOPTERUS. — *lepidopterus* Wollast. Cat. Canar. 1864. 352, 546. — Atlant. 321, 891.

Noir ou noir de poix, un peu opaque, densément marqueté de squamules un peu métalliques et garni sur les élytres de poils dressés, mous, plus ou moins longs. Antennes roux-ferrugineux. Rostre assez épais, subdéprimé, légèrement canaliculé. Yeux grands, oblongs, pas très-proéminents. Prothorax arrondi sur les côtés, à points écartés, légers sur le disque, plus profonds de chaque côté, mêlés de petits points serrés très-distincts, obsolètement caréné. Elytres ovales-oblongues, striées-ponctuées. Tarses roux-ferrugineux; cuisses et jambes ordinairement plus obscures. — Long. 9,3 à 10,5 mill.

Var. Un peu plus petit, plus luisant, de couleur plus obscure, prothorax un peu plus légèrement ponctué, poils des élytres plus courts.

Ténériffe, Palma et Hierro, très-rare dans les forêts; la grande variété appartient à Grande-Canarie.

21. L. RASUS Wollast. Cat. Can. 1864. 354, 548. — Atlant. 322, 892.

Noir de poix, peu luisant, marqueté de squamules métalliques soyeuses, mais dépourvu de poils dressés. Antennes d'un roux ferrugineux, 2^e article du funicule sensiblement plus long que le 1^{er}. Rostre souvent plus rougeâtre, assez grêle, plan, à peine canaliculé mais avec une fossette interoculaire, finement et légèrement pointillé. Prothorax petit, finement et légèrement pointillé, parsemé de points un peu plus grands mais légers, avec une carène le plus souvent très-obsolète en avant. Elytres ovales, striées-ponctuées; interstries alternes plus ou moins distinctement marquetés. Pattes d'un roux ferrugineux. — Long. 7,6 à 10 mill.

♂ Un peu plus luisant; jambes munies au bout interne d'un crochet horizontal, antérieures crénelées en dedans de très-petits denticules.

♀ Un peu plus opaque; jambes presque simples.

Var. Elytres plus profondément striées-ponctuées; pattes un peu plus obscures.

On peut le reconnaître à sa surface densément marquée de belles squamules soyeuses métalliques, dépourvue de poils dressés, à son rostre à petits points légers, ordinairement un peu rougeâtre, relativement subcylindrique, aplati en dessus et obsolètement canaliculé; à son prothorax finement et légèrement pointillé, avec de plus gros points peu profonds, entremêlés, et à la forme ovale de ses élytres.

Montagnes de Lanzarote et de Fuerteventura, assez rare; le seul exemplaire de Fuerteventura diffère par les caractères indiqués dans la variété, qui n'est sans doute qu'une forme locale.

22. L. SENICULUS Wollast. Cat. Can. 1864. 353, 547. — Atlant. 322, 893.

Noir ou noir de poix, assez opaque, assez densément marqué de squamules métalliques cendrées, et garni seulement à l'extrémité de longs poils dressés. Prothorax densément et très-finement pointillé, et parsemé de plus grands points, très-légers, fort écartés, presque obsolètes sur le devant du disque, avec une faible carène lisse, sensible surtout par derrière, distinctement rebordé à la base. Elytres oblongues, très-profondément striées-ponctuées de grands points. Pattes d'un roux de poix. — Long. 9,3 mill.

Deux exemplaires pris près Las Palmas, dans Grande-Canarie.

Cette espèce peut être caractérisée par les squamules d'un métallique cendré dont elle est revêtue, par sa surface dépourvue de longs poils dressés, excepté à l'extrémité des élytres oblongues et très-profondément striées-ponctuées, son prothorax est très-densément couvert de petits points un peu grossiers, mêlés de quelques-uns plus grands, écartés et extrêmement faibles, et longé d'une belle carène polie sur le disque, surtout par derrière.

23. L. SUBOPACUS Wollast. Atlant. 1865. 322, 894. Append. 52.

Allongé, assez étroit, noir, opaque, en particulier sur

les élytres ♀, nébuleux de squamules d'un fauve cendré, peu nombreuses, sans poils dressés, mais parsemé de quelques soies à demi couchées vers l'extrémité des élytres. Antennes d'un ferrugineux de poix, 2^e article du funicule beaucoup plus long que le 1^{er}. Rostre très-finement et très-légèrement pointillé, un peu concave, profondément canaliculé par derrière. Yeux arrondis, saillants. Prothorax allongé, profondément ponctué et densément parsemé de très-petits points fins. Elytres profondément striées-ponctuées. Pattes allongées; tarses d'un ferrugineux de poix. — Long. 9,3 mill.

Cette espèce a beaucoup des caractères généraux et de la sculpture du *mendicus* de Hierro; mais il est bien plus grand, avec les élytres plus opaques et plus profondément sculptées, avec les squamules plus fauves (ou moins cendrées) et ses membres, spécialement le 2^e article du funicule plus allongés; ce dernier trait le rapproche plutôt de l'*obscurus* de Ténériffe, quoique sa taille plus grande, son prothorax moins raccourci, ses yeux plus saillants, sa surface plus opaque et plus profondément sculptée, ses squamules plus grosses et plus fauves et ses membres plus longs, l'en distinguent. Toutefois les *subopacus* de Gomère, *obscorellus* de Ténériffe et *mendicus* de Hierro, et peut-être même le *seniculus* de Grande-Canarie, peuvent être considérés comme des représentants d'un de l'autre dans leur île respective.

Gomère, sur le *Sedum*, dans des montagnes très-élevées.

24. L. OBSCURELLUS. — *obscurus* Wollast. Cat. Can. 1864. 355, 550. — Atlant. 322, 895.

Noir, opaque, parsemé de squamules cendrées, petites et peu nombreuses, mais dépourvu de poils dressés, garni vers l'extrémité des élytres de soies courtes à demi couchées, peu nombreuses. Antennes d'un roux de poix; 2^e article du funicule beaucoup plus long que le 1^{er}. Rostre finement et légèrement ponctué, canaliculé-concave. Yeux assez petits, arrondis. Prothorax assez convexe, peu profondément ponctué, parsemé de petits points intermédiaires légers. Elytres très-finement subalutacées-rugu-

leuses, striées-ponctuées, trisinuées à la base. Pattes roux de poix. — Long. 7 mill.

♂ Grèlo; jambes antérieures assez distinctement sinuées vers l'extrémité interne.

Un seul à Ténériffe.

Outre le 2^e article du funicule près de 2 fois aussi long que le 1^{er}, on peut reconnaître l'*obscurellus* à sa surface noire peu densément vêtue de petites squamules cendrées ou pubescence sans poils dressés; à ses élytres opaques, subalutacées et trisinuées à la base; ses yeux sont petits et ronds, et son prothorax un peu convexe est profondément nettement ponctué, avec de petits points intermédiaires faibles et pas très-serrés.

25. L. MENDICUS Wollast. Cat. Can. 1864. 355, 549. — Atlant. 323, 896.

Noir-brun, assez luisant, peu densément marqueté de squamules cendrées à peine métalliques, et garni sur les élytres de soies dressées très-courtes. Antennes d'un roux ferrugineux, 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}. Rostre luisant, étroit, canaliculé-concave, à petits points légers, rares. Yeux arrondis, saillants. Prothorax transverse, dilaté-arrondi sur les côtés, coupé droit aux 2 bouts, un peu plus large à la base qu'en devant, avec des points espacés profonds et des petits points intermédiaires légers. Ecusson petit, triangulaire. Elytres tronquées et un peu plus larges à la base et 3 fois $1/2$ plus longues que le prothorax, élargies en arc faible sur les côtés, rétrécies et rabattues en pointe arrondie au bout, profondément striées-ponctuées. Pattes d'un roux ferrugineux plus ou moins obscur. — Long. 7 — larg. 3 mill.

Jambes antérieures sinuées, postérieures obsolètement serrées en dedans vers le bout ♂, simples ♀.

La surface noir-brun, ondulée de squamules cendré-terne, et les élytres garnies de poils très-courts et raides, à demi couchés, le rostre rétréci, concave, poli et à peine pointillé, les yeux proéminents, le prothorax à points profonds, espacés, et les élytres grossièrement striées-ponctuées : tout cela est bien suffisant pour caractériser

le *mendicus*. Le 2^e article du funicule est distinctement plus long que le 1^{er}, ainsi qu'on le voit dans le *rasus* et *obscurellus*, *gomeræcola*, *dispar* et *elatus*.

Pas rare sous les pierres, dans les montagnes de Hierro, en février.

26. L. GOMERÆCOLA. — *gracilis* Wollast. Cat. Can. 1864. 356, 551. — Atlant. 323, 897.

Svelte, noir de poix ou brun de poix, assez luisant, nébuleux de squamules cendrées peu nombreuses. Antennes d'un roux ferrugineux, ainsi que les pattes, 2^e article du funicule sensiblement plus long que le 1^{er}. Rostre canaliculé, un peu concave, finement et légèrement ponctué. Yeux arrondis, saillants. Prothorax parcimonieusement ponctué, parsemé de très-petits points intermédiaires isolètes. Elytres ovales-allongées, légèrement striées-ponctuées. — Long. 5,7 à 8 mill.

♂ Plus grêle, quelquefois très-grêle, dépourvu de poils; jambes antérieures assez profondément échancrées en dedans vers l'extrémité.

♀ Elytres garnies vers l'extrémité de très-peu de poils dressés; jambes simples.

On peut le reconnaître à sa forme svelte, à son prothorax à points écartés peu profonds, à ses élytres ovales-allongées ou elliptiques, fort abaissées aux épaules, à sa surface plus ou moins vêtue ou marquée de squamules cendrées, presque sans éclat métallique.

Gomère, en assez grand nombre en février sur le *Chrysanthemum frutescens* L., au nord de Saint-Sébastien.

27. L. DISPAR Wollast. Cat. Can. 1864. 357, 552. — Atlant. 323, 898.

Brun de poix, assez luisant, nébuleux de squamules cendrées à peine métalliques, peu nombreuses et dépourvu de poils dressés. Antennes robustes, d'un roux ferrugineux, ainsi que les pattes; 2^e article du funicule sensiblement plus long que le 1^{er}. Rostre plus brillant, assez grêle, plan en dessus, à peine canaliculé, finement pointillé. Yeux arrondis, saillants. Prothorax très-rarement mais profondément ponctué. Elytres convexes, striées-ponctuées. — Long. 4,6 à 5,3 mill.

♂ Plus petit, bien plus étroit, points intermédiaires du prothorax très-petits, obsolètes; jambes antérieures à peine sinuées.

♀ Plus grand, beaucoup plus épais, points du prothorax intermédiaires très-petits, distincts; jambes simples.

Cette espèce est remarquable par la dissemblance inusitée des sexes; on le reconnaît à sa petite taille et à sa couleur brun de poix, à sa surface peu ondulée de squamules cendrées ou cendré-fauve, mais dépourvue de poils dressés, à son prothorax à points très-écartés mais plus profonds, avec les petits points intermédiaires obsolètes ♂, visibles ♀, à ses antennes, surtout ♂, plus robustes que d'habitude, à scape graduellement en massue.

Sous les pierres, au nord de Lanzarote.

28. *L. DEBILIS* Wollast. Atlant. 1865. 324, 899. — Append. 53.

Étroit, noir, luisant, peu marqueté de squamules et garni vers l'extrémité des élytres de poils courts, dressés, peu robustes. Antennes d'un ferrugineux de poix, 2^e article du funicule beaucoup plus long que le 1^{er}. Rostre légèrement ponctué, concave, fovéolé par derrière. Yeux petits, arrondis, saillants. Prothorax subcylindrique, à points profonds, peu nombreux. Elytres oblongues, profondément striées-ponctuées. Pattes d'un ferrugineux de poix; cuisses plus obscures. — Long. 6,2 mill.

Un seul exemplaire pris à Ténériffe.

Remarquable par sa forme oblongue et sa surface luisante, par ses yeux petits, arrondis et saillants, par son prothorax assez profondément ponctué, par ses élytres grossièrement striées-ponctuées, légèrement acuminées par derrière, garnies de poils dressés, courts, plus robustes et le 2^e article du funicule beaucoup plus long que le 1^{er}, de même que dans *l'obscurillus*.

29. *L. VELATUS*. — *vestitus* Wollast. Cat. Can. 1864. 358, 533. — Atlant. 324, 900.

Noir ou brun de poix, luisant, peu nébuleux de squamules cendrées, garni de longs poils dressés, mous. Antennes d'un ferrugineux de poix, ainsi que les pattes; 2^e

article du funicule visiblement plus long que le 1^{er}. Rostre légèrement ponctué, concave-canaliculé. Prothorax très-finement et densément pointillé, parsemé d'un petit nombre de points plus grands, surtout sur les côtés. Elytres ovales-oblongues, profondément striées-ponctuées; interstries très-densément couverts de petits points très-obsoletes et très-légères, entremêlés de points un plus grands quoique petits, en très-petit nombre. Les jambes presque semblables dans les 2 sexes. — Long. 6 à 7 mill.

Var. *affinis*. Elytres à peine convexes, moins profondément striées-ponctuées, mais les très-petits points un peu plus distincts.

Se reconnaît à sa surface peu nébuleuse de squamules cendrées plus robustes et garnie partout, en particulier sur les élytres, de longs poils dressés, mous; à son prothorax densément couvert de petits points et parsemé de plus gros points écartés; au 2^e article du funicule des antennes considérablement plus long que le 1^{er}; à ses 2 sexes presque semblables.

Ténériffe, abondant sous les pierres autour de Puerto-Orotava. La variété est propre aux environs de Santa-Cruz.

30. L. TESSELLATUS Brul. Can. 1838. 72, Pl. 1, f. 15 (*Omius*). — Wollast. Cat. Can. 360, 556. — Atlant. 324, 901.

Ovale, noir de poix ou noir-fauve, assez luisant, parfois obsolètement bronzé, marqueté de squamules cendré-fauve métallique, mais presque dépourvu de poils surnuméraires. Antennes d'un ferrugineux roux ou de poix, ainsi que les pattes. Rostre plan, légèrement canaliculé, finement et rarement pointillé. Prothorax profondément et plus ou moins densément ponctué. Elytres convexes, striées-ponctuées. Jambes presque semblables dans les 2 sexes. — Long. 4,6 à 6 mill.

Commun sur les points élevés et intermédiaires, à Ténériffe, Palma et Hierro. Varie un peu selon l'habitat.

On peut le reconnaître à sa petite taille et à sa forme ovale, à son prothorax plus ou moins fortement ponctué; à sa surface vaguement marquetée de squamules brun-cendré, souvent jaunâtres et légèrement métalliques, sans

poils dressés, mais avec des soies courtes et couchées visibles seulement à la loupe.

31. L. PERSITUS. — *obsitus* Wollast. Cat. Can. 1864. 361, 557. — Atlant. 324, 902.

Semblable au précédent, mais d'ordinaire un peu plus petit, garni sur les élytres de poils dressés.

Prothorax moins profondément ponctué, à peine plus arrondi sur les côtés postérieurement. Elytres sensiblement plus oblongues, plus droites sur les côtés et un peu moins arrondies à l'épaule. — Long. 4 à 5,2 — larg. 2,6 mill.

Paraît n'être que le représentant extrême du précédent dans l'île Grande-Canarie, mais, comme le *tessellatus*, il est assez constant dans les 3 îles, Ténériffe, Palma et Hierro, il n'est guère probable que cette espèce éprouve dans une 4^e île, des différences telles qu'en présente le *persitus*, quoiqu'elles ne soient pas très-importantes. Les seuls points où il s'éloigne de ses voisins sont ses élytres plus oblongues et les soies dressées ou poils raides courts dont elles sont garnies; son prothorax un peu plus finement ponctué et peut être un peu plus arrondi sur les côtés.

Peu commun dans les lieux élevés et intermédiaires de Grande-Canarie, à El Monte, au-dessus de San-Mateo, Tarajana.

32. L. TENELLUS Wollast. Cat. Can. 1864. 362, 558. — Atlant. 325, 903.

Ovale, noir, assez opaque, marqué très-finement de squamules d'un cendré roussâtre, dépourvu de poils surnuméraires. Antennes courtes, roux de poix, plus claires, à la base et au funicule. Rostre grêle, grossièrement rugueux-ponctué, canaliculé. Yeux petits, arrondis, saillants. Prothorax très-densément et subtilement ponctué-rugueux. Elytres légèrement striées-ponctuées, subitement rabattues au bout. Pattes courtes, noir de poix; tarses plus roussâtres. — Long. 3,3 à 3,8 mill.

♂ Jambes, surtout les antérieures, armées d'une épine horizontale.

Des plus rares, sous les pierres, à la base de Organo-Rocks, au-dessus d'Agua-Mansa, Ténériffe. C'est le plus petit des *Laparocerus*.

On peut le reconnaître tout de suite à sa forme ovale; à ses membres courts, grêles; à son rostre étroit, densément et grossièrement rugueux; à son prothorax très-densément et rudement ponctué; à ses yeux petits, arrondis et saillants; à ses élytres finement striées-ponctuées et rabattues plus brusquement vers l'extrémité, et à sa surface obscurément marquetée de très-petites squamules d'un cendré fauve, dépourvue de poils dressés.

33. L. PUNCTICOLLIS Wollast. Cat. Can. 1864. 362, 559. — Atlant. 325, 904.

Noir de poix, assez luisant, nébuleux de squamules fortes, cendrées, à peine métalliques, et garni sur les élytres de poils ailongés, mous, dressés. Antennes roux-ferrugineux. Rostre et prothorax profondément, densément et subtilement ponctué, l'un plan, à peine canaliculé, l'autre assez grand, subovalaire. Yeux arrondis, très-saillants. Elytres noirâtres, souvent noires, un peu oblongues, striées-ponctuées. Cuisses et jambes d'un roux de poix; tarses roux-ferrugineux. — Long. 4,6 mill.

♂ Jambes antérieures assez profondément échancrées en dedans vers l'extrémité.

♀ Jambes presque simples.

Cette petite espèce très-distincte est propre à Hierro, prise entre Valverde et El Golfo, à une hauteur d'à peine 1,000 pieds au-dessus de la mer.

Il se reconnaît à la ponctuation profonde, serrée, régulière de la tête et du prothorax (relativement un peu plus grand et plus ovale que dans les autres *Laparocerus*); à la forte proéminence des yeux; aux poils dressés, allongés, mous, qui garnissent les élytres; sa surface est noire ou noir de poix et plus ou moins rarement marquetée de squamules cendrées ou fauve-cendré, faiblement métalliques.

34. L. TECTUS — *indutus* Wollast. Atlant. 1865. 905. Append. 53.

Noir, assez luisant, avec des marqueteries peu nombreuses mais grandes de squamules roussâtres, un peu métalliques, et des poils assez allongés, dressés, assez

serrés, sur les élytres. Antennes d'un roux de poix, ainsi que les pattes. Rostre distinctement canaliculé. Yeux arrondis, saillants. Prothorax, ainsi que le rostre, finement et ruguleusement pointillé, avec des points plus grands, peu profonds, subovale. Elytres oblongues, striées-punctuées. — Long. 4,6 à 5,8 mill.

Ses caractères généraux rapprochent ce petit *Laparocerus* du *puncticollis* de Illierro ; il en diffère par sa taille plus grande et sa couleur moins noire ; par ses poils dressés, un peu plus longs, plus serrés, plus obscurs et plus robustes ; par ses yeux un peu moins arrondis et beaucoup moins saillants ; par sa tête et son prothorax moins densément et moins profondément ponctués, avec de petits points intermédiaires plus distincts ; par ses élytres proportionnellement plus longues et un peu plus arrondies aux épaules et par ses membres plus développés, les jambes plus pubescentes, le 3^e article des tarses plus large, et les jambes antérieures ♂ un peu plus échan-crées en dedans.

Gomère, très-rare.

35. L. COMPACTUS Wollast. Cat. Can. 1864. 359, 555. — Atlant. 325, 906.

Ressemble au *sulcirostris*, mais plus petit, plus brunâtre, un peu plus densément squamuleux et densément garni de soies piliformes, dressées, plus longues.

1^{er} et 2^e articles du funicule des antennes à peu près égaux, distinctement plus courts et plus ovales ou moins obconiques ovales. Yeux un peu plus petits. Prothorax à peine plus densément et plus profondément pointillé. Elytres moins échan-crées ensemble à la base ; interstries un peu moins ruguleux et par suite moins opaques. Tarses sensiblement plus étroits, plus courts. — Long. 3,8 à 4,6 mill.

Très-rare dans les lieux élevés de l'île Grande-Canarie.

Cette espèce et la suivante se rapprochent des grandes espèces du commencement du genre et même de *Cyphoscelis distorta*, elles diffèrent considérablement de tous les autres *Laparocerus* par leur forme curieusement compacte et plus parallèle, leurs élytres subéchan-crées à la base,

leur rostre épais, subtriangulaire, leurs yeux petits et proportionnellement enfoncés.

36. **L. CANALIROSTRIS.** — *sulcirostris* Wollast. Cat. Can. 1864. 359, 554. — Atlant. 326, 907.

Noir, assez opaque, compacte, peu et obscurément nébuleux de squamules un peu fauves, dépourvu de poils, mais garni de soies très-courtes, couchées, peu visibles. Antennes d'un ferrugineux de poix, 1^{er} et 2^e articles du funicule en cône oblong, à peu près égaux. Rostre court, subtriangulaire, épais, très-finement pointillé, profondément et nettement sillonné. Yeux petits, un peu déprimés. Prothorax un peu conique, finement et parcimonieusement ponctué, très-densément garni d'un pointillé très-fin, léger, dans l'intervalle. Elytres oblongues, parallèles, tronquées-subéchancrées ensemble à la base, saillantes aux épaules, striées-ponctuées; interstries très-finement et très-densément ruguleux, subalutacés. Pattes ferrugineux de poix; jambes simples dans les 2 sexes. — Long. 5,8 mill.

Grande-Canarie; un seul individu dans les montagnes, au-dessus de San-Mateo.

II^e S.-Gre. — **Cyphoscelis** (*κυφόζ, gibbeux; σκελίς, jambe*)

Wollast. Ins. Mader. 1854, 356, 121. Pl. VII f. 2.

Petit, elliptique-ovale, déprimé, finement et densément pubescent.

Yeux oblongs, déprimés.

Rostre court, plan en dessus, atténué et profondément échancré en triangle au bout.

Scrobes larges, allongées, remontant jusqu'au milieu du rostre.

Prothorax déprimé, sinué à la base et tronqué droit au bout, arrondi sur les côtés, rétréci en devant, serré contre les élytres.

Ecusson assez grand, en triangle.

Elytres soudées, ovales, atténuées postérieurement, sinuées et un peu plus larges que le prothorax à la base, saillantes à l'épaule; ailes obsolètes.

Antennes presque comme dans les *Laparocerus*, très-grêles; scape presque droit, brusquement renflé en massue.

Pattes épaisses dans le ♂, plus grêles mais à peine plus courtes ♀; jambes velues et garnies de soies au bout, distinctement crénelées en dedans ♂, sans crénelures, ni crochet apical ♀, antérieures tordues et échancrées en dessous, en forme de casque à l'extrémité ♂, avec un petit crochet interne (obtus et moins marqué à celles de devant et plus aigu et plus fort à celles du milieu); courbées et dilatées en dedans en une bosse arrondie vers la base ♂, simples en dedans et peu visiblement arquées en dedans au bout ♀; postérieures droites dans les 2 sexes, simples ♀, larges, robustes, comprimées ♂, brusquement dilatées en une grande bosse médiane arrondie, très-dilatées au bout et coupées latéralement en dedans, ni échancrées, ni tronquées, ni anguleuses à l'angle apical interne, qui s'arrondit en talon, mais aplaties à l'externe qui est très-aigu; tarses velus.

Ce sous-genre, établi sur une seule espèce, présente tant de caractères qui lui sont propres qu'il n'est pas possible de le confondre avec un autre *Cylomide* de Madère.

37. L. (CYPH.) DISTORTUS Wollast. Ins. Madère, 1854. 357, 275.
Pl. vi f. 2.

Presque elliptique, très-déprimé, noir et densément vêtu d'une pubescence d'un brun d'or ou verdâtre, très-couchée. Rostre court et rétréci antérieurement; striguleux longitudinalement avec un sillon médian (quelquefois remplacé par une légère carénule), visible surtout entre les yeux, qui sont oblongs et déprimés. Prothorax arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au-delà du milieu; points profonds et écartés; avec des traces d'une légère carène sur le disque. Élytres superficiellement striées-ponctuées et garnies de très-petites soies capillaires, courtes, écartées et presque dressées; la pubescence du dessous ayant une très-légère tendance à paraître marquetée, disposition plus ou moins visible dans les espèces voisines. Antennes et tarses d'un roux ferrugineux

pâle; ceux-ci quelquefois subtestacés. Cuisses et jambes plus ou moins couleur de poix.

♂ Pattes larges et robustes; jambes crénelées en dedans, les 4 antérieures concaves en dessous, avec une petite épine dirigée en dedans à l'angle apical interne; les 2 du devant courbées à l'extrémité et légèrement dilatées en dedans vers la base; les intermédiaires moins distinctement; les postérieures élargies en dedans en une large saillie médiane, comprimée, brusquement rétrécies vers leur extrémité, qui est elle-même subitement dilatée en dehors, avec l'angle interne arrondi en un talon obtus et l'externe prolongé en un angle aigu et saillant.

♀ Pattes beaucoup plus menues, très-peu plus courtes, simples; jambes ni crénelées, ni en talon au bout, ni dilatées; les 2 du devant légèrement courbées à leur extrémité.

Propre à l'île de Madère où il paraît rare, dans les forêts élevées, sous les pierres et les troncs d'arbres pendant l'été; Lombo dos Vaccas, Cruzinhas et Lombo dos Pengueros.

III^e S.-Gr^e. — *Atlantis* Wollast. Ins. Mader. (1854.) 361, 123.

Pl. VII f. 3, 4, 5, 6.

Corps médiocre ou petit, ovale ou ovale-oblong, plus ou moins parsemé d'une pubescence assez forte.

Rostre comme dans les *Laparocerus* propres, mais non atténué vers l'extrémité; yeux plus arrondis, saillants.

Prothorax tronqué droit aux deux bouts, arrondi sur les côtés (un peu plus rétréci en devant), pas bien adapté aux élytres.

Ecusson assez grand triangulaire.

Elytres subconnées, ovales-oblongues ou ovales, tronquées et plus larges que le prothorax à la base, arrondies aux épaules; ailes obsolètes.

Antennes longues, assez grêles; scape courbé, renflé vers le bout, excepté dans une espèce, qui n'appartient peut-être pas à ce groupe, où elles sont très-grêles avec le scape droit et renflé subitement en massue au bout; funicule de 7 articles, coniques, 1-2 assez allongés (tan-

tôt l'un tantôt l'autre le plus grand), les autres diminuant de longueur.

Massue en ovale-allongé, composée de 3 articles distincts (peut-être de 4).

Pattes épaisses ♂, plus grêles ♀ mais à peine plus courtes; toutes les jambes très-poilues et peu visiblement garnies de cils sétiformes au bout; ni crénelées en dedans, ni terminées en crochet ♀; antérieures ♂ prolongées en crochet infléchi à l'extrémité interne (souvent obsolète dans les intérieures, distinct dans les intermédiaires, caché dans toutes par les poils et les soies); jambes de devant, dans l'un et l'autre sexe, mais surtout dans le ♂, courbées au bout et à peine distinctement crénelées dans ce sexe, échancrées plus ou moins en arc vers le bout qui est en forme de casque; intermédiaires droites; ainsi que les postérieures simples ♂; très-dilatées au bout et taillées latéralement en dedans ♂, prolongées en lamelle plus ou moins et tronquées obliquement à l'angle apical interne, aplaties à l'angle externe qui est aigu et très-fort; tarses très-velus.

Ce sous-genre, comme le comprend Wollaston, est un groupe d'espèces assez peu homogènes. A côté des espèces normales *lamellipes*, *calculator*, *noctivagans*, *lauripotens*, *australis*, *vespertinus* et *lanatus*, qu'il regarde comme faciles à caractériser, il adjoint d'autres espèces qu'il appelle aberrantes et pour lesquelles il serait peut-être bon de créer des genres. Il les répartit en plusieurs sections :

1° Antennes très-grêles, scape droit brusquement renflé au bout en massue allongée obtuse.

§ 1^{er}. — Corps petit; scrobe très-profonde, courte, auriculiforme, remontant au-dessus du bord supérieur de l'œil; yeux petits, coniques, très-saillants. Faciès bien différent, mais pattes semblables, selon le sexe.

Amphora Wollst.

38. L. (ATL.) CANARIENSIS Bohm. Sch. Curc. vii 1813. 228, 4. (*Laprocerus*.) — Wollast. Cat. Can. 325, 525.

Noir de poix ou obscur, assez luisant, garni de squa-

mules cendrées et de soies dressées sur les élytres. Rostre court, épais, subtriangulaire, avec des points un peu rugueux, une fovéole très-profonde entre les yeux. Ceux-ci petits, un peu coniques, fort saillants. Antennes ferrugineuses, longues, grêles; scape arqué, un peu en massue; 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}, les suivants obconiques allongés, massue ovoïde grêle en pointe. Prothorax plus large que long, convexe avec une carène médiane forte, arrondi sur les côtés, densément et fortement ponctué. Ecusson petit, triangulaire. Elytres ovoïdes, dilatées-atténuées en courbe par derrière et terminées en pointe arrondie, convexes, profondément striées-ponctuées, suture et interstries alternes marquetés de cendré. Pattes oblongues, fortes, d'un ferrugineux obscur. — Long. 5 — larg. 2,3 mill.

♂ Un peu plus petit, plus étroit; prothorax plus densément et plus rugueusement ponctué, moins fortement caréné; élytres en ovale étroit et régulier, plus légèrement striées-crénelées, garnies de soies courtes.

♀ Plus grande et plus large; prothorax moins densément et plus également ponctué, très-fortement caréné; élytres obtriangulaires, à peine plus profondément striées-crénelées, avec des soies plus longues.

Cette espèce est surtout remarquable par ses scrobes courtes profondes, dirigées en haut; par ses yeux en cône oblique, petits, très-saillants, et la grande différence des sexes.

Semble confiné sur les points les plus élevés, à Ténériffe, où il abonde sous les pierres et les détritns, au printemps, de 7 à 9,000 pieds, au milieu des arbustes de *Spartium nubigena*.

§ II. — Tête assez grande; scrobes larges divariquées par derrière; yeux médiocrement saillants; faciès ne variant pas beaucoup selon le sexe, mais pattes plus ou moins différentes.

Canopus Wollst.

38. L. (ALT.) SUBNEBULOSUS Wollst. Cat. Can. 1864. 337, 526.
— Atlant. 309, 852.

Quoique ayant les plus grands rapports de taille et de forme avec le *tibialis*, il est impossible de prendre cet

exemplaire, qui provient de Grande-Canarie, pour une variété locale de cette espèce; car sa surface plus brune et plus mate qui est marquetée, surtout sur les élytres, de petites squamules métalliques pâles, son prothorax plus rugueux, marqué d'une carène centrale qui disparaît en avant, son écusson bien moins petit, les points des stries un peu moindres, les interstries externes des élytres visiblement élevés par derrière, l'en distinguent.

Noir, obscur, marqueté de squamules submétalliques petites et en petit nombre. Rostre parallèle, marqué de points petits et légers, largement concave, avec un sillon mince en devant, en foveole profonde entre les yeux; ceux-ci petits proéminents. Prothorax assez étroit, densément et profondément rugueux-ponctué, muni d'une carène qui disparaît en devant. Ecusson petit. Elytres profondément striées-ponctuées; interstries externes un peu élevés par derrière; antennes et pattes à peine plus claires. — Long. 11,6 mill.

♀ Tarses postérieurs simples.

Grande-Canarie, au printemps.

40. L. (ALT.) TIBIALIS Wollast. Cat. Can. (1864) 338. — *incomptus* Wollast. Atlant. 1865. Append. 55. (*Lichenophagus*.)

Cette grande espèce noire se distingue par sa surface terne et faiblement luisante, son prothorax densément ponctué, son écusson excessivement petit, les points énormes des stries des élytres, les jambes postérieures ♂ dilatées en dedans à l'extrémité.

Noir, peu luisant, à peine visiblement vêtu d'une pubescence très-courte et très-fine; antennes très-longues et très-grêles, ferrugineuses, ainsi que les pattes; scape droit, 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}, les suivants longs; massue étroite, allongée. Rostre strigusement et finement ponctué, concave, avec un sillon, profond entre les yeux, qui sont petits saillants. Prothorax plus large que long, arrondi sur les côtés, plus rétréci en devant qu'à la base avec de gros points serrés. Ecusson très-petit. Elytres échancrées ensemble à la base, arrondies à l'épaule, subparallèles, rétrécies en pointe au bout,

striées de gros points profonds. — Long. 9 — larg. 4,5 mill.

♂ A peine plus étroit, jambes postérieures dilatées-ar rondies au bout.

♀ A peine plus large, jambes postérieures simples.

Sous les pierres et les détritns. Ténériffe, Palma, Hierro.

4. L. (ATL.) TETRICUS Bohm. Sch. Curc. n 1834. 542, 2 (*Erem-nus*). — vii 228, 2 (*Laparocerus*). — Wollast. Cat. Can. 338, 528. — Atlant. 310, 854. — *simplex* Brul. Webb. Col. 1838. 71.

Allongé, noir, assez luisant, presque glabre. Rostre creusé avec les bords latéraux élevés, strigieux pointillé, ainsi que le front, canaliculé finement en devant, profondément entre les yeux, convexes et oblongs. Antennes longues et grêles; scape à peine arqué, épaissi au bout, 2^e article du funicule de moitié plus long que le 1^{er}, les suivants obconiques-oblongs, massue étroite-allongée. Prothorax transverse, légèrement arrondi sur les côtés, plus étroit en devant qu'à la base, avec des points fins sur le dos, forts et plus serrés sur les côtés. Ecusson très-petit. Elytres 4 fois plus longues et plus larges à la base que le prothorax, arrondies à l'épaule, subparallèles sur les côtés, rétrécies et brusquement rabattues au bout; fortement striées de gros points serrés; interstries à peine pointillés, pas plus larges que les stries, 3^e strie réunie avec la 8^e, 3^e interstrie et 9^e en carène subapicale, huméral très-saillant et très-tranchant. Cuisses claviformes; jambes arquées vers l'extrémité. — Long. 10 — larg. 4 mill.

♂ Un peu plus étroit, jambes postérieures élargies au bout, avec une échancrure subapicale.

♀ Un peu plus large, jambes postérieures simples.

Se reconnaît aisément du *tibialis*; plus petit et plus étroit, plus noir et plus luisant, son prothorax plus convexe, à points plus fins et plus espacés sur le disque, son écusson moins petit, ses élytres moins échancrées ensemble à la base, les points des stries moins gros et les jambes postérieures ♂ plus fortement échancrées au bout en dedans.

Ténériffe, autour de Santa-Cruz; sous les pierres, etc.

42. L. (ATL.) GRAYANUS Wollast. Atlant. 1865. 310, 855. — *angustus* Wollst. An. Hist. nat. xi 1863. 219. — Cat. Can. 339, 529.

Etroit subcylindrique, noir, un peu luisant, finement pubescent, et garni sur les élytres de longs poils dressés. Rostre assez épais, ponctué, sans excavation. Yeux arrondis, saillants. Prothorax convexe, subsinué et distinctement rebordé à la base, assez profondément subruguleux ponctué, peu densément parsemé de petits points très-distincts dans l'intervalle. Elytres subcylindriques, profondément striées-ponctuées; antennes et tarses couleur de poix; cuisses et jambes noires. — Long. 7 à 10,3 mill.

A peu près semblable dans les 2 sexes.

Propre à la Grande-Canarie, où il est répandu à des hauteurs intermédiaires.

On peut le reconnaître immédiatement à sa forme plus étroite et subcylindrique, sa couleur d'un noir intense, et sa surface finement pubescente; à son rostre beaucoup plus épais, non excavé en dessus, comme dans les 3 précédents, ses yeux saillants, son prothorax un peu convexe et rudement ponctué, rebordé fortement le long de la base, et les différences sexuelles nulles.

Trouvé un seul exemplaire ♀ sous une pierre sur les montagnes de Madère, au printemps. Il a les antennes analogues à celles des *Lupatrocerus*, cependant il va mieux dans le genre *Atlantis*, sans présenter tous les caractères des 7 espèces qui constituent ce genre proprement dit. Il est difficile de prononcer d'après un seul individu, s'il est bien à sa place ou s'il ne devrait pas faire un genre à part.

2° Antennes moins grêles, scape courbé, épaissi vers le bout, massue d'ordinaire obovale-oblongue.

§ III. — Elytres parsemées de longs poils additionnels. Pattes plus épaisses ♂ que ♀; jambes armées plus ou moins distinctement vers le bout (d'une épine en forme de talon dans les postérieures), postérieures dilatées.

Atlantis propres.

43. L. (ATL.) LAMELLIPES Wollst. Ins. Mader. 1854. p. 361, 278. Pl. vu f. 5. — Cat. Mad. 113. — Atlant. 310, 856.

Ovale-allongé, noir de poix, densément varié d'une pu-

bescence forte, couchée, brun-verdâtre terne, et jaunâtre sale. Rostre légèrement dilaté au bout; presque impunctué, avec un étroit sillon longitudinal plus visible entre les yeux. Prothorax ayant sa plus grande largeur à peu près au milieu ou quelquefois un peu derrière; à points un peu écartés mais distincts. Elytres striées-punctuées, garnies de poils supplémentaires allongés, dressés, raides, assez rares (plus nombreux et plus longs par derrière); interstries alternes marquetés longitudinalement de fascicules de poils plus noirs. Antennes allongées, ferrugineuses; 1-2 articles du funicule égaux (ou le 1^{er} plus long que le dernier). Pattes plus ou moins obscures, ou brun de poix; tarses ferrugineux-brun; dernier article roux-testacé avec les ongles noirs.

♂ Pattes larges et robustes; 2 jambes de devant avec l'épine apicale obsolète, crénelées en dedans, subitement et grandement échancrées vers le bout, qui est lui-même très-courbé. Intermédiaires avec l'épine à peine visible, triangulaire, placée derrière l'extrémité, avec des crénelures obsolètes, et l'extrémité légèrement courbée; postérieures très-faiblement étranglées vers le bout, qui est fortement et subitement dilaté en dehors, et tronqué ou en talon à l'angle interne et formant presque un angle droit, tandis qu'il forme une saillie très-longue et acuminée à l'externe. L'ensemble formant une surface triangulaire.

♀ Un peu plus large; pattes plus menues, pas plus courtes et simples; jambes postérieures très-légèrement avancées à leur angle apical externe. — Long. 11,6 à 13 mill.

Se reconnaît aisément à sa taille gigantesque, ses antennes allongées, sa pubescence d'un vert jaunâtre sale variée, la force et l'espacement de ses longs poils additionnels, et la régularité des marquettures noires des interstries alternes.

Propre à Madère. Il se trouve sur les hauteurs et est plus répandu à la limite extrême des districts forestiers. Il vit en foule sous les écorces, dans les mousses et les lichens, d'où il ne sort pas pendant le jour; il devient très-agile la nuit, comme ses congénères. Il paraît plus abondant pendant l'été; il hiverné également.

44. L. (ATL.) CALCATOR Wollst. Ins. Mad. 1854. 366, 279. — Cat. Mad. 113. — Atl. 311, 857.

Ovale-allongé, proportionnellement un peu plus étroit que le précédent, couleur de poix et densément varié d'une pubescence forte, couchée, verdâtre, vert-doré, et quelquefois légèrement cuivreuse, avec des reflets plus ou moins métalliques. Rostre légèrement dilaté au bout; presque impondué, avec un étroit canal longitudinal, particulièrement visible entre les yeux. Prothorax ayant sa plus grande largeur après le milieu, et obsolètement pointillé. Elytres un peu finement striées-punctuées; garnies rarement de poils additionnels allongés, dressés (plus nombreux et plus longs par derrière); variées confusément de squamules plus ou moins brillantes; interstries alternes pas beaucoup moins réguliers que dans le *lamellipes*. Antennes plus courtes que celles de ce dernier, et roux-ferrugineux; 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}, massue ovale-oblongue. Pattes plus ou moins testacé-brunâtre, ou d'un brun de poix; tarses plus pâles, dernier article roux-testacé. — Long. 10,3 à 11 mill.

♂ Pattes larges et robustes; jambes de devant menues; épine apicale obsolète, très-peu crénelées en dedans, entières, étroites dans toute leur longueur et à peine courbées vers l'extrémité, qui est elle-même légèrement courbée; intermédiaires avec l'épine grande et robuste et aussi courbée au bout; postérieures rétrécies avant le bout, qui est brusquement et fortement prolongé en dehors, avec l'angle interne obliquement tronqué, en forme de talon saillant en forme de doigt ou de ponce, l'interne en saillie excessivement avancée et aiguë. — ♀ Plus large, pattes plus grêles, quoique aussi longues et simples.

Madère. Rare; dans les mêmes conditions que *lamellipes*.

Tient le milieu entre celui-ci et *noctivagaus*, mais il est plus voisin du dernier, par la brièveté de ses antennes, les détails de sa couleur et de sa sculpture, l'épine apicale des jambes intermédiaires robuste; il s'en distingue cependant outre les caractères des jambes ♂, par sa taille plus grande, sa surface moins profondément ponctuée et par la massue antennaire plus grêle.

45. L. (ATL.) NOCTIVAGANS Wollst. Ins. Mader. 1854. 367. 280. Cat. Mad. 114. — Atlant. 311. 858. — *lauripotens* Wollst. 369, 281 et *australis* Wollast. 370, 282.

Ovale-allongé, noir de poix (quelquefois plus ou moins ferrugineux), varié densément d'une pubescence forte ou fine, couchée, verdâtre, vert-doré ou quelquefois cuivreuse, avec des reflets plus ou moins métalliques. Rostre et prothorax comme dans le *calcator*, mais plus distinctement ponctués. Elytres comme dans le *calcator* d'ordinaire varié d'une manière un peu plus éclatante; interstries alternes beaucoup moins régulièrement marquetés que dans le *lamelipes*; quelquefois les marquetures ne sont bien distinctes que postérieurement, et l'on observe des poils allongés, dressés, additionnels. Antennes et pattes comme dans le *calcator*, mais le 2^e article du funicule est d'ordinaire plus long que le 1^{er}, et la massue un peu plus étroite et elliptique. — Long. 8 à 10,3 mill.

♂ Pattes larges et robustes. Jambes de devant avec une épine obsolète, très-peu crénelées en dedans, graduellement et légèrement arquées vers l'extrémité, qui est courbée; intermédiaires avec une épine large et forte, et courbées légèrement à l'extrémité; postérieures resserrées vers le bout, qui est soudainement et fortement saillant en dehors et obliquement tronqué à son angle interne en une sorte de talon plus ou moins aigu, et à l'externe en une saillie forte et aiguë, quoique moins proéminente que dans les précédents.

♀ Plus large; pattes plus grêles, quoique pas plus courtes et simples.

Propre à Madère, sur les feuilles des lauriers, presque à toutes les élévations. Insecte variable non-seulement en formes et en couleurs, mais dans le développement du talon ♂, qui est plus saillant et acuminé dans les exemplaires qui vivent dans des lieux plus élevés. Capturé abondamment sous les écorces et les mousses pendant le jour, en été et en automne.

NOTA. Après avoir admis comme espèces distinctes les individus qui fréquentent les lieux élevés et ceux qui vivent dans les vignobles des environs de Funchal, où ils sont très-abondants et causent de grands dégâts aux vignes, M. Wollaston les avait réunis en une seule espèce

et ne les considérait que comme des variations locales. Dans un Mémoire publié tout récemment dans les *Transactions de la Société entomologique de Londres*, il revient à ses opinions primitives et admet deux espèces malgré leur similitude extrême :

1° LAURIPOTENS Woll. Ins. Mad. 1834. 369. — *australis* W. id. 370. — *noctivagus* (pars.) Col. Cat. Mad. 1837. 114. — Vignes des environs de Funchal.

2° NOCTIVAGANS Woll. Ins. Mad. 1834. 367. — Montagnes de Madère.

46. L. (ATL.) VESPERTINUS Wollast. Ins. Mader. 571, 283. Pl. vii f. 4. 1854. — Cat. Mad. 114. — ? *piceus* Gyl. Sch. Curc. n 1831. 531 (*Laparocerus*).

Subovale-oblong, moins acuminé en devant qu'aucune autre espèce, plus ou moins luisant et couleur de poix, et garni parcimonieusement d'une pubescence couchée un peu cendrée. Rostre court et large, nullement dilaté au bout, avec des strigosités longitudinales et un sillon central surtout visible entre les yeux. Prothorax convexe, presque également arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, densément et plus ou moins profondément ponctué. Elytres légèrement striées-ponctuées, plus ou moins parcimonieusement garnies de poils additionnels allongés, presque dressés, qui ont quelquefois une tendance à se disposer en séries; interstries avec une très-faible tendance à former des marquetures de taches plus épaisses de poils un peu cendrés. Antennes courtes, menues, ferrugineux-brunâtre; 2^e article du funicule pas distinctement plus long que le 1^{er}. Pattes comme dans le précédent (*australis*). — Long. 7 à 8,3 mill.

♂ Pattes plus larges et plus robustes; les jambes antérieures avec l'épine apicale obsolète, peu visiblement crénelées en dedans, à peine échancrées vers le bout qui est courbé faiblement; intermédiaires avec une épine distincte et très-légèrement courbées à l'extrémité; postérieures non rétrécies vers l'extrémité qui est brusquement dilatée et tronquée obliquement à l'angle interne, légèrement acuminée à l'externe.

♀ Généralement un peu plus grande : pattes plus grêles, mais pas plus courtes, simples.

Son rostre court, large, non excavé et strigueux dans sa longueur, son prothorax convexe et également arrondi, sa pubescence moins serrée et ses habitudes non forestières, le rattachent aux *Laprocercus*. Il est probable que c'est le *Laprocercus piceus* de Schöenherr, qui n'a pas encore été trouvé en Portugal.

Commun dans les régions élevées de Madère, sous les pierres des coqueux herbacés et montant jusqu'au sommet des pins.

47. L. (ATL.) LANATUS Wollast. Mader. 1854. 372, 284. Pl. vi f. 6.
— Cat. Mad. 114, 330. — Atlant. 312, 860.

Ovale-allongé, noir de poix ou brun de poix, parcimonieusement vêtu d'une pubescence forte, couchée, brun-cendré ou cendrée. Rostre faiblement dilaté au bout, plus distinctement sculpté, substriguleux, avec un profond canal médian entre les yeux. Antennes longues et extrêmement robustes; scape ferrugineux terne, le reste plus ou moins rembruni ou de poix; 2^e article du funicule bien plus long que le 1^{er}. Prothorax ayant sa plus grande largeur au-delà du milieu, couvert de points espacés et vagues, extrêmement grands et quelquefois profonds, avec de très-petits points superficiels dans l'intervalle. Elytres profondément striées-ponctuées, deasément garnies de poils très-longs, dressés, extrêmement fins, blancs, qui sont beaucoup plus mous que dans aucune autre espèce; interséries alternes marquetés d'ordinaire de taches plus denses de cette pubescence. Pattes plus ou moins testacé-brunâtre, ou de poix obscur; tarses plus pâles, dernier article d'un roux testacé. — Long. 9 à 10 mill.

♂ Pattes à peine plus robustes. toutes les jambes armées d'une petite épine aiguë tout près de l'extrémité interne; les 2 antérieures fortement arquées vers l'extrémité, les 4 postérieures étroites, les 2 dernières entièrement simples, sans dilatation apicale.

♀ Un peu plus grande, jambes un peu plus grêles, mais pas plus courtes et simples.

Cette espèce diffère de toutes les autres du genre, non

seulement par ses longs poils dressés cotonneux, par sa surface profondément sculptée, par l'épaisseur et la force des antennes qui ont le 2^e article du funicule beaucoup plus long que le 1^{er}, et par la petite épine aiguë des jambes ♂.

Abonde sur la limite des régions boisées de Madère.

48. L. (ATL.) NAVICULARIS Wollast. Madère, 1851. 374, 285. — Cat. Mad. 114, 331. — Atlant. 312, 861.

Ovale-allongé, roux de poix, parcimonieusement varié d'une pubescence forte, couchée, verte et dorée ou vert-doré, avec un reflet métallique. Rostre et prothorax comme dans le précédent. Le dernier un peu plus distinctement caréné au milieu, mais avec le même genre de ponctuation, c'est-à-dire de gros points entremêlés de petits; le dernier ayant des stries radiées divergentes. Antennes un peu longues et grêles, roux-ferrugineux; scape grêle à la base, soudainement épaissi au bout; 1^{er} et 2^e articles presque d'égale longueur. Elytres subparallèles après la base, profondément striées-ponctuées, sans poils additionnels, si ce n'est à l'extrémité où il y en a quelques-uns assez longs, dressés et très-mous ou soyeux; resserrées de chaque côté vers l'extrémité, ce qui rend la suture proéminente et carénée et donne au corps la forme naviculaire; interstries alternes assez distinctement marquetés de taches condensées d'une pubescence vert-doré. Pattes plus ou moins roux-ferrugineux, extrêmement poilues et simples dans les 2 sexes; tarses à dernier article roux-testacé. — Long. 8 à 8,3 mill.

Cette espèce aberrante se reconnaît tout d'un coup à l'absence de longs poils dressés sur les élytres, excepté à l'extrémité, et par les pattes semblables dans les 2 sexes; quant aux squamules larges, vert-doré, dont il est marqué, il se rapproche du type de cette division, mais il s'en distingue par les points écartés de son prothorax et par les longs poils dressés, soyeux, de l'extrémité des élytres, et la forme naviculaire produite par l'élévation en carène de la suture le sépare de toutes les espèces. Le scape grêle des antennes le fait ressembler à *Purconstans*

dont le séparent, ainsi que de *l'instabilis*, les 2 1^{ers} articles du funicule également longs. C'est avec le *clavatus* qu'il a le plus d'affinité.

Pris en décembre sous les pierres, à Porto-Santo.

49. L. (ATL.) INCONSTANS Wollast. Madère, 1854. 375, 286. — Cat. Mad. 115, 332. — Atlant. 312, 862.

Un peu ovale-allongé, noir de poix ou brun de poix, parcimonieusement varié d'une pubescence fine, inclinée, d'un cendré cuivreux ou verdâtre, d'une nature très-variable, mais généralement reflétant un éclat métallique plus ou moins obscur. Rostre et prothorax comme dans cette espèce, si ce n'est que le dernier a sa plus grande largeur vers le milieu et non un peu derrière, il est beaucoup plus densément ponctué, les points ayant généralement une faible tendance à rayonner comme dans celui-ci, mais sans points intermédiaires visibles. Antennes d'un ferrugineux ou testacé-obscur; scape généralement un peu plus pâle et un peu plus grêle; le 2^e article du funicule distinctement plus long que le 1^{er}. Elytres assez profondément striées-ponctuées, sans poils additionnels, si ce n'est à l'extrémité, où il y a quelque peu de soies très-courtes ou de poils raides; interstries alternes très-obtusément marquées de pubescence condensée, parfois cependant plus distinctement par derrière, où la suture est de temps en temps un peu plus pâle ou tachetée plus que dans la plupart des autres espèces. Pattes assez allongées, variant du rouge ferrugineux au testacé, et simples dans les 2 sexes; tarses avec leur dernier article d'un testacé-roux. — Long. 8 à 10,3 mill.

L'inconstans se reconnaît à sa grande taille et à sa surface obscurément marquée, à son prothorax densément ponctué, ses pattes un peu allongées et son scape assez grêle à la base. Il se rapproche de *l'instabilis* par le 1^{er} article du funicule distinctement plus court que le 2^e, mais il en est séparé par son volume plus grand, ses membres plus longs et la base de ses antennes moins robuste.

A Porto-Santo, dans les mêmes conditions que le précédent.

50. L. (ATL.) MENDAX Wollast. Mad. 1851. 376. — Cat. Mad. 115, 333. — Atlant. 313, 863.

Ovale-allongé et un peu étroit en devant, couleur de poix et plus ou moins densément vêtu d'une pubescence assez forte, inclinée, cendrée ou un peu cendré-verdâtre. Rostre et prothorax comme dans l'*inconstans*. Prothorax ayant sa plus grande largeur moins juste au milieu, plus profondément, pas si densément ponctué, les grands points ne formant pas de lignes radiées et les petits dans l'intervalle un peu plus distincts que dans cette dernière espèce. Elytres moins profondément striées-ponctuées et vêtues de squamules ou d'une pubescence un peu plus forte et plus pâle, avec moins d'éclat métallique. Antennes et pattes comme dans cette espèce, excepté que celles-là sont un peu plus courtes et ont le scape beaucoup plus robuste à la base et plus courbé, et les 2 1^{ers} articles du funicule à peu près égaux. — Long. 7,6 à 9,3 mill.

Pour la taille il tient le milieu entre l'*inconstans* et l'*instabilis*, et se rapproche des 2 pour sa forme générale. Mais sa forme un peu acuminée en devant, la force de ses squamules et de son scape et l'égalité des 2 1^{ers} articles du funicule prouvent assez que c'est une bonne espèce et non pas une forme locale de l'un ou de l'autre.

Propre à Porto-Santo, où il se trouve avec le précédent, mais plus rare.

51. L. (ATL.) INSTABILIS Wollast. Mad. 1851. 377, 288. — Cat. Madère, 115, 334. — Atlant. 313, 864.

Ovale plus ou moins allongé ou ovale, brun de poix ou ferrugineux, assez densément vêtu d'une pubescence inclinée, fauve-cendré ou un peu cendrée, qui a parfois une teinte brunâtre-doré, mais rarement mélangée de vert. Rostre et prothorax comme dans le *mendax*, le dernier peut-être un peu plus densément, quelque aussi profondément ponctué. Elytres striées-ponctuées, dépourvues de longs poils additionnels, si ce n'est à l'extrémité où il y a de très-courtes soies ou poils raides en très-petit nombre; interstries alternes plus ou moins indistinctement marquetés de pubescence concentrée, mais quelquefois si fai-

blement qu'ils paraissent non marquetés. Antennes et pattes comme dans le *mentax*, si ce n'est que le scape n'est pas tout-à-fait aussi robuste, quoique beaucoup plus épais à la base que dans l'*inconstans*, avec le 2^e article du funicule un peu plus long que le 1^{er}. — Long. 4,6 à 7,3 mill.

Une des espèces les plus communes et des plus variables de Porto-Santo; à peine trouve-t-on 2 individus parfaitement semblables.

Les élytres passent par tous les degrés de marqueterie, jusqu'à la pubescence d'un cendré brunâtre uniforme. Il se reconnaît toujours du *mentax* et des espèces précédentes les seules avec lesquelles il puisse se confondre, par sa taille beaucoup plus petite et par le 2^e article du funicule visiblement plus long que le 1^{er}. Sous ce rapport, il a quelques rapports avec l'*inconstans*, mais outre sa petite taille, il en est abondamment séparé, non-seulement par la force et la courbure du scape et par ses pattes plus courtes, mais encore par la différence de sculpture, de couleur et de forme.

52. L. (ATL.) EXCELSUS Wollast. Mad. 1854. 378, 289. — Cat. Mad. 115, 335. — Atlant. 313, 865.

Ovale, convexe, brun de poix foncé, densément varié d'une fine pubescence inclinée, brun-verdâtre ou un peu olivâtre, avec un éclat doré-terne. Antennes assez grêles et ferrugineuses; scape très-légèrement courbé, menu à la base et brusquement épaissi à l'extrémité, 1^{er} et 2^e articles du funicule à peu près égaux. Rostre court, à peine dilaté au bout, strigueux longitudinalement, avec un canal médian entre les yeux, quelquefois remplacé en devant par une ligne légèrement élevée, ou carène. Prothorax court, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, transversalement convexe au-delà, avec la marge antérieure souvent un peu élevée; densément et un peu grossièrement ponctué et généralement plus distinctement caréné au milieu que dans aucune autre espèce. Elytres striées-ponctuées ou plus exactement peut-être crénelées, dépourvues entièrement de longs poils dressés; interstries alternes plus ou moins distinctement marquetés de pubescence

condensée. Pattes comme dans le précédent, mais un peu plus grêles. — Long. 5,6 à 8 mill.

Var. Garni partout de soies raides très-courtes.

On ne peut le confondre qu'avec le *Schaumi*, qui a comme lui les 2 1^{ers} articles du funicule des antennes égaux et en outre jusqu'à un certain point sa forme convexe et ovale. Il s'en distingue par le scape droit et plus brusquement en massue, par le rostre plus épais et moins divergent au bout, par le prothorax plus court, plus large et plus profondément sculpté, par ses élytres plus acuminées postérieurement qui, non-seulement sont plus densément couvertes et marquetées de squamules, ont les stries crénelées plutôt que ponctuées, mais encore manquent totalement de longs poils dressés, qu'on voit sur le quart postérieur des espèces précédentes. La pubescence est plus dense et d'une couleur différente, d'un brun doré ou olivâtre terne uniforme et sans le reflet métallique vert brillant qui caractérise le *Schaumi*. Ses habitudes sont aussi toutes différentes. C'est une espèce des forêts, alpine, diurne et solitaire, tandis que l'autre se trouve en société sous les pierres, sur les pentes des montagnes, et n'erre jamais que la nuit.

Il n'est pas rare au printemps dans les régions boisées de Madère, en battant les feuilles des lauriers. Il s'étend de 4 à 5,000 pieds au-dessus de la mer.

Sa variété représente le *Cyphosecelis distorta*, insecte qui a des mœurs analogues. Elle est rare.

53. L. (ATL.) SCHAUUMI Wollast. Mad. 1854. 379, 230. — Cat. Can. 415, 336. — Atlant. 313, 868. — *Forêt* Mad. 1854. 380, 291.

Ovale, convexe, brun de poix obscur, très-parcimonieusement varié d'une pubescence forte, inclinée, verdâtre ou vert-doré, avec un reflet métallique. Rostre moins épais que dans l'*exceclsus* et plus divergent au bout. Prothorax ni si court ni relativement si large, beaucoup moins profondément ponctué et ayant sa plus grande largeur moins juste au milieu. Elytres plus nettement striées-ponctuées, subglobuleuses et plus brusquement raccourcies par derrière, très-distinctement parsemées de poils raides, dres-

sés, surnuméraires vers la partie postérieure; interstries alternes à peine marquetés, quoique assez distinctement dans les individus très-frais, par derrière où les squamules reflètent plus ou moins un éclat verdâtre-doré. Antennes et pattes comme dans l'*excelsus*, excepté qu'elles sont un peu plus robustes, particulièrement le scape qui est aussi plus courbé et moins subitement renflé en massue à l'extrémité. — Long. 5,6 à 7 mill.

Cap de Saint-Laurent, de Madère et Pic de Castello, de Porto-Santo, où il est fort abondant en mai et avril.

Le *Fora* a été établi sur un petit individu trouvé dans une petite île, près du cap Saint-Laurent, Ilheo de Fora.

54. L. (ATL.) *ANGUSTULUS* Wollast. Cat. Mad. 1857. 116, 339 (*Omius*). — Atlant. 314, 867.

Ovale-allongé, un peu étroit, acuminé en devant et arrondi par derrière, d'un noir brunâtre ou de poix, densément vêtu d'une pubescence forte, inclinée, cendrée. Antennes ferrugineux-brunâtre. Rostre grossièrement ponctué, un peu plus rétréci au bout que dans les suivants, avec les yeux un peu moins saillants. Prothorax profondément ponctué, arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu. Elytres moins convexes que dans les suivants, plus rétrécies, avec les côtés plus étroits, ayant leur plus grande largeur derrière le milieu; striées-ponctuées, presque sans longs poils surnuméraires, peu distinctement marquetées. Pattes ferrugineux-brunâtre. — Long. 4,6 à 5 mill.

Très-voisin du *ventrosus*, mais il en est, je crois, bien distinct.

Sur la pente des montagnes, au-dessus de Funchal (Madère), sous les pierres.

55. L. (ATL.) *VENTROSUS* Wollast. Madère. 1854. 382, 292 (*Omius*). — Cat. Mad. 115, 337. — Atlant. 314, 868.

Subovale, noir ou noir de poix, densément vêtu d'une pubescence forte, couchée, d'un cendré brunâtre terne. Antennes, ainsi que les pattes, d'un ferrugineux brunâtre terne, en partie plus ou moins rembrunies. Rostre court,

épais, grossièrement ponctué. Yeux assez saillants. Prothorax profondément ponctué, arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur vers ou un peu après le milieu. Elytres pas très-convexes, généralement avec leur plus grande largeur un peu après le milieu, striées-ponctuées, garnies partout de poils additionnels un peu dressés, robustes, excessivement courts, quelquefois à peine visibles; interstries alternes marquetés de taches de pubescence condensée. — Long. 3,6 à 4,6 — larg. 2 mill.

Insecte commun, sous les pierres, sur les places élevées des montagnes de Madère. Il se rencontre souvent au printemps et en hiver à profusion, en compagnie de *Atlantia respertina*, *Tarus Maderæ*, *Anthicus Lubbocki*, et certaines autres espèces.

56. L. (ATL.) *ÆNESCENS* Wollast. Mad. 1854. 383, 293 (*Omius*).
— Cat. Mad. 115, 338. — Atlant. 314, 869.

Un peu plus rond et plus ovale que le *ventrosus*, généralement plus noir de poix, avec une teinte distinctement bronzée, assez luisant, parcimonieusement vêtu d'une pubescence robuste, couchée, cendrée, ou d'un cendré cuivreux. Antennes, ainsi que les pattes, d'un roux ferrugineux ou presque testacées. Rostre et prothorax comme dans cette espèce, si ce n'est que les yeux sont peut-être un peu moins proéminents et le prothorax un peu plus cylindrique, étant moins arrondi sur les côtés et pas tout-à-fait aussi large au milieu. Elytres plus renflées et plus convexes, ayant leur plus grande largeur vers ou juste avant le milieu, striées-ponctuées, densément garnies partout de poils additionnels dressés, assez longs, mous ou soyeux (bien plus mous et plus longs que dans le *ventrosus*); interstries alternes à peine visiblement marquetés dans leur longueur. Pattes un peu plus robustes, comparativement à celles de celui-ci. — Long. 3,3 à 4 mill.

Propre aux points les plus élevés de Madère, avec le précédent, tout aussi commun.

Il en diffère surtout en ce qu'il est un peu plus petit, plus luisant et bronzé, son prothorax, un peu plus cylindrique, est beaucoup plus profondément et moins densément ponctué, ses yeux un peu moins saillants et ses pattes un peu plus rougeâtres et plus robustes, les poils

additionnels dressés sont généralement plus mous et plus longs.

57. L. (ATL.) WATERHOUSEI Wollast. *Mad.* 1854. 384, 294. Pl. VII f. 8. — *Cat. Mad.* 116, 340. — *Atlant.* 315, 870.

Ovale-subglobuleux, très-convexe et régulièrement arqué en dessus, sans dépression à la jonction du prothorax et des antennes, noir intense, avec une teinte bleuâtre ou verdâtre à peine visible, brillant et presque glabre, finement pointillé sur toute sa surface. Antennes, ainsi que les pattes, roux-ferrugineux. Rostre très-court et épais, considérablement atténué vers le bout, plus grossièrement ponctué que le reste, substrigueux longitudinalement, canaliculé au milieu. Yeux très-déprimés. Prothorax subconique, ayant sa plus grande largeur à la base, sans apparence de ligne dorsale, avec très-peu de squamules opalines, blanc-verdâtre ou vert-doré, semées sur les côtés. Elytres renflées et convexes, ayant leur plus grande largeur vers le 1^{er} quart, légèrement striées-ponctuées, dépourvues de poils ou soies dressés, mais avec quelques squamules éparses comme celles du prothorax, généralement visibles au bout et à la base, surtout dans la région humérale. — Long. 3,3 à 4,6 mill.

Var. Plus grand et plus ovale, un peu moins luisant, et les élytres plus légèrement sculptées, plutôt avec des lignes de points qu'avec des striées-ponctuées.

Sa couleur d'un noir intense, sa surface presque glabre, très-polie, finement pointillée, très-convexe et en arc régulier, jointe à son prothorax court, conique, et son rostre acuminé, ne permettent pas de le confondre.

Pas rare sous les pierres, à des élévations intermédiaires (3 à 4,000 pieds) de Madère et Deserta grande.

XXII. — OMIAS (ὀμίζ, *épaule*) (Germ.) Sch. *Disp. Curc.* 1826.

190. 406. — *Spec. Curc.* n 496. — *Lard. Gen.* 186. — *Seidl.*

Otiar. 50. 30.

Scrobs lateralis aut subsuperna, subapicalis aut submediana.

Rostrum longius, crassum, supra planum aut impressum aut elevatum. Thorax longitudine parum latior.

Elytra subglobosa aut ovata aut oblonga.

Corpus glabrum aut pilosum, nitidum aut opacum.

Femora mutica, unguiculi connati, æquales aut uno deficiente.

Abdominis segmentum 2^{um} antice angulatum sequentibus longius.

Le genre *Omius* renferme des espèces moins homogènes que le genre *Barypeithes*, et ce qui le caractérise surtout, c'est le manque des caractères de ce dernier. Plusieurs espèces, telles que *rufipes*, *mollinus*, ont une grande ressemblance avec les *Myllæus*.

Les scrobes antennaires sont arrondies comme dans les *Myllæus*; placées non en dessus du rostre mais tout-à-fait ou presque latérales comme dans les *Barypeithes*, elles ne sont pas nettement courbées en bas. Le rostre est épais, plus long que dans les *Myllæus*, plan en dessus ou enfoncé, ou élevé entre les antennes (*forticornis*). Antennes d'ordinaire grêles, avec le scape faiblement courbé, et la massue courte et pointue, seulement le *forticornis* les a plus robustes avec la massue plus obtuse.

Prothorax toujours plus large, mais non 2 fois aussi large que long, arrondi sur les côtés et plus ou moins luisant, rugueux seulement dans le *forticornis*. Elytres tantôt en ovale court et très-convexes, tantôt allongées (*concinus*, *metallicus*, *forticornis*); glabres et très-luisantes, ou avec des poils espacés, ou avec une double pubescence (*mollinus*), ou simplement garnies de courtes soies (*forticornis*). Cuisses inermes; tarses avec 2 ongles soudés, seulement avec un (*Haudli*). 2^e segment abdominal plus long que les 2 suivants ensemble et sa suture avec le 1^{er} anguleuse.

Schönherr a établi le genre *Omius*, dont le nom est dû à Germar, en 1826, dans sa *Dispositio systematica*, et l'a partagé en 4 races d'après la forme des antennes. Plus tard, dans son 2^e volume des *Genera et species Curculionidum*, il y a substitué une autre division, basée sur la présence ou l'absence de l'écusson : méthode qui n'est pas

plus naturelle que la 1^{re}. La 1^{re} race surtout est formée d'éléments hétérogènes. Des 19 espèces qu'elle comprend, 9 appartiennent au genre *Mylicus*, 3 aux *Platytarsus* (*hirsutus*, *villosulus* et *pruinatus*), 1 (*ruficollis*) aux *Earypæithes*, et 6 (*rufipes*, *Bohemanni*, *strigifrons*, *mollisus*, *gracilipes* et *rugicollis*) aux *Omiæ*. La 2^e race est beaucoup plus homogène, car à l'exception de 6 qui appartiennent au genre *Omiæ*, tous les autres sont de vrais *Barypæithes*.

Les 6 espèces d'*Omiæ* de la 2^e race sont *nitidus*, *convinnus*, *parvulus*, *sericeus*, *oblongus*, *forticornis*, qui avec les 6 de la 1^{re} race font 12, dont la moitié ne sont que des synonymes. Ainsi, le genre *Omiæ*, qui pour Schœnherr se compose de 36 espèces, se répartit en 4 genres : 9 *Mylicus*, 3 *Platytarsus*, 12 *Barypæithes* et 12 *Omiæ*.

Des espèces publiées depuis *Omiæ hamatopus* Rosh. et *indutus* Kiesw. appartiennent aux *Mylicus*; *O. cinerascens* Rosh., *curvimanus* J. Duv., *montanus* Chevrol., aux *Barypæithes*; *validicornis* Mærkel, *Raymondi*, *Marqueti* Gaut. Des *C. mandibularis* Chevrol. et *Hanaki* Friv., aux *Omiæ*, les 4 1^{ers} comme synonymes. Probablement il faut ranger parmi les *Omiæ*, *O. rugifrons* et *illotus* Hoch., ainsi qu'*inflatus* Kolent.; au contraire, *elongatus* Hoch. parmi les *Stomodes*. — Mais à quel genre se rapportent *O. interpunctatus* de Baschirie et *scabripennis* de Turemenie (Ménét. Ins. Lehm. Pet. vin 1849. p. 260), c'est ce qu'il est difficile de dire, parce que les scrobes ne sont pas décrites. Cependant le 1^{er} paraît être un *Omiæ*, parce qu'il ressemble au *Bohemanni*; le 2^e, si l'on considère les granules pointus des élytres, est probablement un *Otiærhynchus*, quoiqu'il puisse être tout aussi bien un *Omiæ* ou un *Earypæithes*.

Omiæ tessellatus Brul. Canar. 1838, 71, appartient, selon toute apparence, ainsi qu'*O. ventrosus*, *anescens*, *Waterhousei*, *angustulus* Wollst. au genre *Laparocerus*. *O. crinitus* Redt. Hugels Kaschmir iv 340, n'est pas un *Omiæ*, mais doit se placer parmi les *Cyphicerides*. Kraatz a reconnu (Stett. Zeit. 1836. 179) que l'*O. neglectus* Brems (Stett. Zeit. 1835. 200) est identique au *Licsonus exatulus*. *Omiæ lepidotus* Perris (Soc. Ent. France 1836. 190), ne peut pas être un *Omiæ* à cause de sa squamosité dense. Il est fort difficile de reconnaître si c'est un *Platytarsus*, un *Ptochus*

ou même un *Fowcartia*, ou peut-être le *Sciaphilus bellus* Rosenh., car la description ne nous dit rien de la forme des serobes.

Des nombreuses espèces de Schönherr, il n'en reste donc que 6 de valides; des 8 publiées depuis, 3 n'étant que des synonymes, il en reste 3 dont 2 encore douteuses; Seidlitz en décrit 3 nouvelles, ce qui en porte le nombre total à 12.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

- A Rostre non élevé, prothorax plus finement ponctué.
- B Elytres glabres, très-luisantes.
- C Tarses à un seul ongle; rostre un peu dilaté vers l'extrémité, sillonné jusqu'au front; épaules nulles.
 - 1. *Hanaki* Friv. Hong.
- C' Tarses à 2 ongles; épaules arrondies.
- D Rostre rétréci à la base, beaucoup plus étroit que la tête. Écusson non visible.
 - 2. *rufipes* (*rufipes* Bohm. S.) Carint.
- D' Rostre non rétréci à la base; écusson visible.
- E Rostre atténué vers l'extrémité, convexe, impressionné seulement au bout. 3. *nitidus* Bohm. S. R.
- E' Rostre peu dilaté vers l'extrémité, avec une impression limitée par un rebord aigu.
 - 4. *micans* Seidl. F.
- B' Elytres pubescentes.
- C Front non strigueux.
- D Rostre séparé du front par une impression transverse; pubescence fine couchée.
 - 5. *cypricus* Seidl. Cypre.
- D' Rostre contigu au front; pubescence dressée ou double.
- E Corps allongé, élytres oblongues, pubescence simple ou peu élevée.
- F Serobes latérales, élytres luisantes métalliques.
 - 6. *metallicus* (*aurullescens* Seidl.) Sic. Alg.
- F' Serobes presque supérieures, élytres assez luisantes.
 - 7. *parvulus* Bohm. S. F. I.

L' Corps ovale, élytres subglobuleuses, pubescence double couchée et dressée.

8. *mollinus* Bhm. S. A S T.

C' Front strigieux. 9. *strigifrons* Gyll. S. Rs.

A' Rostre muni d'une élévation triangulaire; prothorax très-densément ponctué-rugueux.

10. *forticornis* Bohm. S. A Rs.

Les espèces du genre *Omius* ne sont pas aussi orientales que celles du genre *Myllus*; à l'exception du *nitidus* elles sont toutes propres à l'ouest de la Transylvanie, cependant 2 espèces méridionales s'étendent jusqu'à la France (*convivus* et *micans*), et 2 (*forticornis* et *mollinus*) plus septentrionales que la Hongrie, sont répandues par toute l'Allemagne, et la dernière jusqu'en Norwège.

1. OMIAS HANAKI Friv. Jahrb. Ungar. Akad. in Pesth. 1866. 205, Pl. II f. 7. — Sellemző adatok Magyaras zág fauna jához. — Matériaux pour la faune de Hongrie. — Seidl. 53, 1.

Ressemble assez pour le faciès, par ses élytres convexes et fortement arrondies, à quelques espèces du genre *Myllus*; cependant l'extrémité de ses élytres allongées en arc l'en éloigne beaucoup. Il se reconnaît à l'absence totale de saillie humérale et à ses tarses uniongulés.

Ovale, entièrement d'un poli luisant, glabre, d'un rouge brun plus clair ou plus foncé, avec les pattes toujours claires. Rostre assez long, à peine plus étroit que la tête entre les yeux, plus large au bout, un léger enfoncement remonté de l'extrémité jusque sur le front. Scrobes tout-à-fait latérales, superficielles et nulle part bien limitées. Prothorax petit comparativement aux élytres, un peu plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, avec des points épars très-fins. Elytres sans traces de saillie humérale, l'ovale régulier qu'elles forment est tronqué à la base et un peu pointu au bout; fortement convexes et finement striées-ponctuées. Cuisses fortement renflées en massue. — Long. 3 mill.

Hongrie, Bukovine.

2. OM. RUFULIPES-*rufipes* Bohm. Sch. Curc. II 1834. 500. — Seidl. Otior. 54. 2.

Très-distinct par son rostre élégant, qui se rapproche de celui du *Bar. Companyoni*.

Ovale, entièrement glabre, finement et vaguement ponctué et très-luisant. Rostre brusquement rétréci au devant des yeux, et là de moitié moins large que la tête derrière les yeux; il est aussi en dessus tout au-devant des yeux, un peu enfoncé, de sorte qu'il y a un étranglement distinct; la légère élévation qui se trouve au devant de l'étranglement est un peu resserrée de chaque côté par le rebord supérieur des scrobes, et légèrement cannelée en dessus; scrobes latérales, limitées distinctement seulement par en haut. Prothorax aussi long que large, plus rétréci par devant que par derrière, fortement arrondi après le milieu, finement et pas densément ponctué. Ecusson invisible. Elytres ovales, avec les épaules arrondies, marquées, assez fortement striées-ponctuées. Pattes rouges; cuisses fortement renflées en massue. — Long. 3 mill.

Carniole, Galicie. Paraît très-rare.

3. OM. NITIDUS Bohm. Sch. Curc. VII 1843. 438, 28. — Seidl. 55. 3.

Ressemble au *rufipes*, mais plus allongé et pas si atténué par devant, parce que le prothorax et le rostre sont plus larges. Encore plus voisin du suivant, il n'en diffère que par le rostre. Cet organe est rétréci jusqu'au bout, convexe en dessus avec les arêtes arrondies, légèrement canaliculé seulement au bout, finement ponctué et assez fortement luisant, ainsi que la tête, qui est fortement convexe entre les yeux. Prothorax un peu plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, à peine plus rétréci vers l'extrémité que vers la base, assez densément et très-finement ponctué, de sorte que le luisant n'est pas affaibli. Elytres un peu allongées, finement striées-ponctuées, très-luisantes, glabres. Pattes rouges, cuisses pas très-fortement renflées en massue. — Long. 3 mill.

Habite la Crimée et la Russie méridionale, et paraît moins rare que le précédent.

4. OM. MICANS Seidl. Otiorh. 1868. 55, 4.

Ressemble fort au *nitidus*, seulement son prothorax est plus large et ponctué aussi fortement que ses élytres ; mais c'est surtout son rostre qui le distingue : cet organe est court, peu plus étroit que la tête et un peu élargi tout-à-fait à l'extrémité, parce que les ptéryges ne sont que peu saillantes ; fortement ponctué en dessus et impressionné dans toute sa longueur, avec les arêtes latérales tranchantes, lesquelles forment en haut la limite des scrobes et vont jusqu'aux yeux. Cette disposition le place après le genre suivant, cependant il n'y a aucune portion des scrobes infléchie et elles ne sont bien limitées qu'à leur bord supérieur.

Ovale-oblong. Prothorax large, beaucoup plus large que la moitié des élytres, mais pas beaucoup plus court que large, plus rétréci par devant que par derrière, pas fortement arrondi un peu après le milieu, fortement mais pas densément ponctué, de sorte qu'il est très-luisant, en outre garni de petits poils blancs et serrés épars. Elytres un peu parallèles sur les côtés, assez aplaties, fortement striées-ponctuées et très-luisantes. Pattes rouge-brun avec les cuisses plus foncées. — Long. 3 à 3,5 mill.

France méridionale, Hyères et Saint-Raphaël.

5. OM. CYPRICUS Seidl. Otiorh. 1868. 56, 5.

Ressemble au *metallicus*, dont il se distingue par sa pubescence toute luisante serrée ; par une légère impression transverse entre le rostre et le front ; cependant la tête est en ce point large et non rétrécie comme dans les *forticornis* et *rufulipes*, qui ont une semblable impression transverse.

Ovale-oblong, luisant. Rostre à peine aussi long que large, faiblement rétréci en dessus par devant et aplati ; scrobes au bout du rostre tout-à-fait latérales, petites, superficielles par derrière, leur bord supérieur un peu convexe. Scape des antennes légèrement arqué, les 2^{iers} articles du funicule presque d'égale longueur. Yeux assez fortement saillants. Prothorax plus large que long, un peu arrondi latéralement, assez grossièrement et densément

ponctué, avec un fort éclat métallique ainsi que les élytres. Ces dernières ne sont que médiocrement convexes et comme le prothorax, assez densément vêtues de fins petits poils très-serrés. Ongles renflés à la base et serrés l'un contre l'autre. — Long. 3,3 à 4 mill.

Chypre.

6. OM. METALLICUS. — *metallescens* Seidl. Otiorh. 1868. 57, 6.

Tient le milieu entre le précédent et le suivant, par son grand éclat, joint à une pubescence assez longue. Il ressemble pour la forme au *nitidus*, mais il est plus voisin du *micans*, par la forme du rostre, et se distingue de tous par son grand éclat métallique un peu verdâtre.

Ovale-allongé, bronzé-luisant, pubescent. Rostre plus étroit que la tête, aussi long que large, assez parallèle, avec des arêtes distinctes, plan en dessus, ridé-ponctué; serobes latérales arrivant seulement jusqu'à la hauteur du milieu de l'œil, pas profondes et de moindre extension. Entre les yeux, un point profond. Prothorax beaucoup plus large que long, assez fortement arrondi sur les côtés, profondément et assez densément ponctué. Elytres ovales, avec les épaules arrondies, environ de moitié plus longues que larges, distinctement arrondies, environ de moitié plus longues que larges, distinctement arrondies sur les côtés, finement striées-ponctuées, garnies de poils gris, d'un luisant métallique, un peu espacés. — 3,5 mill.

Sicile, Alger.

7. OM. PARVULUS Bohm. Sch. Curc. II 1834. 509, 20. — *concinus* Bohm. Sch. Curc. II 1834. 508, 119. — *sericeus* Bohm. Sch. Curc. VII 1843. 139, 29. — *oblongus* Bohm. Sch. Curc. VII 1843. 141, 33. — *Raymondi* Gaut. An. Soc. Ent. Fr. 1861. 98. — *Marqueti* Gaut. An. Soc. Ent. Fr. 1863. 489. — *mandibularis* Chevrl. Grén. Catal. 1863. 166.

Très-distinct par ses antennes rapprochées sur le rostre, et se distinguant par là de toutes les espèces du genre qui lui ressemblent.

Ovale-allongé, un peu opaque, peu densément garni d'une courte pubescence soyeuse. Rostre très-court, aussi

large que la tête, peu rétréci et arrondi par devant, sans arête tranchante; densément ponctué, avec une ligne médiane enfoncée (qui s'élargit vers le bout) et échancré de chaque côté par les scrobes se rapprochant l'une de l'autre. Celles-ci sont visibles d'en haut, cependant elles sont en même temps latérales; car la portion du rostre qui leur sert de limite en dehors n'est pas visible. Front pour l'ordinaire marqué entre les yeux d'une fovéole bien distincte. Prothorax pas beaucoup plus étroit que les élytres, un peu plus large que long, assez fortement arrondi sur les côtés, densément ponctué et pubescent. Elytres assez étroites, tantôt 2 fois aussi longues que larges, tantôt plus courtes, aussi larges à l'épaule qu'au milieu, par là même avec les côtés assez parallèles et les épaules obtusément arrondies, finement striées-ponctuées et plus ou moins pubescentes, poils à demi-écartés. Pattes brun-rouge, avec les cuisses fortement renflées en massue, surtout les antérieures. — Long. 2 à 4 mill.

Cette espèce a été décrite sous 4 noms différents par Schœnherr, sous 2 par M. Gautier des Cottés, et sous un 7^e par M. Chevrolat, comme l'a bien fait remarquer M. Seidlitz et avant lui M. Aubé. (Voir *Soc. Ent. Fr.* 1864. 521, et *Abeille*.)

Répandu dans les contrées méditerranéennes; dans le sud de la France, où il est commun par places; dans l'Italie septentrionale jusqu'en Illyrie; on le trouve quelquefois en société avec des fourmis et notamment *Pheidole megacephala*.

8. OM. MOLLINUS Bohm. Sch. Curc. n 1834. 504, 11. — Seidl. Otiorh. 59, 8. — *Bohemanni* Zett. Ins. Lapp. 1838. 188, 13. — Bohm. Sch. Curc. vn 1843. 130, 11.

Se distingue par la double vestiture de ses élytres, analogue à ce qu'on voit dans le *Myllacus rhinolophus*. Son faciès le rapproche également du genre *Myllacus*, mais les élytres sont plus allongées, plus aplaties et terminées en pointe par derrière.

Ovale, assez opaque, pubescent. Rostre assez long, presque parallèle, et un peu plus étroit que la tête, plan en dessus, un peu impressionné par devant. Scrobes latérales, limitées supérieurement par une arête tranchante.

Yeux déprimés, ce qui fait paraître la tête étroite. Prothorax environ de moitié plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, assez densément mais pas profondément ponctué, densément pubescent de gris. Elytres fortement arrondies, plus de 2 fois aussi larges que le prothorax et seulement de $\frac{4}{3}$ plus longues que larges, fortement convexes, en pointe par derrière, profondément striées-ponctuées, densément pubescentes de gris et garnies en outre d'assez longs poils dressés. Pattes brun-rouge, comme les antennes, avec les cuisses fortement renflées en massue. — Long. 2,5 à 3,5 mill.

Servie, Allemagne, Suède.

9. OM. STRIGIFRONS Gyl. Sch. Carc. n 1834. 503, 9. — Seidl. Otior. 59, 9. — ? *inflatus* Kolen. Bul. Mosc. 1858. 421, 521.

Très-reconnaissable à sa tête et à son rostre strigineux, en quoi il se rapproche seulement du suivant, qui n'est peut-être qu'une de ses variétés.

Ovale, assez luisant. Tête et rostre de même forme que celui du *parvulus* et a également les scrobes fortement enfoncées et visibles d'en haut; cependant leur limite supérieure est en haut plus aiguë et non arrondie. Prothorax densément et assez grossièrement ponctué, environ de moitié plus large que long. Elytres 2 fois aussi larges que le prothorax, fortement convexes, profondément striées-ponctuées, finement pubescentes de poils gris écartés. — Long. 3,5 mill.

Var. *a*. La petite forme, qui a été souvent envoyée de Kiew par Hochhuth, et se retrouve en Autriche, s'éloigne du type, en outre de sa taille moindre, par les antennes proportionnellement plus longues et dépassant le milieu du corps, par le prothorax un peu plus long, plus grossièrement ponctué, par l'éclat plus fort et les poils plus longs et écartés des élytres.

Russie méridionale.

N'ayant eu sous les yeux que le type de Schœnherr, qui égale les plus grands *mollims*, et dont la provenance est incertaine, je ne puis juger si l'espèce varie. Rien ne s'oppose à ce que l'*inflatus* s'y rapporte, si ce n'est que

Kolenati dit en propres termes que Schœnherr lui-même l'a regardée comme une espèce distincte.

Voici, du reste, la description :

OM. INFLATUS Kolenat. Melet. Bul. Mosc. 1858. 421, 521.

Ovale-oblong, brun obscur ou brun. Antennes, pattes et élytres testacées. Tête striée-aciculée longitudinalement, ainsi que le rostre, qui est impressionné dans sa longueur. Prothorax de la longueur de la tête avec le rostre, densément ponctué-rugueux. Elytres globuleuses-oblongues, profondément striées-ponctuées ; interstries luisants, garnis de soies flaves dressées ; cuisses postérieures inermes. — Long. 3,4 — larg. 1,7 mill.

Caucase.

9^a. OM. RUGOSIFRONS. — *rugifrons* Hochh. Bul. Mosc. 1851. 52.
— Scidl. Otiorh. 1868. 60.

Je ne puis prononcer, d'après la description, si le *rugosifrons* est une espèce distincte ou seulement une variété du *strigosifrons*. En tout cas il en est très-voisin et je ne trouve que les différences suivantes : « Les élytres sont seulement de moitié plus larges que le prothorax, les stries sont fortes et profondément ponctuées en devant, devenant plus légères et à peine ponctuées par derrière. » L'insecte est aussi un peu plus allongé et plus étroit ; peut-être est-ce un ♂ du *strigosifrons*, type que Hochhuth n'a pas connu. Les autres différences (le prothorax plus finement ponctué et un léger étranglement au bord antérieur) que l'on trouve dans le *rugosifrons*, deviennent plus légères, si on le compare avec la var. *a*.

De la couleur et de la taille de l'*O. brunnipes* Ol. ou de *holosericeus* Dahl. et *politus* Ullr., mais facile à distinguer de ces espèces et de toutes celles de la 2^e division de cette famille, d'après Sch. par le large sillon de l'extrémité du rostre, et le front densément strié-ridé longitudinalement. Il ne peut se confondre avec le *strigosifrons* qui présente une semblable strigosité sur le front ; il en diffère par une autre forme, le prothorax bien plus finement ponctué, etc.

Brun de poix clair, prothorax un peu plus clair, tête

plus foncée, yeux tout-à-fait noirs, scape des antennes un peu plus clair que le funicule, massue rouge-jaunâtre, élytres et pattes d'un marron pâle. De fins poils tomenteux mous, garnissant finement tout l'insecte; cependant ils sont pour l'ordinaire usés. Front presque plan, et, comme le rostre, densément et finement strigueux, ridé longitudinalement. Yeux globuleux et médiocrement saillants. Rostre court, élargi au bout, et fortement sillonné en ce point; ce sillon est large et profond entre les antennes, plus étroit et plus léger par derrière, formé par le bord supérieur de la scrobe fortement élevé. Antennes insérées au bout du rostre, scape médiocrement arqué et fort épaissi au bout, 2^e et 3^e articles du funicule obconiques et d'égal longueur, tous les suivants beaucoup plus courts que larges, presque lenticulaires, massue ovale en pointe. Prothorax fort convexe, médiocrement arrondi sur les côtés, un peu plus étroit par devant que par derrière, largement mais très-faiblement étranglé, derrière le bord antérieur, avec des points fins assez serrés. Élytres beaucoup plus longues que la moitié antérieure du corps, et de moitié plus larges que le prothorax, ayant leur plus grande largeur près de l'extrémité arrondie, un peu rétrécies par devant, fortement arrondies sur les côtés, faiblement sur le dos; leurs stries longitudinales faibles, régulières, sont plus larges et un peu plus profondes par devant, plus faibles par derrière, fortement et profondément ponctuées par devant, points à peine visibles par derrière; interstries presque plans, paraissant ridés transversalement à un fort grossissement, finement et densément ponctués en dehors et avec de petits points encore plus forts. Cuisses inertes; jambes antérieures très-légèrement arquées, postérieures droites. — Long. 3 mill.

Crimée.

10. OM. FORTICORNIS Bohm. Sch. Curc. vii 1813. 142, 35. — Seidl. Otiorh. 1868, 60, 10. — *gracilipes* Bohm. Sch. Curc. ii 1834. 505, 12. — *rugicollis* Bohm. Sch. Curc. vii 1813. 131, 16. — *validicornis* (Germ.) Merkel Germ. Zeits. Ent. v 1844. 250, 220.

Le *forticornis* est distinct par l'élévation sur le rostre et le prothorax finement rugueux. Ovale-oblong, brun,

opaque. Le rostre est un peu impressionné au devant des yeux, puis fortement élevé, l'élévation triangulaire, un peu comprimée de chaque côté par les grandes scrobes. Les antennes sont épaisses, avec le scape courbé, le funicule plus menu à la base, devenant plus gros vers le bout. Le prothorax environ de moitié plus large que long, densément et finement rugueux, tout-à-fait mat. Les élytres environ de un tiers plus larges à 2 fois aussi larges que le prothorax, avec les épaules distinctement arrondies; obtusément arrondies par derrière, profondément striées-punctuées, les interstries un peu convexes, avec des rangées irrégulières de petites soies blanches dressées. — Long. 2,5 à 3,5 mill.

Le ♂ a les cuisses fortement en massue et est d'une forme plus étroite avec le prothorax plus large, la ♀ a les cuisses légèrement en massue, les élytres larges et le prothorax plus étroit.

Le *gracilipes* Sch., d'après le type, se rapporte ici; toutefois, il n'est pas possible de l'identifier avec le *gracilipes* Panz. (Fn. Germ. LVI 18) cité par Schœnherr, car il attribue à celui-ci : *antennis glabris* et *thorace punctis plurimis, minutis*; la figure représente également des points distincts écartés sur le prothorax, qui n'existent pas dans notre espèce. Sur ce fondement et parce que Schœnherr ne donne qu'une diagnose courte et pas très-exacte de son *gracilipes*, je n'ai pu admettre ce nom, quoique le plus ancien, mais celui qu'il a donné dans le tome VII où il est très-reconnaissable. La description se rapporte à un ♂, tandis que le *validicornis* Merkel est une ♀. Enfin le *rugicollis* se rapporte ici d'après l'exemplaire original de la collection Chevrolat.

Le *forticornis* est très-répandu en Allemagne, Saxe, Bavière, Autriche, Thuringe. Trouvé en grand nombre sous les pierres, près de Lébau; assez souvent dans les fourmilières en particulier de la *Formica fuliginosa*.

La var. *a* est peut-être une espèce distincte; mais je ne puis l'établir sur un seul exemplaire qui m'est connu (de Batoam), quoiqu'il s'éloigne beaucoup, surtout par la fine pubescence des élytres, le luisant plus fort, la forme

arrondie, ainsi que le funicule peu plus mince à la base.
— Long. 2,2 mill.

Il est possible que l'*Illotus* Hochhuth (Mosc. Bul. 1847. 302, 418) se rapporte ici, parce qu'il a l'élévation entre les antennes; le prothorax finement strigueux indique cependant une forme anormale qui n'est pas trop en contradiction avec la fine rugosité du *forticornis*.

Voici la diagnose de Kolenati, Melet. Bull. Mosc. 1858. 324, 325.

Ovale-oblong, brun de poix, antennes, extrémité de l'abdomen et pattes d'un roux testacé. Front assez convexe, finement et densément ponctué-rugueux. Rostre court, avec une impression transverse, élevé en triangle au bout. Prothorax peu convexe, un peu plus court que large, peu dilaté sur les côtés, finement substrié-rugueux longitudinalement. Elytres striées-ponctuées, densément garnies d'une couche de squamules; interstries hispides.

Var. Elytres plus ou moins dénudées, roux-testacé, prothorax avec une impression subapicale.

Ressemble beaucoup au *parvulus* et même à l'*inflatus*, il en diffère par son écusson distinct, son prothorax transverse, et par sa vestiture squamuliforme.

Transcaucasie.

XXIII. — BARYPELITES (*Βαρυπελίτης*, tardif à paraître)

J. Dav. Gen. Coleop. 1853. 13, 24 *bis*. — Seidl. Otiorh. 1868. 31.

Scrobes latérales, bord inférieur défilé, portion juxta-marginale plus profonde, sauleiforme.

Rostre à peine plus long que large ou très-court.

Prothorax plus large ou aussi large que long.

Elytres globuleuses, ou ovales, ou oblongues.

Corps glabre ou velu, luisant.

Guisses en massue, mutiques ou dentées, jambes droites ou courbées, ongles soudés, égaux.

2^e segment de l'abdomen anguleux en devant, plus long que les suivants.

Le genre *Barypelites* comprend des espèces très-sem-

blables, dont les 2 1^{res} seules ont un faciès un peu différent, car leurs élytres se rapprochent de la forme sphérique, tandis que c'est la forme oblongue qui est la règle. Le rostre a la structure assez uniforme, pour l'ordinaire aussi long que large, très-court seulement dans le dernier groupe. Les scrobes sont toujours triangulaires, devenant plus superficielles vers les yeux, le bord supérieur tranchant et élevé, arrivant souvent jusqu'aux yeux (*pellucidus*, *mollicornus*), mais quelquefois pas même jusqu'au milieu du rostre (*sulcifrons*, *cinerascens*), le bord inférieur toujours courbé par en bas (quelquefois presque perpendiculairement), plus ou moins tranchant, la portion de la scrobe, placée près de lui, enfoncée comme un sillon plus ou moins distinct. J'appelle cette portion recourbée « sillon antenne » par opposition aux scrobes. Le prothorax est pour l'ordinaire plus large que long, seulement aussi long que large dans *currimanus* et *indigenus*, très-court dans *glomus* et *sulcatifrons*. Les élytres sont presque toujours allongées, seulement *glomus* et *virguncula* ont une forme qui se rapproche de celle des *Myllacus*; elles sont des plus allongées dans le *currimanus*; elles sont toujours luisantes et ou entièrement nues ou couvertes de poils fins. Les pattes ont les cuisses dentées seulement dans le *glomus* et le *Chevroleti*; du reste elles sont toujours inermes, mais fortement en massue, souvent particulièrement épaisses, dans les ♂. Les jambes antérieures présentent quelques variétés; elles sont dans les ♂ de quelques espèces très-fortement courbées, plus légèrement dans d'autres et dans le reste enfin échanquées en arc intérieurement, et assez semblables dans les 2 sexes. Les tarses ont 2 crochets d'égale longueur, soudés à la base. La couleur varie dans tout l'insecte, d'après la coloration des individus, du brun clair au noir, et dans la description des espèces devient complètement sans importance.

Le genre *Barypeithes* a été établi par J. Duval pour une nouvelle espèce, *rufipes*, qui fut bientôt reconnu par Jekel pour être l'*Omius sulcifrons* Sch.; ce dernier entomologiste a reconnu que les différences énoncées par J. Duval étaient sans valeur, mais que l'espèce appartenait au genre *Omius*. Malgré cela, Lacordaire a reporté le genre loin des *Omius*.

dans les *Brachyderides*, mais a donné une description des serobes qui s'éloigne tout autant de la description et de la figure de Duval que de la nature.

L'*Omius sulcifrons* de Schoenherr ne s'éloigne pas essentiellement pour la forme des serobes d'un grand nombre d'autres espèces d'*Omius*; et si on le prend comme type d'un genre particulier « *Barypeithes*, » il faut y rapporter un grand nombre des espèces du genre *Omius* de Schoenh., et en particulier presque toute la 2^e division, à l'exception de 6 (*nitidus*, *concinus*, *parvulus*, *sericeus*, *oblongus*, *forticornis*), qui se rapportent au genre *Omius* restreint, avec l'adjonction du *ruficollis* de la 1^{re} division.

Des 12 espèces de Schoenherr appartenant au genre *Barypeithes*, 4 sont synonymes (*ruficollis*, *subnitidus*, *punctirostris*, *eburneus*); d'un autre côté 3 ont été décrites subséquemment; *cinerascens* Rosh., *eucrinatus* Duv., et *montanus* Chevrl. (ainsi que *Barypeithes rufipes* Duv. et *meridionalis* Muls., qui ne sont que des synonymes), et enfin 5 nouvelles espèces (*globus*, *virgineula*, *styriacus*, *violatus*, *scydmonoides*), de sorte qu'il y en a 16 de connus actuellement.

A Elytres globuleuses, 2 fois plus larges que le prothorax et davantage. 1^{er} groupe.

B Cuisses en massue anguleuse, subdentées; élytres pas plus longues que larges, arrondies par derrière; yeux semi-globuleux, saillants.

1. *globus* (globus Seidl.) Transyl.

B' Cuisses nuliques, plus fortement courbées en dessus; élytres un peu plus longues que larges, brièvement acuminées en rostre au bout.

2. *virgineula* Seidl. A Carn.

A' Elytres peu convexes, pour l'ordinaire allongées.

B Rostre un peu plus long ou plus court que large.

2^e groupe.

C Scape à peine plus court que le funicule sans la massue; partie défléchie des serobes moins profonde.

D ♂ Jambes antérieures fortement courbées.

E Rostre fortement courbé en dessus; cuisses antérieures dentées.

3. *Cheroloti* Bohm. Sch. A Transyl.

E¹ Rostre non courbé en dessus; cuisses nulques.

F¹ ♂ Cuisses antérieures et intermédiaires fortement renflées; prothorax large.

4. *pellucidus* Bohm. Sch. F A.

F² ♂ Cuisses non renflées.

G Elytres nues; ♂ jambes antérieures très-fortement échancrées en dedans, moins courbées en dehors.

5. *montosus* Chevrol. F A.

G¹ Elytres garnies de poils courts; ♂ jambes antérieures très-fortement courbées en hameçon.

6. *styriacus* Seidl. Styr.

G² Elytres hérissées de poils plus longs; ♂ jambes antérieures échancrées surtout en dedans.

7. *violatus* Seidl. Fs.

F³ ♂ Cuisses antérieures seulement renflées; prothorax un peu plus long que large.

8. *curvimanus* J. Dav. Fs.

D¹ ♂ Jambes antérieures peu courbées ou droites.

E Rostre assez grêle, étroit à la base.

9. *Companioni* Bohm. Sch. Pyr.

E² Rostre anguleux, plan en dessus.

F Rostre aussi long que large.

G Rostre distinctement dilaté au bout, plus étroit au milieu, plan en dessus.

H Elytres garnies de poils plus longs, redressés; très-petit.

10. *scydmánoides* Seidl. Apenn.

H¹ Elytres nues ou garnies de petits poils couchés.

11. *brunipes* Ol, F A.

G² Rostre non dilaté au bout, large, un peu courbé en dessus.

12. *mollicornis* Ahr. A.

F² Rostre plus court que large; très-petit.

13. *tenax* Bohm. Sch. A.

C¹ Scape distinctement plus court que le funicule sans la massue; portion défléchie des serobes profonde, luisante, perpendiculaire; prothorax aussi long que large.

14. *indigenus* Bohm. Sch. Port.

B¹ Rostre très-court, ample; partie défléchie des serobes distinctement limitée.

3^e GROUPE.

C Rostre sillonné; prothorax transverse.

15. *sulcatifrons* (sulcifrons Bohm. Sch.) F.

C. Rostre non sillonné, orné au bout d'une crête transversale, courbée; prothorax un peu plus court que large. 46. *cinereus* Rosh. E.

Les *Leptopeltus* sont répandus dans l'ouest de l'Europe, contrairement à ce qui a lieu pour les *Onias* et *Myllus*. On n'en connaît pas qui se trouve à l'orient de la Transylvanie, et ce pays n'en possède que 2 (*globus* et *Checcolati*), l'Autriche en compte 6 (*virgineula*, *Checcolati*, *styracus*, *brunipes*, *mollicornis*, *tenax*), l'Allemagne, nord et ouest de la Bohême, 3 (les 3 derniers avec *pellucidus* et *montanus*), la France 7 (les deux derniers avec *brunipes*, *violatus*, *curcivatus*, *Compagnoii*, *sulcifrons*), l'Espagne 3 (*indigenus*, *sulcifrons*, *cinereus*), l'Italie supérieure 2 (*mollicornis*, *sepharomoides*). Les espèces vivent dans la mousse ou le gazon court; quelques-unes en compagnie avec les fourmis (*pellucidus*, *tenax*).

1^{er} GROUPE.

I. BAR. GLOMUS. — *globus* Scidl. Otiorh. 1808. 65, 1.

Le *globus* ressemble beaucoup pour la forme au *Myllus semicubus*, mais il le dépasse ordinairement en taille, et il se distingue de suite par une structure tout autre du rostre.

Globuleux, luisant, garni en dessous et sur le prothorax de poils blancs. Yeux semiglobuleux, saillants. Le rostre est large et court, plan en dessus: les scrobes sont superficielles, bordées seulement d'arêtes arrondies, dont la supérieure courte, l'inférieure obliquement dirigée sous les yeux. Les antennes sont rouges, courtes et épaisses, le 1^{er} article du funiculaire plus long que les 2 suivants ensemble. Le prothorax est transverse, 2 fois aussi large que long, assez fortement arrondi sur les côtés, presque aussi large en devant qu'à la base, grossièrement et assez densément ponctué, tout velu de fins poils blanchâtres serrés (comme le dessous, y compris les jambes). Les élytres aussi larges que longues, arrondies par derrière, très-convexes, presque globuleuses, finement striées-veluées, fortement luisantes, peut-être aussi velues de

blanchâtre dans les individus frais. Les pattes sont rouges, les cuisses très-fortement en massue et épaissies en des-ous et échanquées au bout, de manière à former un angle obtus, dont la pointe figure une petite dent. C'est peut-être la ♀. — Long. 4,3 mill.

Var. *sphéroïdes*. Qui n'est peut-être que l'autre sexe ♂, diffère par les points suivants : Le rostre est creusé en dessus dans toute sa longueur, le front moins convexe, le prothorax est seulement de moitié plus large que long, les élytres un peu moins planes, surtout à la base et aux épaules, plus profondément striées-ponctuées, les points grands.

Il n'est pas impossible que cette forme ne constitue aussi bien une espèce propre, ce qu'on ne pourra décider que lorsqu'on aura plus d'individus, je n'en ai vu que 2 de chaque forme, qui tous viennent de Transylvanie.

2. BAR. VIRGUNCULA Seidl. Otiorh. 1868. 66, 2.

Le *virguncula* a à peu près la forme de l'*Gnâvus mollinus*, cependant il est en général plus grand et d'une figure plus gentille, par son prothorax étroit, comme étranglé. Le rostre est assez long, fortement impressionné sur toute sa surface, les stries assez profondes, leur bord supérieur atteint presque les yeux, l'inférieur est tranchant et présente près de lui un sillon distinct, un peu luisant. Les antennes rouges, le scape droit, le 1^{er} article du funicule à peine aussi long que les 2 suivants ensemble. Le prothorax est presque de moitié plus large que long, à peine plus étroit en devant qu'à la base, régulièrement arrondi sur les côtés, grossièrement et assez densément ponctué, luisant. Les élytres, particulièrement dans la ♀, sont assez fortement convexes, un peu plus longues que larges, à leur extrémité un peu allongées en bec, profondément striées-ponctuées, fort luisantes. Les pattes sont rouges, avec les cuisses fortement en massue, cependant celles-ci sont plus épaissies en dessus et courbées. — Long. 3,5 à 4 mill.

Le ♂ a les jambes antérieures distinctement courbées et légèrement élargies en arc jusqu'au milieu, les élytres

à épaules tout-à-fait effacées, tandis que dans la ♀ elles ont leur plus grande largeur à l'épaule et sont entières.

Autriche, de Moravie en Illyrie; île de Nanos en Illyrie, à Adamstal près Brünn; Croatie, Carniole.

II^e GROUPE.

3. BAR. CHEVROLATI Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 135, 25 (*Omius*). — Scidl. Otiorh. 1868. 67, 3. — *ruficollis* Bohm. Sch. Curc. ii 1834. 503, 110 (*Omius*). — *subnitidus* Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 136 26 (*Omius*).

Le *Chevrolati* est très-distinct par son rostre visiblement courbé en dessus, et ses cuisses antérieures dentées, et ne peut se comparer à aucun autre.

Ovale-oblong, soyeux. Le rostre est aussi large que la tête, presque parallèle, assez fortement courbé en dessus, à partir du front un peu déprimé et un peu enfoncé au milieu dans sa longueur. Les scrobes ne sont pas profondes, le sillon nettement limité seulement par en dessous, assez oblique. Le prothorax est beaucoup plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, grossièrement et densément ponctué, quelquefois presque rugueusement. Les élytres assez fortement arrondies sur les côtés, terminées en pointe par derrière, profondément striées-ponctuées, garnies d'assez longs poils écartés. Les pattes ont les cuisses antérieures et intermédiaires distinctement dentées, et très-rarement leur petite dent est indistincte, ou simplement indiquée. — Long. 3 à 4 mill.

Le ♂ est d'une forme plus étroite, avec le prothorax plus large, il a les jambes antérieures courbées fortement dans toute leur longueur, les intermédiaires plus légèrement, les cuisses antérieures et intermédiaires plus fortement en massue. La ♀ a les élytres plus larges et le prothorax plus étroit, seulement les jambes antérieures légèrement échancrées en dedans et les cuisses plus faiblement en massue.

Schoenherr a décrit cette espèce 3 fois, le ♂ comme *Chevrolati*, la ♀ comme *ruficollis* et *subnitidus*, et je choisis celui dont la description est la meilleure, quoique *ruficollis* soit le plus ancien, puisqu'il est décrit dans le 2^e volume.

mais il n'est accompagné que d'une simple diagnose, laquelle convient au *rusticollis* de Fabricius, qui se rapporte vraisemblablement au *mollicornus* ainsi que le *holosericeus* F.

C'est l'espèce la plus orientale du genre, car il se trouve en Transylvanie, et ne dépasse pas les limites de l'Autriche au nord et au sud.

4. BAR. PELLUCIDUS Bohm. Sch. Curc. n 1834. 507, 7 (*Omius*). — Seidl. Otiorh. 1868. 68, 4.

Le *pellucidus* est très-facile à reconnaître à la forme extraordinaire du ♂, tandis que la ♀ ressemble souvent au *mollicornus* et même au *violatus*, si bien qu'on a peine à l'en distinguer.

Ovale-allongé, couvert de longs poils dressés. Le rostre est distinctement sillonné dans le *pellucidus*, proportionnellement plus élevé sur les côtés que dans le *mollicornus* et pas si légèrement courbé en dessus que dans le dernier. Les scrobes sont en outre plus superficielles, avec leur partie infléchie non profonde, presque perpendiculaire, mais le sillon est plus perpendiculaire et descend bien plus avant. Le prothorax est fort arrondi sur les côtés, fortement et très-densément ponctué, dans le ♂ aussi large que les élytres, dans la ♀ plus étroit. Les élytres sont ovales dans la ♀, fortement en pointe par derrière dans le ♂, assez finement striées-ponctuées et, comme le prothorax, garnies de longs poils écartés. — Long. 3 à 4 mill.

Le ♂ a les cuisses antérieures et intermédiaires fortement épaissies, les jambes antérieures fortement courbées et les intermédiaires légèrement.

Le *pellucidus* est très-répandu en France et en Belgique, Paris, Lyon, Hautes-Alpes, Narbonne; Liège. Il se trouve aussi en Allemagne (Coblentz, Prusse), en société des fourmis, en particulier *Lasius niger* et *flavus*.

5. BAR. MONTOSUS. — *montanus* Chevrol. Grén. Cat. 1863. 105 (*Omius*). — Seidl. Otiorh. 1868. 69, 5.

Le *montosus* est le plus allongé de tout le genre, il le cède cependant en volume au *gibbus*, son prothorax grand, fortement et pour l'ordinaire densément ponctué, et les

jambes antérieures ♂ fortement échancrées caractérisent cette espèce.

Oblong. Le rostre est à peu près aussi long que large, épais, anguleux, plan en dessus, un peu impressionné au bout. Les serobes superficielles; le sillon distinct, assez profond, luisant et courbé en bas presque perpendiculairement. Le prothorax plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, grossièrement ponctué et pour l'ordinaire densément, quelquefois cependant assez éparsement. Les élytres sont allongées, assez grossièrement striées-ponctuées, fort luisantes, sans ou rarement avec quelques poils très-fins. Les pattes sont rouges; les cuisses ne sont pas très-renflées en massue, les antérieures un peu plus fortement. — Long. 4 à 5 mill.

Le ♂ a les jambes antérieures très-fortement courbées, cependant elles sont seulement fortement échancrées en dedans, mais pas fortement arquées en dehors; le prothorax est plus large. La ♀ a les jambes antérieures droites, faiblement échancrées en dedans et le prothorax plus étroit.

Il est confiné dans la France orientale et l'Allemagne occidentale. Lyon, mont Pilat surtout, Forêt-Noire, Bade.

6. BAR. STYRIACUS Seidl. Otiorh. 1868. 69, 6.

Oblong. Elytres allongées, avec des poils courts. Prothorax plus large que long. Rostre peu dilaté au bout, portion défléchie des serobes assez profonde, oblique.

♂ Jambes antérieures très-fortement courbées en crochet; ♀ droites un peu échancrées en dedans.

Le *styriacus* ressemble assez au *brunipes*, surtout à la var. *pyrenæus*, mais il s'en distingue d'une manière frappante par les jambes antérieures ♂ qui sont plus fortement arquées que dans aucune autre espèce du genre; on ne peut distinguer la ♀ qu'à sa pubescence plus longue, pour tout le reste elle ressemble beaucoup au *brunipes* var. *pyrenæus*. Il se distingue du *montosus* ♀, en outre de sa pubescence plus longue, par son rostre plus étroit; du *violatus*, dont il est aussi très-voisin, par la pubescence plus courte et le rostre plus étroit et plus long, et par les

jambes antérieures ♂ qui, non-seulement paraissent arquées par une forte échancrure du côté interne (comme dans *violatus* et *montosus*), mais encore le long du bord externe, sont courbées fortement en crochet depuis le milieu.— Long. 3,5 mill.

Styrie, Kahr.

7. BAR. VIOLATUS Seidl. Otiorth. 1868. 70, 7

Le *violatus* est très-semblable à de petits exemplaires du *mollicomus* et la ♀ souvent n'est pas facile à distinguer; cependant on la reconnaît de la manière la plus sûre à la conformation du rostre : celui-ci est aussi long que large, impressionné dans sa longueur en dessus, les scrobes assez profondes, mais le sillon indistinct, oblique. Le prothorax est un peu plus large que long, pas très-fortement arrondi sur les côtés, ponctué grossièrement et profondément, mais pas si densément que dans le *pellucidus*, et plus densément que dans le *mollicomus*. Les élytres sont distinctement arrondies sur les côtés, plus de moitié plus longues que larges, assez grossièrement striées-ponctuées et vêtues de poils à peu près aussi longs que dans le *mollicomus*.

Ovale-oblong, hérissé. Prothorax plus large que long, à points forts, peu serrés. Elytres plus fortement striées-ponctuées. — Long. 2,5 à 3,2 mill.

Le ♂ a les jambes antérieures fortement courbées au bout, ce qui le distingue du *mollicomus*, cependant les cuisses non épaissies, ce qui le distingue du *pellucidus*. Les ♀ de ces 3 espèces sont souvent tellement semblables qu'il est utile d'étudier les différences comparatives des rostres, pour pouvoir les distinguer. — Dans le *violatus*, le rostre, vu de côté, n'est pas si élevé, et le sillon des scrobes est indistinct et oblique; dans le *mollicomus*, celui-ci est profond, distinct, luisant et plus vertical, mais il ne descend pas beaucoup, la scrobe entière est particulièrement profonde et caverniforme, le rostre est large et court, convexe en dessus et au plus impressionné au bout; dans le *pellucidus* enfin, il est, vu de côté, très-haut et anguleux et a une scrobe superficielle, avec le sillon superficiel.

mais perpendiculaire et abaissé presque jusqu'en dessous.

Jambes antérieures plus fortement courbées, surtout échanerées en dedans ♂, droites ♀.

Le *rightus* n'a été trouvé qu'à Strasbourg et est répandu dans les collections sous le nom de *Om. trichopterus* Chevrol., nom que j'aurais adopté s'il n'y avait déjà un *Om. trichopterus* publié par Gantier des Cottés. Fr. Soc. ent. 1863. 490.

8. BAR. CURVIMANUS J. Duv. Curc. Cat. 1853. 35. — Seidl. Otiorh. 1868. 71, 8.

Le *curvimanus* est très-reconnaissable à sa forme allongée étroite et à son prothorax long.

Allongé, luisant, finement pubescent. Le rostre est aussi long que large, un peu élargi vers le bout, plan en dessus, ou légèrement impressionné, les s robes non profondes, les sillons distinctement enfoncés, obliques. Le prothorax est aussi long ou presque aussi long que large, légèrement arrondi sur les côtés, avec de gros points épars, superficiels; les élytres allongées, à peu près 2 fois aussi longues que larges, avec les côtés subparallèles, leur plus grande largeur derrière le milieu, assez finement striées-ponctuées, très-finement pubescentes. Les cuisses sont assez fortes (les antérieures ♂ distinctement plus fortes), et les jambes antérieures distinctement ♀ ou fortement ♂ courbées à l'extrémité. — Long. 3 mill.

Découvert à Montpellier. Paraît être rare; je n'en ai vu que 7 individus, la plupart de Bordeaux.

9. BAR. COMPANYONI Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 141, 34. — Seidl. Otiorh. 1868. 72, 9. — *trichopterus* Gaut. Sec. Ent. Fr. 1863. 490.

Le *Companyoni* ressemble en quelque façon au *curvimanus* par sa forme un peu allongée; cependant il est très-distinct et ne peut être confondu avec aucun autre, à cause de son rostre étroit arrondi. Il paraît aussi semblable au ♂ étroit du *teneo* et est de la même taille.

Ovale-allongé, luisant, hérissé de poils. Le rostre est rétréci jusqu'au milieu, de sorte que là il n'est pas moitié aussi large que la tête, puis il s'élargit de nouveau assez

fortement au bout ; en dessus il est arrondi et ne présente nulle part de carène tranchante ; les scrobes antennaires sont fortement saillantes, et la partie dorsale du rostre qui les sépare est étroite, le sillon assez profond et oblique. Les antennes sont insérées à égale distance des yeux et de l'extrémité du rostre. Le prothorax est un peu plus large que long, régulièrement arrondi sur les côtés, peu profondément et assez éparsement ponctué. Les élytres à peu près de moitié plus longues que larges, légèrement arrondies sur les côtés, finement striées-ponctuées, vêtues de poils épars mais distinctement écartés. — Long. 2 à 2,8 mill.

Jambes antérieures légèrement courbées au bout ♂ ; droites ♀.

Assez commun. Pyrénées orientales,

10. BAR. SCYDMENOIDES Seidl. Otiorh. 1868. 72, 10.

Le *scydmenoides* ressemble beaucoup pour la forme aux *Companyoni* et *teneæ*, et le ♂ se rapproche par son prothorax arrondi d'un *Scydmenus* p. ex du *conspicuus* Sch. Il se distingue du *Companyoni* par son rostre non arrondi mais anguleux en dessus ; du *teneæ* par sa longueur beaucoup plus grande et sa forme plus étroite. Le rostre ressemble extraordinairement à celui du *currimanus* ; il est seulement un peu plus étroit et plus distinctement élargi au bout. Il se distingue du *violatus*, dont les plus petits individus ont avec la ♀ une certaine ressemblance, par son rostre plus long et plus étroit, et la pubescence plus éparsée et plus courte.

Ovale, luisant. Le prothorax est un peu plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, fort convexe en dessus, surtout ♀, presque sphérique et très-luisant. Les élytres sont ♂ élancées et seulement de moitié plus larges que le prothorax, ♀ 2 fois aussi larges, grossièrement striées-ponctuées, et garnies d'assez longs poils en séries. Les jambes antérieures sont échancrées en devant, à l'extrémité, légèrement ♂, à peine ♀. — Long. 2,5 mill.

♂ Plus grêle, ♀ plus large.

Toscane, dans les Apennins (Comaldoli et Valombrosa). Vit en société avec les fourmis.

11. BAR. BRUNNIPES Ol. Ent. v 83 p. 381, 461, pl. 35. f. 551. — Bohm. Sch. Curc. n 1831. 506, 15. — Scidl. Otiorh. 1868. 73, 11. — *gracilis* Beck. Beit. Bair. Kef. 1817. 25, 33. — *piceus* Marsh. Brit. 1802. 305, 194. — *eburneus* Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 137, 27.

Le *brunnipes* varie beaucoup de forme, puisqu'à côté des ♂ très-étroits on trouve des ♀ larges et aplaties. Partout les élytres sont fortement arrondies sur les côtés, ont leur plus grande largeur avant le milieu et se terminent en pointe par derrière. Cette conformation particulière le distingue des autres espèces d'*Omius* qui sont plus parallèles. En outre, il se reconnaît à son rostre fortement rétréci au-devant des yeux.

Ovale-oblong, luisant. Le rostre est à peu près aussi large que long, plan en dessus et un peu impressionné vers l'extrémité, fortement comprimé latéralement au milieu par les stries antennaires, de sorte qu'il paraît très-élargi au bout avec les ptéryges divariquées. Les stries sont assez profondes, le sillon est moins distinct et luisant comme dans le *montanus*, et moins vertical. Le prothorax est un peu plus large que long, arrondi sur les côtés, grossièrement mais pas densément ponctué, vêtu de fins poils serrés. Les élytres assez finement stries-ponctuées, pour l'ordinaire, entièrement glabres ou rarement garnies de tout petits poils fins serrés. Les pattes ont les cuisses seulement en masse légère, les antérieures ♂ un peu plus fortes, les jambes antérieures ♂ sont aussi un peu courbées au bout, et leurs élytres sont plus étroites; les ♀ ont les jambes droites et plus larges, les élytres un peu déprimées sur le dos, particulièrement par derrière. — Long. 3 à 3.5 mill.

Je n'ai pas l'ouvrage d'Olivier et ne puis dire si c'est bien cette espèce, mais j'ai sous les yeux les types de Schenherr qui décrit la ♀ sous le nom de *brunnipes*, et le ♂ sous celui d'*eburneus*, au 7^e vol.

Commun en France, se trouve aussi en Allemagne (Frankfort-sur-le-Mein), en Bavière et en Autriche.

Var. *pyrenaicus*. Forme très-distincte qui pourrait être considérée comme une espèce distincte.

Le rostre est moins comprimé latéralement au milieu, plus parallèle, distinctement canaliculé en dessus jusqu'au front ; le prothorax est plus densément ponctué ; les élytres ont une autre forme, puisque leur plus grande largeur n'est pas avant le milieu, mais plutôt après, et que les côtés sont plus parallèles, et leur aplatissement sur leur partie postérieure ♀ n'est pas visible, et les stries sont plus profondes, plus grossièrement ponctuées jusqu'au bout, et toute leur surface est distinctement garnie de petits poils gris serrés. Les jambes antérieures enfin sont plus distinctement courbées au bout et légèrement échancrées en dedans ♀.

Sous la mousse, dans les Pyrénées, en nombre.

12. BAR. MOLLICOMUS *Abr. N. Act. Holm. n 2° 1812. 17. 8. Pl. 1 8.*
 — Bohm. *Sch. Curc. n 1831. 506, 46.* — Seidl. *Otiorth. 1868. 75, 42.* — *punctirostris* Bohm. *Sch. Curc. vii 1843. 134, 23.* — ? *ruficollis* F. *Ent. S. 1 2° 1792. 467, 307.* — *holosericeus* F. *Syst. El. n 1801. 526, 412.*

Le *mollicomus* se distingue par le manque de différences sexuelles évidentes, en outre par les scrobes antennaires particulièrement profondes et creusées jusqu'aux yeux, dont le sillon profond et distinct ne descend pas loin.

Ovale-oblong, parsemé d'une pubescence blanche. Le rostre est plan en dessus, presque convexe, un peu recourbé en bas et impressionné au bout. Le prothorax est plus large que long, mais plus étroit et pas si arrondi sur les côtés que dans *pellucidus*, et moins densément ponctué. Les élytres sont tantôt plus, tantôt moins allongées, mais toujours avec les côtés assez parallèles et les épaules pleines, et presque arrondies par derrière. La pubescence est plus courte que dans le *pellucidus*, mais aussi écartée. Le ♂ a seulement les jambes antérieures légèrement échancrées en arc par dedans et ne différant pas d'ailleurs de la ♀. — Long. 2,8 à 4 mill.

Je ne puis séparer le *punctirostris* Bohm. *Sch.* de son *mollicomus*. Je ne cite celui d'Ahlrens que d'après Schenherr, car je n'ai pas l'ouvrage. Je ne puis, d'après les courtes descriptions, décider si le *ruficollis* et *Pholosericeus* de Fabricius se rapportent à cette espèce, ni par consé-

quent leur accorder le droit de priorité; mais je puis les citer ici tout aussi bien qu'au *Cherolati* Sch. = *ruficollis* Sch.

Répandu dans toute l'Allemagne et l'Autriche, de Hambourg jusqu'à Vienne, et une des espèces les plus communes.

12°. BAR. VALLESTRIS Hampe, Berl. 1870. 334.

Ressemble un peu au *mollicornis*, mais rostre plus large, très-peu impressionné au bout, prothorax plus étroit, grossièrement et densément ponctué, cuisses non renflées en massue, etc.

Dessous brun de poix, dessus noir de poix, luisant, antennes et pattes d'un brun-rougâtre. Rostre large, aplati en dessus, avec des points profonds, échancré au bout; scrobes profondes et creusées jusqu'aux yeux. Prothorax aussi long que large, un peu dilaté au milieu, grossièrement et très-densément ponctué surtout sur les côtés, avec une ligne médiane lisse élevée. Elytres allongées, peu élargies au milieu, arrondies par derrière, grossièrement striées-ponctuées. Jambes antérieures légèrement arquées ♂, droites ♀; cuisses pas très-renflées. Pubescence blanchâtre assez dense et assez longue. — Long. 4 mill.

Se place après le *mollicornis*.

Autriche, Brünn.

13. BAR. TENEX Bohm. Sch. vi 1843. 140, 31. (*Oncias*.) — Seidl. Otiorh. 1868. 76, 13.

Le *tenax* est, avec le *Companioni* et le *scydnernoides*, le plus petit du genre, et fait le passage au 3^e groupe qui a le rostre très-court, par son rostre court et le sillon profond des scrobes antennaires.

Ovale, luisant, presque glabre. Le rostre un peu plus large que long, légèrement rétréci et arrondi par devant, un peu convexe en dessus, déprimé à l'extrémité. Les scrobes sont profondes, le sillon distinctement plus profond; finement ponctué, assez luisant et courbé en bas verticalement. Le prothorax est plus large que long, régulièrement arrondi sur les côtés, densément ponctué,

d'un éclat assez terne. Les élytres sont courtes, assez fortement arrondies sur les côtés, profondément striées-punctuées, fort luisantes, quelquefois, comme le prothorax, garnies de poils très-fins serrés. Les pattes sont jaune rougeâtre; cuisses assez fortement en massue. — Long. 2,2 à 3 mill.

Le *tenex* est assez largement répandu dans le sud-ouest de l'Autriche et l'ouest de l'Allemagne, Illyrie, Francfort-sur-Mein, surtout sur le Taunus, Crefeld; son habitat est très-variable: tantôt dans les champignons, tantôt dans le bois de chauffage, le plus souvent dans la mousse, souvent aussi en société avec les fourmis, en particulier *Formica rufa* et *fuliginosa*.

Tenex est probablement une faute d'impression pour *tener*, mais il me semble superflu de changer le nom comme étant insignifiant, puisqu'il a un son latin. Le *parvulus* (Ullrich) se rapporte ici d'après le type, tandis que Chevrolat m'a communiqué et a décrit comme *parvulus* un *Om. concinnus*.

14. BAR. INDIGENS Bohm. Sch. Curc. n 1834. 508, 18. (*Omius*.) — Seidl. Otiorh. 1868. 76, 14.

L'*indigens* est distinct par le prothorax long, les élytres sillonnées, et le sillon profond de la scrobe; il a ce dernier caractère commun avec le *sulcifrons*, cependant il est vertical chez lui, et oblique dans le *sulcifrons*.

Oblong, poilu de gris. Le rostre est plus étroit que la tête qui paraît assez large par suite de la saillie des yeux, parallèle, plan en dessus, avec les arêtes tranchantes. Les scrobes antennaires profondes, bordées en dessus d'un rebord élevé et tranchant, le sillon très-profond, à arêtes tranchantes, luisant, recourbé en bas verticalement. Les antennes ont un scape proportionnellement très-court (environ aussi long que les 3 1^{ers} articles du funicule), fortement arqué et en massue. Le prothorax est aussi long que large, légèrement arrondi sur les côtés, densément et grossièrement, presque rugueusement punctué, vêtu d'une fine pubescence serrée. Les élytres, qui sont environ de moitié plus longues que larges, ont les stries punctuées en forme de sillons très-profonds, avec les in-

terstries un peu convexes, et assez densément garnis de longs poils gris espacés. — Long. 3,5 mill.

Le seul exemplaire qui me soit connu est de la collection Schenherret et a vers l'extrémité des jambes antérieures une légère échancrure en dedans. Je le tiens pour un ♂ à cause d'une légère impression de l'abdomen; si c'est une ♀, le ♂ devrait avoir les jambes antérieures plus fortement courbées. — Long. 3,5 mill.

Portugal. Rapporté par M. de Heyden des environs de Coïmbre.

III^e GROUPE.

15. BAR. SULCATIFRONS. — *sulcifrons* Bohm. Sch. vii 1843. 143, 36. — Seidl. Otiorh. 1868. 77, 15. — *rufipes* J. Duv. Cat. Cuc. 1853, 13. — *meridionalis* Muls. Op. xiii 1863. 28.

Le *sulcifrons* est très-reconnaissable par ses petites épaules distinctes, son rostre court très-épais, son sillon frontal et le sillon des serobes antennaires bien limité, se dirigeant obliquement sous les yeux. Cependant l'*indigenus* le dépasse pour la profondeur du sillon, et le suivant ne le lui cède pas pour la brièveté du rostre.

Ovale oblong, luisant, presque glabre. La tête est très-large et convexe, les yeux fort saillants en avant, le rostre deux fois aussi large que long, avec les arêtes arrondies, distinctement canaliculé en dessus jusqu'entre les yeux; les serobes antennaires assez profondes, devenant plus superficielles vers les yeux, leur bord supérieur court, leur bord inférieur dirigé obliquement sous les yeux, tranchant, et près de lui le sillon assez profond, qui reste éloigné des yeux à peu près du double de leur largeur. Il n'est pas assez profond ni assez large pour recevoir le scape entier replié; celui-ci peut seulement s'appuyer dessus. Le prothorax est très-large, presque aussi large que les épaules des élytres; distinctement arrondi sur les côtés, avec sa plus grande largeur derrière le milieu; sur la moitié antérieure avec 2 impressions transverses légèrement convergentes, qui souvent ne sont qu'indiquées, rarement en forme de foyéoles profondes. Les points sont grands, mais superficiels et assez peu serrés; ils sont un peu plus rapprochés sur les côtés et laissent

libre une ligne médiane irrégulière. Les élytres ont de petites épaules distinctes, en angle droit subarrondi, qui dépassent très-peu latéralement la large base du prothorax, de sorte que les deux parties paraissent très-peu séparées l'une de l'autre. Les stries sont fines, les interstries garnis de très-fins petits poils gris (comme le prothorax et le dessous du corps). Les pattes sont tantôt d'un rouge-clair, tantôt d'un brun-foncé. — Long. 3,2 à 4 mill.

Le ♂ est plus étroit et a les cuisses antérieures plus épaisses et les jambes distinctement courbées au bout par en dedans et en dessous; la ♀ est plus large et a seulement les jambes antérieures distinctement courbées.

Découvert d'abord par Walton en Angleterre, il a été décrit plus tard par J. Duval sous le nom de *rufipes* du nord de la France, que Jekel a reconnu bientôt identique au *sulcifrons*. En 1863, il a été décrit comme *meridionalis* du midi de la France, par Mulsant. Cette dernière description, bonne et fort étendue, ne laisse aucun doute qu'elle ne se rapporte au *sulcicollis*; c'est comme s'il ne disait rien que de donner pour caractère distinctif « la surface un peu métallique et son rostre moins profondément sillonné. » J'ai regardé comme superflu de comparer le type qui se trouve dans la collection Godart, à Lyon, avec mes exemplaires d'Espagne. Ceux-ci correspondent entièrement avec un exemplaire de Schœnherr, un ♂ étroit, seulement cet exemplaire a l'impression transversale du prothorax singulièrement profonde, ce qui est individuel, car dans les autres exemplaires d'Angleterre cette impression n'est pas plus profonde que dans ceux d'Espagne.

La grande rareté de l'insecte a été la cause de cette triple description; c'est pour la première fois que, dans notre voyage en Espagne, en 1863, il a été récolté en nombre, sur les monts de Guadarrama, sur le haut de Penalara, où il vit dans le gazon court.

Var. *andalusicus*. J'en ai trouvé un exemplaire dans la sierra d'Alfacor, près de Grenade, qui se distingue de la forme typique par un prothorax beaucoup plus étroit, à peine arrondi sur les côtés, avec une ponctuation plus serrée et plus fine.

La constance de cette variété a besoin d'être établie sur un plus grand nombre d'exemplaires.

16. BAR. CINERASCENS Rosh. Thier. Andal. 1856. 260 (*Omius*). — Seidl. Otiorh. 1868. 79, 16.

Le *cinerascens* est très-voisin du *sulcifrons* par la forme de la tête, le rostre court et épais, et le sillon du rostre profond, mais il s'en distingue par l'arc transverse élevé sur l'extrémité du rostre.

Ovale-oblong, luisant, garni de poils blancs couchés. La tête est très-semblable à celle d'un *Scythropus*, fort convexe, comme bombée, avec les yeux très-avancés par devant, finement ponctuée, luisante. Le rostre est beaucoup plus court que large, un peu rétréci vers le bout, sans arêtes tranchantes, légèrement convexe en dessus, et muni à l'extrémité d'une impression en demi-cercle luisante, qui s'étend presque jusqu'au milieu avec son rebord postérieur en bourrelet. Les scrobes sont superficielles, leur bord supérieur très-court, le sillon assez profond, luisant, bordé en dessous d'un rebord tranchant, en dessus d'un plus faible, dirigé obliquement sous les yeux, séparé d'eux seulement par un espace de leur largeur; il n'est pas assez profond pour cacher le scape, et on peut à peine le voir lorsque celui-ci est rentré. Le prothorax est presque cylindrique, très-légèrement arrondi sur les côtés, distinctement plus large que long, finement et densément ponctué. Les élytres ovales, finement striées-ponctuées, assez densément couvertes, comme le prothorax, de petits poils blanchâtres serrés, et garnies en outre par derrière de quelques-uns en rangées serrées. — Long. 3,5 mill.

Un exemplaire découvert sur la Sierra-Nevada par Rosenhauer, qui l'a décrit très-exactement; j'en ai trouvé un 2^e à Jaen.

XXIV. — PLATYTARSUS (πλατύς, large; τάρσος, tarse)

Sch. Curc. v 1839. 919, 131. — Seidl. Otior. 1868. 80, 32.

S.-Gr^e **Brachysemus** (βραχύς, court; σῶμα, corps) Sch. Disp. Méth. 1826. 99.

Scrobes latérales, le plus souvent fléchies sous les yeux, qu'elles n'atteignent pas.

Rostre plus long, plus étroit que la tête.

Prothorax plus large que long.

Elytres ovales, velues ou squamuleuses.

Abdomen sans squamules, 2^e segment anguleux en devant, plus long que les 2 suivants ensemble.

Cuisses en massue médiocre, mutiques, ongles connés à la base.

Le genre *Platytarsus* comprend des éléments assez hétérogènes, qui cependant ont ensemble plusieurs caractères communs. Les scrobes sont latérales, pour l'ordinaire recourbées en bas dans leur entier, excepté dans le *transylvanicus* et faiblement dans l'*aurosus* et l'*aurohirtus*. Le rostre est plus long et moins épais que dans les *Omius* et *Barypeithes*, et plus distinctement séparé de la tête pour l'ordinaire par une moindre largeur. Le prothorax est toujours plus large que long, quelquefois d'une manière frappante. Les élytres sont en ovale court, seulement assez allongées ♂ dans quelques espèces; leur vestiture consiste ou en poils longs hérissés, en soies ou en squamules, et est toujours plus ou moins épaisse, d'où leur surface n'est pas brillante, à l'exception du *villosulus*. L'abdomen est toujours sans squamules, le 2^e segment anguleux par devant, plus long que les 2 suivants ensemble. Les cuisses sont assez claviformes, non dentées; les tarses proportionnellement larges et longs, seulement dans le ♂ de quelques espèces de dimensions extraordinaires, p. ex. *setiger* ♂, les antérieurs sont aussi longs que les jambes, les ongles sont soudés à la base.

Le genre est aussi voisin des *Barypeithes* que des *Trachyphlaeus*, et fait le passage des *Otiorynchides*, dans la plus large acception du mot, aux *Brachyderides*, parmi

lesquels ils sont placés par Schœnherr et Lacordaire. Quoiqu'on ne puisse pas méconnaître la ressemblance de quelques espèces avec quelques *Foucattia*, le placement du genre parmi les *Brachyderides* n'est pas naturel, puisque d'abord chacun rattache sans hésitation ces insectes au genre *Omius*, et que Schœnherr lui-même place dans ce genre non-seulement les espèces voisines qui toutes possèdent les mêmes scrobes, mais encore la ♀ du *Plat. setiger*. En second lieu, si une portion du genre pouvait être rattachée aux *Brachyderides*, l'autre devrait en être exclue, tels que *transylvanicus*, *aurosus* et *aurohirtus*, puisque dans ceux-ci le sillon antennaire n'est pas courbé sous les yeux, ce qui est toujours le cas dans les *Brachyderides*. Le genre se distingue des *Foucattia* par une tête beaucoup plus étroite et un rostre plus long, plus parallèle et en particulier par les antennes épaisses avec le scape long, le funicule plus court et la massue plus épaisse, tandis que les *Foucattia* ont un scape court et mince, un funicule long et une tête très-épaisse avec un rostre court et en pointe. Le *Pl. aurohirtus* a une grande ressemblance avec les *Foucattia*, cependant celui-ci ne présente pas le sillon antennaire courbé en bas, pendant que *Pl. hispidus*, qui le présente le plus fortement courbé et par là se rapproche bien davantage des *Foucattia* et *Sciaphilus*, se distingue de nouveau par une tête plus étroite et un funicule court.

Le *Pl. aurosus* a aussi une assez grande ressemblance avec quelques *Sciaphilus*, et Schœnherr le place dans ce genre, quoiqu'il n'ait pas le sillon antennaire courbé en bas.

Les *Platyfarsus* se distinguent des *Omius*, lorsque le sillon antennaire oblique manque, par la présence de squamules ou de soies épaissies; des *Barypeithes* par la même marque, et, si elle manque, en ce que le sillon antennaire est en entier courbé en bas, tandis qu'au contraire dans les *Barypeithes* il n'y a que leur partie inférieure enfoncée. Le genre diffère des *Trachypheus*, avec lesquels le *transylvanicus* a une grande ressemblance, par l'abdomen sans squamules, les antennes plus grêles, et par le sillon antennaire qui, s'il est nettement limité, n'atteint pas les

yeux. Le genre se reconnaît des *Ptochus*, auxquels l'*aurosus* ressemble beaucoup et près desquels il se place (p. ex. *periteloïdes*), par les scrobes antennaires latérales, l'avance intercoxale large qui cependant n'est pas toujours tronquée droit, mais finit quelquefois en pointe un peu obtuse.

Le genre, établi d'abord par Schœnherr comme *Brachysomus* (Disp. Méth.), a été décrit pour la première fois en 1810 sous le nom de *Platytarsus*, et sur une seule espèce (*setiger*), l'une des 2 espèces qui le composaient dans le principe (*hirsutulus*), ayant été réunie au genre *Omius*. Les autres espèces ont été décrites dans le 7^e volume, comme faisant partie les unes du genre *Omius* (*villosulus* Germ. et *pruinus* Sch. = *setiger* ♀); les autres, dans les *Mantissa*. comme des *Strophosomus* (*setulosus* Sch. et *hirtus* Sch.) et des *Sciophilus* (*aurosus*). Si Schœnherr ne se fût pas départi de la réunion primitive dans un même genre (*Brachysomus*), ces espèces voisines n'eussent pas été malencontreusement dispersées. Quoique le nom de *Brachysomus* soit réellement le plus ancien, celui de *Platytarsus* doit cependant avoir la préférence, puisque Schœnherr lui-même a remplacé le 1^{er} par le 2^e.

Aux 2 espèces décrites anciennement (*Cureulio echinatus* Boud. = *C. hirsutulus* F. et *Trachyphloeus villosulus* Germ.), viennent s'ajouter 3 espèces décrites par Schœnherr (*Plat. setiger* = *Om. pruinus*, *Stroph. setulosus* = *St. hirtus*, *Sciophilus aurosus*), 1 par Redtenbacher (*Scioph. hispidus*) et 3 nouvelles.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

- A Squamules brillantes d'argent ou d'or; funicule plus long que le scape.
- B Scrobe distincte, dirigée vers le bord inférieur de l'œil; soies dressées courtes.
 - 1. *aurosus* Bohm. Sch. I A Alg.
- B' Partie des scrobes fléchie indistincte; soies dressées plus longues.
 - 2. *aurohirtus* Seidl. T.
- A' Squamules nulles ou opaques; funicule plus long que le scape.
- B Scrobe s'abaissant sous les yeux.

C Soies ou squamules simples.

D Squamules nulles; antennes épaisses.

E Pubescence des élytres courte; ♂ poils couchés peu nombreux; tarsi intermédiaires pas plus courts que les jambes; ♀ poils couchés très-serrés. *5. setiger* Gyl. Sch. A.

E' Pubescence des élytres longue, poils couchés presque nuls; ♂ tarsi intermédiaires beaucoup plus courts que les jambes.

4. villosulus Germ. A.

D Squamules subarrondies.

E Seulement sur les côtés du prothorax, élytres garnies de poils couchés et de soies dressées.

5. echinatus Lonsd. S F A R.

E' Prothorax et élytres squamuleux.

F Squamules plus épaisses: rostre plus étroit.

6. hispidus Redt. A.

F' Squamules vagues; rostre plus large.

7. subnudus Seidl. A.

C' Soies couchées bifurquées, épaisses, peu dressées.

8. sculosus Bohm. Sch. B F A I.

B' Serobe non défléchie, bordée seulement en devant, subfovéiforme, non profonde.

9. amphibius (*transylvanicus* Seidl.) Transyl.

Les *Platytarsus* sont représentés en Autriche de la manière la plus riche, puisqu'il y en a 7 espèces sur 9, et que les 2 autres se trouvent dans les contrées voisines, Transylvanie et Turquie. Jusqu'ici on n'en a trouvé que 3 au nord et à l'ouest de l'Autriche: *sculosus*, en Allemagne, France, Italie et Suisse: *aurosus* en Italie et Sicile, et *echinatus* dans toute l'Europe.

4. PLAT. AUROSUS Bohm. Sch. vm 2, 1845. 404, 41-42 (*Sciaphilus*.) — Germ. Fn. Eur. xxiv 12. — *sulcirostris* Chevrl. Guér. Rev. 1860. 130 (*Sciaphilus*).

L'*aurosus* rappelle dans son faciès un *Polydrosus* ou un *Phyllobius*, ce qui est dû à ses épaules marquées et à ses élytres un peu ventrues par derrière. Le sillon antennaire diffère de celui de la plupart des autres espèces, car il ne va pas sous les yeux, mais simplement vers leur bord inférieur; par devant il est distinctement, nettement limité,

profond et étroit ; par derrière, un peu moins distinct. Le rostre est plan en dessus, assez parallèle, les yeux sont gros et saillants, mais la tête elle-même n'est pas large. Les antennes s'éloignent de celles des autres (excl. *aurohirtus*), en ce que leur funicule est distinctement plus long que le scape, en quoi les 2 espèces se rapprochent des *Foucartia*, tandis que leur sillon antennaire les en éloigne plus que les autres *Platytarsus*.

Le prothorax est tout-à-fait cylindrique, à peine arrondi sur les côtés, tronqué et de même largeur derrière et devant ; il y a sur les côtés des squamules allongées, jaunâtres, un peu brillantes d'or, dans le milieu cependant de petits poils serrés de même couleur. Sur les élytres, ces squamules sont plus largement réparties et peuvent les couvrir entièrement dans les exemplaires frais ; toutefois elles ne sont pas très-rapprochées et laissent voir le fond noir. Chaque interstrie porte une rangée de très-courtes petites soies qu'il est aisé de ne pas apercevoir. Les élytres ont les épaules marquées mais pas larges, sont un peu élargies en ventre par derrière, plus larges ♀ que dans le ♂ et assez fortement convexes en dessus. Les pattes et tarses sont étroits et longs en comparaison avec *setiger*. — Long. 3 à 3,8 mill.

La patrie de l'*aurosus* est la Sicile, l'Italie et l'Autriche. M. Puton me l'a communiqué d'Alger comme étant le *Sciaphilus sulcirostris* Chevrl., allégation qui n'est en rien contredite par la description de Chevrolat.

2. PLAT. AUROHIRTUS Seidl. Otiorh. 1868. 85. 2.

L'*aurohirtus* est très-voisin de l'*aurosus*, mais il s'en distingue particulièrement par les points suivants : le rostre est un peu élargi par devant, tandis que les bords tranchants du sillon antennaire débordent un peu latéralement ; le sillon antennaire, serré et profond par devant entre ces bords tranchants qui ne s'étendent pas loin par derrière, devient tout plat et indistinct aussitôt qu'il s'avance entr'eux par derrière, et on ne voit qu'une trace de sa direction vers le bord inférieur des yeux ; les antennes sont un peu plus épaisses que dans l'*aurosus* ; le prothorax est plus fortement arrondi sur les côtés et garni ru-

gueusement de courtes soies, en outre des squamules limitées sur les côtés; les élytres ont des poils beaucoup plus longs et plus serrés, et sont plus arrondie sur les côtés, par suite de l'effacement des épaules. — Long. 2,5 à 3,5 mill.

♂ Elytres plus étroites, ♀ subglobuleuses.

Les 2 sexes ressemblent pour le faciès au *setiger* et au *villosulus*, mais ils ont le dos plus convexe; ils s'en rapprochent aussi plus que l'*aurosus*, par les antennes et les pattes plus épaisses.

L'*laurohirtus* a été récolté près de Constantinople, avec le *Mylacus armatus*.

3. PLAT. SETIGER Gyl. Sch. Curc. v 1839, 921, 1. — Seidl. Otior. 1868. 85, 3. — ♀ *pruinosis* Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 133, 119. (*Omius*). — Redt. Fn. Aust. Ed. 2. p. 737.

Le *setiger* a une forme très-variable, puisque la ♀ a les élytres larges et se rapproche un peu en ce point de l'*echinatus*, pendant qu'elles sont étroites ♂.

Le rostre est large, tout plan en dessus ainsi que la tête, distinctement strigueux longitudinalement; le sillon antennaire est dirigé obliquement sous les yeux. Le scape des antennes est un peu courbé, assez fortement épaissi vers le bout, le funicule épais et court, la massue presque plus longue que la moitié de celui-ci et très-épaisse. Le prothorax est plus large que long, assez fortement arrondi sur les côtés, tronqué et presque d'égale largeur devant et derrière, densément garni de petites soies épaisses demi-serrées. Les élytres sont d'environ moitié ♂, souvent plus du double ♀, aussi larges que le prothorax, arrondies sur les côtés et légèrement convexes en dessus, légèrement atténuées en pointe par derrière, profondément striées-punctuées; les interstries sont plus étroites et par là même plus élevés ♂, et présentent entre les poils plus longs dressés, de toutes petites soies peu rapprochées, qui, chez la ♀, forment sur les interstries les plus larges un feutre épais divisé seulement par les stries. Les pattes sont sans marques distinctives à l'exception des tarses ♂, qui sont très-larges (les 2 1^{ers} articles presque aussi larges que le 3^e) et qui, aux pattes antérieures

et intermédiaires, sont aussi longs que les jambes. Schœnherr décrit cette disposition comme un caractère sexuel; cependant il ne convient qu'au ♂ de cette espèce, qu'il a décrit sous le nom de *Platytarsus setiger*, tandis qu'il donne la ♀ sous celui d'*Omius pruinus*, et l'étiquette dans sa collection comme *Omius setosus* N. Spec. Le ♂ paraît être plus rare que la ♀. — Long, 2,5 à 3,5 mill.

Antriche (Vienn), pas rare.

4. PLAT. VILLOSULUS Germ. Ins. Spec. 1824. 406, 551 (*Trachyphloeus*). — Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 132, 18 (*Omius*). — Seidl. Otiorh. 1826. 86, 4.

Le *villosulus* ressemble beaucoup au *setiger*, et il suffit de faire connaître les différences : le rostre est un peu plus court et un peu plus étroit par devant, le funicule est encore plus court, seulement un peu plus long que la massue, qui est très-grosse; les soies, couchées sur le prothorax, sont fines et éparses, et manquent d'ordinaire complètement sur les élytres; au contraire, les poils dressés sont beaucoup plus longs, peu épais et blancs, tandis que dans le *setiger* ils ont une couleur un peu plus foncée. Les pattes sont conformées comme dans le *setiger*; mais les tarses du ♂, qui est plus étroit, ne sont pas différents de ceux de la ♀, qui est plus robuste, et sont beaucoup plus courts que les jambes. — Long. 2,5 à 3,5 mill.

Le *villosulus* n'est pas rare en Autriche (Vienn).

5. PLAT. ECHINATUS Borsd. Curc. Suec. ii 1785. 33, 21 f. 22. — Payk. Mon. Curc. 92. — Latr. Hist. nat. xi 168 (*Brachyrhinus*) — *hirsutulus* F. Ent. S. ii 1793. 468 (*Curculio*). — Gyl. Sch. Curc. ii 1834. 505. 12 (*Omius*). — ? *hispidulus* Herbst. Col. vi 1793. 354. Pl. 87, 14 (*Curcul.*).

L'*echinatus* est très-reconnaissable par les squamules blanches arrondies qui revêtent les côtés du prothorax, et pour le reste, par le manque de squamules. Le rostre est plus court et plus étroit au bout que dans le *setiger*, et le sillon antennaire est court et indistinct. La tête et le rostre sont plans en dessus, et en outre des poils serrés garnis comme une brosse d'épaisses soies écartées. Les antennes sont plus grêles que dans le *setiger*, la massue aussi

longue que la moitié du funicule. Le prothorax est transversal, près de 2 fois aussi large que long, tronqué devant et derrière, légèrement arrondi sur les côtés, densément garni au milieu d'épaisses soies brunes serrées, sur les côtés de squamules arrondies, blanchâtres, en outre garni de soies assez courtes, dressées. Les élytres sont très-arrondies, mais un peu en pointe par derrière, les épaules tout-à-fait arrondies, au milieu plus de 2 fois aussi larges que le prothorax, distinctement striées-punctuées, les interstries plans, pas très-densément couvertes d'épaisses soies serrées, et en outre garnies de rangées de soies assez longues, dressées. — Long. 2,5 à 3 mill.

Echinatus a l'habitat le plus étendu de toutes les espèces, puisqu'il s'étend de Suède et de Finlande jusqu'en Transylvanie, Tyrol et France, et n'est rare nulle part.

Fabricius a changé, sans fondement, l'ancien nom d'*echinatus* Bonzd. en *hirsutulus* (procédé qui lui est familier), et tous les auteurs postérieurs l'ont suivi aveuglément. Il est juste de restituer à cette espèce son nom le plus ancien.

6. PLAT. HISPIDUS Redt. Fn. Austr. Ed. 1. 1849. 455 (*Sciophilus*). — Seidl. Otiorh. 1868. 88, 6.

L'*hispidus* ressemble beaucoup au *subnudus*. Le rostre est plus étroit et plus long, et les yeux sont plus saillants; le sillon antennaire est plus profond et plus nettement limité; le funicule plus grêle et le scape plus droit; les élytres sont plus finement striées, les interstries plus plans et enfin toute la surface uniformément et assez densément garnie de squamules arrondies, beaucoup plus grandes; les soies dressées sont toujours plus épaisses et plus serrées. — Long. 2 à 2,5 mill.

Il ne me paraît pas douteux que cet insecte ne soit l'*hispidus* Redt., puisque sa description s'y adapte parfaitement; en ne tenant compte que des scrobes, il devrait être reporté aux *Sciophilus*.

Propre également à l'Autriche, mais paraît être bien plus rare que le *subnudus*.

7. PLAT. SUBNUDUS Seidl. Otiorh. 1868. 88, 7.

Ovale, scrobes profondes s'abaissant sous les yeux qui

sont saillants, en général plus allongé que l'*echinatus*, mais souvent encore plus épais, parce que les épaules sont toujours distinctement saillantes; il est, du reste, semblable à l'*echinatus*, et n'en diffère que dans les points suivants : Les antennes, surtout le funicule, plus épaisses, le scape un peu plus fortement courbé; le prothorax plus long, plus rétréci à la base, pas 2 fois aussi large que long; les élytres ont les épaules distinctement arrondies, sont par là latéralement moins fortement arrondies, ♀ plus de 2 fois aussi larges que le prothorax, ♂ plus étroites, elles sont profondément striées-punctuées, avec les interstries un peu convexes, et très-éparsément garnies, comme le prothorax, de petites squamules punctiformes, assez arrondies, entre lesquelles de petites soies, qui sont très-courtes en comparaison de celles de l'*echinatus*. — Long. 2,5 à 3 mill.

Le ♂ a les tarses plus larges et plus longs que la ♀, ils sont aux pattes intermédiaires un peu plus courts que les jambes, cependant pas aussi larges que dans le *setiger*.

Autriche (Vienne), pas rare.

8. PLAT. SETULOSUS Bohm. Sch. Curc. viii 2. 1845. 400, 25-26 (*Strophosomus*). — Seidl. Otiorh. 1868. 89, 8. — *hirtus* Bohm. Sch. Curc. viii 2. 1845. 399, 25-26 (*Strophosomus*).

Le *setulosus* ressemble beaucoup à l'*echinatus* pour le faciès, cependant il se distingue tout d'un coup des autres espèces par la forme du prothorax; il se reconnaît en outre par la forme particulière des soies squamuliformes serrées des élytres, qui sont furciformes. On trouve une conformation analogue dans les vrais *Hypera*, sur la vestiture desquels Kiesenwetter a appelé l'attention dans son travail sur les Coléoptères de Grèce, par ex.: *fuscata*, *contaminata*, etc., et *Bubalocephalus Kiesenwetteri* décrit plus haut.

Le rostre est un peu plus étroit que dans l'*echinatus* et muni d'un sillon longitudinal plus ou moins profond, qui n'est que rarement indistinct et superficiel; dans ce cas, le sillon antennaire devient aussi distinct. Les antennes sont assez délicates, surtout le funicule; la massue très-épaisse cependant plus courte que la moitié du funicule.

Le prothorax est légèrement étranglé tout près du sommet et de la base, assez fortement arrondi sur les côtés. Les élytres sont un peu plus longues que dans l'*echinatus*, distinctement striées-punctuées, éparsément garnies de longues soies dressées, et densément couvertes, ainsi que le prothorax et la tête, de petites soies squamuliformes serrées, qui sont bifurquées longitudinalement et à partir du milieu à peu près en 2 pointes divergentes. — Long. 2,5 à 3 mill.

Le *setulosus* a été décrit sous 2 noms à la suite l'un de l'autre d'une manière très-reconnaissable, et les 2 descriptions sont si conformes (en d'autres termes) qu'on en peut déduire l'identité des espèces sans avoir besoin de confronter les types. Par suite de son placement malencontreux parmi les *Strophosomus*, qui contrarie les mots « *Om. hirsutulo proximus*, » par lesquels Schœnherr commence la description de l'*hirtus*, cette espèce était restée inconnue, et l'insecte, étant commun, se trouve dans les collections sous différents noms.

Le *setulosus* est des plus répandus après l'*echinatus* : Autriche (Vienne) où il est commun, Allemagne, Angleterre, France, Suisse, Italie.

9. PLAT. AMPHIBIUS. — *transylvanicus* Scidl. Otiorh. 1868. 90, 9.

Le *transylvanicus* est une forme un peu anormale et pourrait être écarté du genre, mais ne pourrait trouver une place naturelle dans aucun autre. Il se rapproche des *Trachyphleus* par la squamosité épaisse irrégulière, et par son corps massif, mais il s'en éloigne par son abdomen dépourvu de squamules et ses antennes plus longues; il est voisin des *Omius* par la forme des serobes, mais il a des squamules distinctes qui le rattachent aux *Platytarsus*, où il se rapproche des *subnudus*, *setulosus* et *hispidus*. Le rostre et la tête ressemblent à ceux du *setulosus*, les antennes sont presque aussi épaisses que dans le *setiger*, cependant la massue est seulement moitié aussi longue que le funicule.

La tête est légèrement convexe, un peu impressionnée transversalement devant les yeux. Le rostre un peu plus étroit, quelquefois avec une ligne médiane enfoncée. Les

scrobes latérales mais un peu rapprochées l'une de l'autre en dessus, grandes et superficielles, triangulaires, seulement leur bord supérieur distinct par devant, un peu courbé en bas par derrière et finissant bien avant les yeux. Ceux-ci tenant le milieu entre le bord supérieur et le bord inférieur des côtés de la tête, légèrement convexes. Le scape des antennes est placé sous les yeux par le bord supérieur des scrobes un peu courbé en bas; il est long, peu courbé, peu et graduellement épaissi vers le bout; le funicule est assez grêle. Le prothorax est large, uniformément arrondi sur les côtés, tronqué par devant et à peine plus étroit que par derrière, densément squamuleux. Les élytres sont en ovale court, distinctement striées; les interstries pas très-densément squamuleux et garnis de petites soies, de manière qu'on peut entrevoir le fond. — Long. 2,5 à 3,5 mill.

Cette dernière circonstance fait présumer qu'on a sous les yeux le *Trachyphilæus sabulosus* Redt., cependant le « profond et étroit sillon » du rostre, que le dernier doit avoir et qui manque dans notre insecte, ne permet pas de croire à cette supposition. Les pattes sont semblables à celles du *setiger*, mais les jambes ont l'extrémité un peu avancée en crochet. Les tarses ne sont pas larges mais proportionnellement courts; les ongles un peu séparés mais soudés à la base.

Le *Transylvanicus* a été trouvé par Fuss dans les environs d'Hermanstadt.

XXV. — TRACHYPHILÆUS (τραχὺς, *raboteux*; φλοιός, *écorce*)

Germ. Spec. 1824. 403. — Sch. Disp. 1826. 189, 105. — Curc. II 489, 161. — Lacd. Gen. VII 192. — Seidl. Otiorh. 1868. 91, 34.

Mitomermus J. Duv. Gen. Curc. 1853. 33. — **Lacordairius**
Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. 1868. 413.

Scrobes latérales, profondes et bien limitées, atteignant pour l'ordinaire les yeux.

Rostre court, à callosités anguleuses.

Antennes courtes ; scape d'ordinaire très-fortement en massue, couvrant les yeux au repos.

Prothorax transversal, arrondi ou anguleux sur les côtés.

Elytres courtes, ovales ou subglobuleuses, squamuleuses.

Abdomen vêtu de squamules opaques ; avance intercoxale large, tronquée ; 2^e segment droit ou arqué en avant, plus court ou plus long que les suivants réunis.

Cuisses mutiques ; jambes dentées ou épineuses ou mutiques au bout ; ongles soudés ou libres.

Le genre *Trachypylus* se reconnaît à son corps court et ramassé, qui est plus ou moins rude par ses squamules et ses soies, sans être jamais luisant. Le rostre n'est pas arrondi, mais toujours à arêtes ordinairement en bourrelet. Les serobes sont profondes et bien limitées, et atteignent plus ou moins les yeux, elles sont entièrement latérales, seulement quelquefois elles paraissent se rapprocher en dessus par devant, dans ce cas les ptéryges sont épaissies ; celles-ci ne forment pas de lobes saillants, mais des bourrelets. Les antennes sont courtes ; le scape est ordinairement très-fort et très-épais, en massue, il avance sur les yeux qui sont en général aplatis. Le funicule est très-mince proportionnellement au scape, 1^{er} article toujours bien plus épais que le suivant qui a la base très-menue. Le prothorax est toujours plus large que long, souvent très-court, non cylindrique, mais arrondi ou anguleux sur les côtés, quelquefois (et non toujours comme le dit Lacordaire) marqué d'une impression ou d'une petite bosse. Les élytres sont courtes, souvent pas plus longues que larges, parfois très-convexes, densément squamuleuses ; dans le *granulatus* seul on ne reconnaît pas d'écailles. L'abdomen est vêtu de squamules mates, analogues à celles du dessus. La suture entre le 1^{er} et le 2^e segments est anguleuse, légèrement arquée ou droite, le 2^e segment varie de longueur dans les différents groupes. Les pattes sont courtes ; les cuisses plus ou moins en massue, cependant inermes ; les jambes à l'extrémité garnies souvent de dents ou d'épines longues, ou simples ; les ongles libres ou soudés.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

A Scrobes pour la réception du scape distinctes entre les yeux et le bord latéral saillant du front.

1^{er} GROUPE.

B Funicule de 5 à 6 articles; jambes antérieures digitées.

C 3^e article des tarses à peine plus large que le 2^e; prothorax transversal, dilaté en angle après le sommet.

D Funicule de 5 articles; prothorax pas 2 fois plus large que long. 1. *Scidlitzii* Bris. Esp.

D' Funicule de 6 articles; prothorax plus de 2 fois plus large que long.

2. *pustulifer* (pustulatus Seidl.) Esp.

C' 3^e article des tarses large, bilobé; prothorax également arrondi sur les côtés; funicule de 5 articles robuste. 5. *Reicheianus* (Reichei Seidl.) Tanger.

B' Funicule de 7 articles.

C Elytres noduleuses; 3^e article des tarses de peu plus large que les autres.

D Nodules très-petits, nombreux; stries visibles.

4. *Godarti* Seidl. Algérie.

D' Nodules plus grands sur les interstries alternes 4 à 5; stries non visibles.

5. *nodigenis* Chevrol. Alg. Sic.

C' Elytres sans nodules; 3^e article des tarses large, bilobé.

D Vertex marqué d'une ligne fine, bifurquée sur le front, chaque branche se dirigeant vers le bord antérieur des yeux. 6. *cruciatu*s Seidl. Alg.

D' Vertex simple. 7. *orbitalis* Seidl. Alg.

A' Yeux assez saillants; bord latéral du front non saillant au-dessus des yeux; scrobes n'allant que jusqu'à leur bord antérieur.

B Jambes antérieures digitées et épineuses au bout; 2^e segment de l'abdomen arqué en avant, aussi long que 3 et 4 réunis.

2^e GROUPE.

C Dos du rostre un peu rétréci vers le bout.

- D Jambes antérieures armées au bout de petits denticules.
- E Tous les interstries également garnis de soies.
- F Soies longues, dressées; élytres subparallèles, peu plus larges que le prothorax; angles postérieurs du prothorax obtus. 8. *parallelus* Seidl. Hong.
- F' Soies courtes; prothorax arrondi par derrière.
9. *laticollis* Bohm. Sch. FAI Nat.
- E' Interstries alternes seuls garnis de soies, un peu élevés. 10. *alternans* Gyl. Sch. FI Hong. C.
- D' Jambes antérieures armées au bout d'un denticule intermédiaire très-long, bifide à son extrémité.
- E Rostre plus long, plus fortement rétréci vers le bout sur son dos (ce qui rend les scrobes visibles en dessus); élytres garnies de petites soies dressées en massue. 11. *Trequi* Seidl. Cypre.
- E' Rostre plus court, peu rétréci vers le bout.
- F Prothorax plus large à la base; élytres garnies de soies fines un peu en massue, éparses.
12. *spinimanus* Germ. FA Podol.
- F' Prothorax fortement rétréci à la base; élytres à peine plus longues que larges, garnies de quelques squamules un peu dressées.
13. *digitalis* Gyll. S
- C' Dos du rostre large, parallèle, creusé dans sa longueur. 14. *scabriculus* L. SF Dalm.
- B' Jambes antérieures ordinairement mutiques au bout, plus rarement garnies de courtes épines, jamais digitées.
- C 2^o segment abdominal droit en devant, plus court que 3 et 4 ensemble.
- D Jambes antérieures inermes au bout; ongles connés.
- 3^e GROUPE.
- E Front déprimé au devant du rostre, qui n'est pas plus long que large.
- F Prothorax plus de 2 fois plus large que long, avec des plis rugueux profonds; dos du rostre dilaté sur les marges au milieu.
15. *ventricosus* Germ. I Hong.

F' Prothorax pas 2 fois plus large que long; rostre avec les marges droites en dessus.

G Prothorax marqué de rides obsolètes; dos du rostre à marges parallèles; funicule épais.

16. *rugaticollis* (rugicollis Seidl.) Dalm.

G' Prothorax sans rides; dos du rostre à marges convergentes; funicule grêle.

17. *gracilicornis* Seidl. Syr.

E' Front continu avec le rostre, plan; rostre plan en dessus, plus long que large.

18. *ypsilon* Seidl. Hong.

D' Jambes antérieures garnies au bout de courtes épines; ongles libres; rostre légèrement étranglé à la base.

4^e GROUPE.

E Elytres finement striées; interstries inégaux et onduleux, avec de très-courtes soies, assez rares.

19. *scaber* L. Eur.

E' Elytres profondément striées; interstries également convexes.

F Elytres plus étroites, parallèles, garnies de soies plus longues, peu en massue, un peu dressées.

20. *seternis* (setiger Seidl.) F E Sic. Alg.

F' Elytres plus larges, garnies de soies épaisses, squamiformes, dressées.

21. *algerinus* Seidl. Oran.

C' 2^e segment abdominal arqué en avant, aussi ou plus long que 3 et 4 ensemble, excepté *Tr. aristatus* et *squamulatus* dont les jambes antérieures sont mutiques et les ongles libres. — Ongles libres, plus rarement connés (*granulatus* et *syriacus*).

D Jambes antérieures brièvement épineuses ou hispidées au bout; corps oblong, subdéprimé.

5^e GROUPE.

E Rostre très-court; prothorax fortement rétréci à la base; élytres parallèles, plus longuement hispidées.

22. *variegatus* Küst. Méd. Alg.

E' Rostre court; prothorax large à la base; élytres ovales, à soies courtes.

23. *brevirostris* Bris. E

D' Jambes antérieures mutiques au bout; corps plus court.

6^e GROUPE.

- E Ongles libres ; rostre non étranglé à la base.
 F Scrobes linéaires s'inclinant vers le bord antérieur de l'œil.
 G Scrobes atteignant les yeux, moins profondes.
 II Scrobes droites, allant plus ou moins horizontalement aux yeux.
 I Prothorax transverse, fortement arrondi sur les côtés ; élytres garnies de soies squamiformes en massue. 24. *aristatus* Gyll. Eur.
 I' Prothorax plus étroit, peu arrondi sur les côtés ; élytres garnies de soies fines.
 25. *squamulatus* Ol. Eur. mér.
 II' Scrobes courbées, descendant vers les yeux ; prothorax plus étroit ; élytres garnies de soies fortement en massue. 26. *myrmecophilus*.
 G' Scrobes très-profondes, cessant avant les yeux ; prothorax transverse. 27. *quadrummus* Seidl. E
 F' Scrobes triangulaires, leur bord inférieur défilé-chi. 28. *inermis* Bohm. Sch. A
 E' Ongles connés ; rostre un peu étranglé à sa base.
 F Elytres granulées.
 29. *granulus* (granulatus Seidl.) F^s
 F' Elytres squamuleuses.
 50. *syrus* (syriacus Seidl.) Syr.

Depuis la publication de la Monographie de ce genre, ont paru : *Trachypylæus maculatus* Perris (Abeille vii 1869, p. 24) et *Trachypylæus coloratus* Allard (Berl. Ent. Zeit. 1869, p. 325). Quand on étudie un peu les *Trachypylæus* d'après cette Monographie, il est impossible de ne pas remarquer que les yeux et la forme des jambes jouent un rôle important pour reconnaître les nombreuses espèces de ce genre difficile, tandis que la coloration n'a qu'une valeur tout-à-fait secondaire. Par conséquent, des descriptions qui se bornent à donner la couleur des jambes sans rien dire de leur forme ni des yeux, ne sont nullement propres à faire reconnaître les espèces. Il ne serait pas impossible que les 2 espèces en question ne soient synonymes du *Trachypylæus laticollis* Sch.

Le genre *Trachypylæus* fut établi par Germar, en 1824,

pour 6 espèces dont 2 doivent être retranchées, *ruficollis* Fab. qui est un *Barypeithes* et *villosulus* qui est un *Platytarsus*. Gyllhenhall (Ins. Suec. iv 1827) en décrit 2 nouvelles espèces : *Curculio aristatus* et *digitalis*, et enfin Schœnherr (1843) réunit 22 espèces (*alternans* seulement dans le 2^e volume) dans le genre *Trachypplus*, dont 4 (*notulatus*, *squalidus*, *melanothrix* et *Waltoni*) doivent être reportées aux *Cenopsis* et 6 exclues comme synonymes (*squamosus*, *tessellatus*, *setarius*, *lanuginosus*, *asphaltinus*, *squamifer*); de sorte qu'il n'en reste que 12, dont l'une *asperatus* Bohm. Sch. (d'Amérique) m'est inconnue.

On trouve, dans des publications postérieures : *Trach. erinaceus* Redt., *sabulosus* Redt., *Larraldi* Perris, *anoplus* Fœrst., *nodipennis* Chevrl., *spinosulus* Gaut., *rectus* Thoms., dont *Larraldi* fait partie du genre *Cenopsis*, et les autres étaient décrites, à l'exception du *nodipennis*.

Il y a encore quelques espèces de *Curculionides*, décrites sous d'autres noms de genre, qu'il faut rapporter ici : *Cathormiocerus variegatus* Küst. et *Mitomermus hystrix* Duv. (identique au précédent). Où doit se placer le *Mitomermus Raymondi* de Gautier des Cottés? je ne saurais le reconnaître d'après la description longue, mais sans valeur, de cet insecte; cependant si l'on juge par analogie avec les insectes décrits par le même auteur, ce doit être probablement une espèce depuis longtemps connue. On peut tenir le même langage du *Mitomermus canaliculatus* de Schaufuss.

Enfin, dans ces derniers temps, M. Ch. Brisout de Barneville a publié deux espèces qui se rapportent à ce genre, *Peritelus brevirostris* et *Lacordairius Seidlitzii*, ainsi le nombre total des *Trachypplus* décrits se montent à 17, dont un seul de l'Amérique du Nord (*asperatus*) m'est resté inconnu, et j'en fais connaître 16 nouvelles, appartenant toutes à la faune élargie d'Europe.

Les 32 espèces qui me sont connues peuvent se répartir de la manière suivante : 2 se trouvent exclusivement dans le sud de l'Afrique, 3 en Algérie, 3 en Algérie, Sicile, Espagne et France méridionale, 3 en Espagne, 1 dans le sud de la France, 1 en Autriche, 3 en Hongrie, 1 en Dalmatie et Roumélie, 2 en Syrie, 1 à Cypre, 1 en Suède,

les 7 autres (*laticollis*, *alternans*, *spinimanus*, *scabriculus*, *scaber*, *aristatus*, *squamulatus*) ont un habitat plus étendu et se trouvent dans la plus grande partie de l'Europe jusqu'au Caucase et l'une d'elles jusqu'à Madère.



1^{er} GROUPE. — Marge latérale du front avancée au-dessus des yeux; scribe distincte au-dessus des yeux.

Le 1^{er} groupe se compose d'espèces assez voisines (excepté les 2 espèces du cap) et peut être dit naturel. Cependant on ne peut en former un sous-genre parce qu'il se rattache étroitement aux groupes suivants, et encore moins un genre à part, comme Ch. Brisout a établi le genre *Lacordairius* avec l'une de ces espèces qui réunit, il est vrai, plusieurs caractères qui ne se retrouvent pas dans les espèces voisines et paraît différer génériquement des *Trachyphtes*. Brisout signale surtout le funicule de 5 articles et les yeux petits; un 3^e caractère qu'il ne mentionne pas ce sont ses tarses étroits. Ces 3 caractères se retrouvent partiellement dans d'autres espèces du groupe. Dans le *pushtulatus* le funicule est de 6 articles, et on retrouve les 2 autres caractères; dans le *Reichei*, les tarses sont larges, en particulier le 3^e article, mais les antennes et les yeux sont comme dans le *Seidlitzii*; dans le *Godarti* et le *maculosus*, les yeux et les tarses sont les mêmes, et le funicule est 7-articulé; dans l'*orbitalis* et le *cruciatus* enfin, les yeux sont seulement semblables, et c'est moins leur petitesse que leur position enfoncée qui le distingue et la circonstance qu'au-dessus d'eux il y a le scape pour recevoir un enfoncement distinct limité par l'avance du bord latéral. Ce caractère se trouve dans toutes les espèces du groupe (même dans *spathulatus* et *brevis*) et le distingue de tous les autres groupes.

Les jambes postérieures ont une structure particulière, qui est tantôt plus tantôt moins prononcée, et se retrouve à un moindre degré dans quelques espèces d'autres groupes; ce qui prouve que les *Trachyphtes* sont très-voisins des espèces à corbeilles cavernieuses, par ex. des *Oosomides*.

Les jambes antérieures sont pour l'ordinaire fortement

entées comme dans les groupes suivants, cependant elles sont aussi quelquefois simplement dentées (*cruciatus*, *nodipennis*, *brevis* et *spathulatus*).

Les ongles sont libres, soudés à la base seulement dans le *spathulatus*.

Les scrobes sont grandes et profondes et elles s'avancent jusqu'aux yeux, qui sont placés de manière qu'on pourrait dire qu'ils sont dans les scrobes et à leur bord inférieur. Le *spathulatus* du Cap s'éloigne de cette structure et peut-être devrait-il être retranché du genre. *Tr. brevis*, aussi du Cap, réunit la structure de la tête avec les caractères du groupe, mais il s'éloigne par la base large du prothorax et des élytres, et par ce point se rapproche du genre *Glyptosomes*.

Les squamules sont dans ce groupe souvent en étoiles (*Seidlitzii*, *Reichei*, *Godarti*, *orbicularis*), rarement irrégulièrement anguleuses (*pustulatus*) ou rondes (*cruciatus*); on ne distingue pas leur forme dans *nodipennis*, *brevis* et *spathulatus*, peut-être le pourrait-on avec de meilleurs exemplaires.

La structure de l'abdomen présente dans ce groupe une grande uniformité; le 2^e segment est séparé du 1^{er} par une suture presque droite, et il est de la longueur des 2 suivants ensemble, un peu plus court dans *l'orbitalis*; dans le *brevis*, impossible de distinguer les segments.

En dehors des 2 espèces du Cap décrites par Schœnherr et qui y forment un élément hétérogène, on n'avait décrit, en 1866, dans ce groupe, que le *nodipennis*; Ch. Brisout a décrit le *Seidlitzii* provenant de notre voyage en Espagne pendant l'été 1867, auquel j'en joins 3 nouvelles.

Le groupe (en excluant les espèces du Cap) est limité à la mer Méditerranée, et est plus répandu sur le littoral africain que sur celui d'Europe, sur 7 espèces 5 sont algériennes et 1 en même temps sicilienne, et 2 sont espagnoles.

4. TRACH. SEIDLITZI Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. 1866. 413 (*Lacordairius*). — Seidl. Otiorh. 1868. 100, 3.

Ressemble un peu au *scabriculus*, il s'en éloigne par des caractères si importants qu'on pourrait en faire un genre

si les autres espèces du groupe n'établissent un passage avec les *Trachypylus* typiques.

Tête plane et dépassant latéralement les yeux, de sorte qu'entre ceux-ci et le bord saillant du front, elle forme une serbe distincte pour recevoir le scape. Yeux petits et rapprochés en dessous. Rostre assez fortement rétréci en droite ligne par devant, plan et un peu courbé en dessus. Antennes à funicule de 5 articles seulement; 1^{er} article épais et long (environ le tiers du scape), 2^e de un tiers aussi large, les suivants allant en augmentant d'épaisseur, massue aussi épaisse et aussi longue que le 1^{er} article. Prothorax moins de 2 fois aussi large que long, subitement élargi près des angles antérieurs, et alors peu à peu et légèrement rétréci par derrière, bord postérieur fortement dilaté-arrondi, presque en angle. Elytres à peine plus longues que larges, densément squamuleuses et garnies de petites soies éparses. Squamules en étoiles et peu condensées. Jambes postérieures non aiguës à l'extrémité en arête tranchante, mais épaisses et obtusément tronquées droit, de sorte qu'il naît une petite surface apicale perpendiculaire à la longueur, qui est couronnée des 2 côtés d'une rangée de petites épines et présente l'apparence d'une *corbeille cavernuse*. On peut cependant ne pas constater ici la dernière forme, parce que les tarses sont insérés tout-à-fait superficiellement sur les côtés et non sous le bord extérieur de la corbeille, qui est ici une *corbeille ouverte*. Quelquefois il y a une conformation on ne peut plus semblable à une *corbeille cavernuse* et pouvant être prise pour elle, cela ne peut être employé pour limiter le groupe, car il existe à divers degrés et se retrouve dans d'autres groupes, par ex. dans le *scaber* et aussi dans le *Cuthormiocerus lapidicola*. La forme des jambes postérieures est aussi en outre remarquable en ce que l'extrémité est fortement élargie par derrière et que le bord apical entier paraît également courbé à peu près comme dans le *Peritelus griseus*. Les jambes intermédiaires ont un bord apical tranchant avec 7 fortes épines; les antérieures sont élargies au bout en 3 dents obtuses dont l'extérieure plus saillante porte une épine courte et épaisse, la médiane 2 (une longue épaisse et une plus petite divergente presque en angle

droit), et enfin l'intérieure 2 petites épines fines. En somme on remarque 3 épines sur 3 dents. Tarses étroits à toutes les pattes ; 3^e article pas plus large que le 2^e ; ongles libres, séparés. — Long. 2,5 mill.

Un seul exemplaire trouvé sous une pierre, sur l'Escorial.

2. TRACH. PUSTULIFER. — *pustulatus* Seidl. Otiorh. 1868. 101, 4.

Si voisin du précédent que, malgré son funicule de 6 articles, on pourrait le prendre pour l'autre sexe, si la forme des squamules n'était tout autre.

Tête comme dans le *Seidlitzii*, mais les antennes ont le funicule plus menu, distinctement 6-articulé, et son 1^{er} article n'a pas plus du quart de la longueur du scape. Prothorax plus de 2 fois aussi long que large et la dilatation subite après le sommet forme de chaque côté un angle arrondi plus fort ; il ressemble à celui du *brevis*, cependant il diffère par ses côtés rétrécis par derrière et les angles postérieurs arrondis. Elytres garnies de quelques petites soies éparses, et chaque place où il s'en trouve paraît noirâtre, particularité d'où il tire son nom. En outre les élytres sont squamuleuses de gris, et les squamules ne sont pas rondes ou stelliformes, mais irrégulièrement anguleuses et pas très-condensées, de sorte que toute la surface paraît comme crevassée, différence certainement spécifique d'avec le *Seidlitzii*, quand même le nombre des articles du funicule et la forme du prothorax pourraient n'être qu'une différence sexuelle. Pattes tout comme dans le précédent, seulement l'avance interne des jambes antérieures n'a qu'une épine, de sorte qu'on peut distinguer aussi 4 épines sur 3 dents. — Long. 3 mill.

Espagne. Un seul exemplaire dans la collection de Schœnherr.

3. TRACH. REICHEIANUS. — *Reichei* Seidl. Otiorh. 1868. 102, 4.

Le *Tr. Reichei* a à peu près la forme des deux précédents, cependant le prothorax est plus long et arrondi par devant et sur les côtés. Il est très-voisin du *Seidlitzii* et ne s'en distingue que par les points suivants : le funicule, aussi de 5 articles, est beaucoup plus épais ; le prothorax est seulement environ de moitié plus large que long, légère-

ment arrondi sur les côtés et par devant, et faiblement déprimé avant l'extrémité; la squamosité est aussi composée de squamules ou étoiles condensées, et tantôt d'un gris uniforme, tantôt grises et noires; les tarses ne sont pas menus, mais forts et le 3^e article est large, bilobé, presque 2 fois aussi large que le 2^e. — Long. 2 à 3 mill.

Maroc : Tanger, 3 individus.

4. TRACH. GODARTI Scidl. Otiorh. 1868. 102, 6.

Le *Godarti* égale en taille à peu près les plus grands exemplaires du *scabriculus*, et a la même forme.

Tête conformée assez comme dans le *Scidlitzii*. Front saillant fortement au-dessus des yeux sur les côtés; ceux-ci plats et situés dans la scrobe au bord inférieur. Rostre un peu courbé en-dessus, plan, faiblement enfoncé dans sa longueur; scrobes profondes et distinctement avancées dans la fossette au-dessus des yeux. Antennes courtes, assez épaisses; funicule 7-articulé. Prothorax beaucoup plus large que long, arrondi légèrement en devant, fortement sur les côtés et brusquement tout près de la base, et convexe-pulviniforme, avec une impression transverse distincte près du sommet. Elytres distinctement plus longues que larges, avec les côtés subparallèles, visiblement striées; interstries densément garnies, surtout par derrière, de petits tubercules dont chacun porte une soie. Squamules stelliformes et peu serrées. Les jambes postérieures ne reproduisent que très-imparfaitement la structure décrite dans le *Scidlitzii* et ne sont pas à l'extrémité élargies par derrière, mais arrondies; la saillie extérieure des antérieures est très-courte, avec de plus petites épines; l'intermédiaire pas longue mais large et garnie de 3 courtes épines d'égale longueur; l'interne également courte, avec une petite épine. Tarses assez menus, 3^e article pas beaucoup plus large que le 2^e. — Long. 3,5 à 3,8 mill.

Alger, 2 exemplaires.

5. TRACH. NODIPENNIS Chevrol. Guér. Rev. Zool. 1860. 450. — Scidl. Otiorh. 1868. 103, 7.

Le *nodipennis* s'éloigne de toutes les espèces précédentes par sa forme plus allongée et son prothorax plus étroit.

Tête plane en-dessus, élargie de chaque côté en 2 tubercules, l'un au-dessus des yeux, l'autre au-dessus de la scrobe antennaire. Yeux petits, arrondis, rapprochés en-dessous; fovéole distincte au-dessus d'eux. Scape très-fortement en massue; funicule délié. Prothorax arrondi légèrement en devant, fortement sur les côtés, avec sa surface faiblement tuberculeuse. Elytres ovales, avec les épaules obliquement arrondies, marquées sur les 2^e, 4^e et 6^e interstries, ainsi que sur la suture, de gros tubercules dont chacun porte une petite soie. Les stries ne sont pas visibles, excepté dans ceux qui sont frottés. Les jambes postérieures ainsi que les tarses sont comme dans le *Godarti* mais les jambes antérieures s'en éloignent, en ce qu'elles ne sont pas divisées à l'extrémité, mais arrondies en dehors et en devant, et sont garnies de 3, en dedans de 2 épines aiguës et placées l'une au-dessus de l'autre, dont l'inférieure est plus longue. — Long. 3 à 3,5 mill.

Alger; Sicile, mont Pélerin près Palerme; il doit être encore répandu en Italie et en Espagne.

6. TRACH. CRUCIATUS Seidl. Otiorh. 1868. 103, 8.

Le *cruciatus* se distingue par son rostre très-court, ce qui n'existe que dans le seul *variegatus* du 5^e groupe, ainsi que par les lignes enfoncées de la tête.

La tête est distinctement sillonnée dans sa longueur et de plus marquée au-dessus des yeux d'une fine ligne transversale, anguleusement courbée par derrière, qu'on peut prendre aussi pour les deux branches du sillon longitudinal furciforme. Derrière la ligne transversale il y a de chaque côté un bourrelet transversal, qui, un peu saillant latéralement, limite la fossette au-dessus des yeux qui représente visiblement la continuation de la scrobe. Rostre presque 2 fois aussi large que long, parallèle. Prothorax également 2 fois aussi large que long, fortement arrondi sur les côtés avant le milieu, et paraissant pointu par un pinceau de soies. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax et à peine plus longues que larges, finement mais distinctement striées; interstries garnis d'une rangée serrée de petites soies épaisses et densément

squamuleuses; les squamules rondes et très-condensées, celles du prothorax enfoncées au milieu, de manière à figurer l'aspect d'un rayon, comme dans le *squamulatus*. Les pattes ne présentent pas la structure qui est propre aux autres espèces du groupe, mais sont toutes simples; les jambes postérieures sont munies d'un bord en pointe aiguë, les antérieures arrondies au bout et garnies d'une couronne de 3 courtes épaisses soies, égales; 3^e article du tarse large, bilobé. — Long. 3 à 3,5 mill.

Oran, 3 exemplaires.

6^a TRACH. AUREOCRUCIATUS Desbr. Soc. Ent. Suis. III 1871. 342, II.

Brièvement oblong, médiocrement convexe, garni de soies très-courtes et peu nombreuses, brun. Pattes, funicule et massue des antennes ferrugineux; bord latéral et sillon médian du prothorax, bande subscutellaire, fascie médiane à peu près des élytres, raccourcie en dedans, et une fascie entière croisant la suture postérieurement, d'un brillant doré. Rostre creusé d'un large sillon, marge saillante au-dessus des yeux pour recevoir le scape; funicule des antennes de 7 articles, 3^e large, bilobé. Interstries des élytres égaux, presque plans, alternes non élevés. — Long. 3 — larg. 4,5 mill.

Se place entre *cruciatus* et *orbitalis*.

Corse, dans les mousses.

7. TRACH. ORBITALIS Seidl. Otiorh. 1868. 104, 9.

L'*orbitalis* présente la fossette au-dessus des yeux, qui est le propre du groupe, des plus fortes, d'où lui vient son nom. Il dépasse presque la taille du *Godarti* et lui ressemble pour la forme.

Tête un peu déprimée au dessus du front. Rostre légèrement courbé; serobes profondes et grandes, distinctement prolongées au-dessus des yeux; ceux-ci plats et assez petits, avancés tout au bord inférieur des serobes. Antennes à funicule 7-articulé. Prothorax de moitié plus large que long, régulièrement arrondi sur les côtés, tronqué ou très-légèrement arrondi par devant, avec une

impression transversale distincte près du bord apical. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, peu plus longues que larges, subparallèles latéralement; interstries alternes un peu plus élevés et garnis d'une rangée de petites soies plus courtes, plus épaisses, plus dressées, tous densément squamuleux. Squamules étoilées. Les jambes postérieures ont la structure du *Seidlitzii*, mais ne sont que légèrement dilatées par derrière à l'extrémité; les antérieures sont comme dans le *pustulatus*; les tarses ont toutefois le 3^e article large et bilobé. — Long. 3,5 à 4 mill.

Alger, 2 individus.

II^e GROUPE. — Jambes antérieures dentées et épineuses; 2^e segment de l'abdomen séparé du 1^{er} par une suture arquée, de la longueur des 2 suivants ensemble.

Le 2^e groupe se compose d'un nombre d'espèces très-voisines, qui se ressemblent beaucoup, sauf une (*parallelus*), pour le faciès, la taille et la forme des diverses parties du corps, et sont ainsi difficiles à distinguer les unes des autres. Ce groupe très-naturel se rattache d'un côté au précédent par la dentation des jambes antérieures, et de l'autre aux suivants par la forme de la tête et des yeux. Le principal caractère du groupe se trouve dans la réunion de ces 2 marques, qui sont séparées dans les autres. Il est vrai que l'armature des jambes antérieures est quelquefois légère, mais ce n'est le cas que dans un sexe et ne peut être qu'une exception à la règle.

Les yeux sont libres, et ne sont pas dépassés par le bord latéral du front; ils sont plus grands et plus convexes, et aussi avancés en dessous que dans le groupe précédent. *Tr. parallelus* diffère pour la place des yeux, mais non d'une manière considérable.

Les jambes postérieures ont toujours un bord apical tranchant qui, seulement dans le *parallelus*, est garni de soies obliquement dirigées en dedans, et par là semble un peu épaissi. Les jambes antérieures sont plus ou moins fortement dentées, très-légèrement dans quelque ♂ seulement, et la dent médiane porte toujours 2 épines

divergentes (4 seulement dans le *parallelus*) ; l'externe, plus ou moins avancée dans la cavité, en porte une ou 2 très-rapprochées et paraissant n'en faire qu'une ; l'interne en porte une. Le ♂ des *scabriculus* et *laticollis*, où ces dents manquent ou sont indistinctes, ont cependant toujours les épines disposées d'une manière analogue. Les ongles sont toujours séparés et les tarses larges, avec le 3^e article pour l'ordinaire très-large, bilobé.

La structure de l'abdomen est très-uniforme, le 2^e segment est séparé du 1^{er} par une suture distinctement courbée, et est aussi long que les 2 suivants réunis.

Schœnherr décrit 3 espèces de ce groupe et 2 sont nouvelles.

Quant à la distribution géographique, il n'est pas si bien limité que le précédent ; il s'étend dans toute l'Europe, de Suède en Autriche et jusqu'en France. 1 espèce est propre à la Suède, 1 à la Hongrie et 1 à l'île de Chypre, les autres ont un habitat plus étendu.

8. TRACH. PARALLELUS Seidl. Otiorh. 1868. 106, 10.

Le *parallelus* s'éloigne non-seulement de toutes les espèces du groupe mais encore de tous les *Trachypheus* et ne se peut confondre avec aucune : surtout sa forme cylindrique lui donne un faciès tout particulier. Dans ce groupe où il doit se placer, il se distingue en outre par la dent intermédiaire des jambes antérieures large et courte, qui n'est pas munie de 2 mais de 4 épines ; la dent externe est par là plus haute que l'interne, et chacune d'elles porte une épine, l'interne assez longue. Les jambes postérieures ont au bout des petites soies dirigées obliquement en dedans, ce qui les fait ressembler un peu à celle du groupe précédent.

Tête et rostre semblable à ceux du *spinimanus*. Les yeux sont un peu plus petits et plus convexes, mais sont plus enfoncés et moins saillants ; le front est garni de soies épaisses. Le prothorax est élargi derrière le bord apical très-fortement et subitement, presque anguleux, ayant sa plus grande largeur bien avant le milieu, ensuite légèrement rétréci, presque en ligne droite, vers la base. Les angles postérieurs obtus ; bord basal presque droit et très-large ; le long du bord antérieur se trouve une im-

pression transversale distincte. Les élytres ne sont pas beaucoup plus larges que le prothorax, assez cylindriques, parallèles sur les côtés, arrondies par derrière, finement striées, assez densément garnies de petites soies longues, dressées. — Long. 3,5 mill.

Paraît propre à la Hongrie ; 2 exemplaires.

9. TRACH. LATICOLLIS Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 118, 17. — Seidl. Otiorh. 1868. 106, 11.

♂ *anoplus* Först. Prus. Rheinf. 1849. vi 30. — ♂ *rectus* Thoms. Skand. vii 1865. 132, 3.

♀ *spinimanus* Thoms. Skand. vii 1865. 133, 5.

Tr. laticollis est très-voisin de *l'alternans*, il s'éloigne des *spinimanus*, *digitalis* et *Truquii*, auxquels il ressemble, par la denticulation beaucoup plus courte des jambes antérieures ; leur épine extérieure, quoique portée sur une dent distincte ♀, est peu élevée et presque de la même hauteur que l'interne ; les 2 épines intermédiaires, un peu divergentes, sont ou sur une petite dent ♀, ou sur aucune. Il se distingue de *l'alternans* qui lui ressemble mais qui a la denticulation des jambes antérieures beaucoup plus forte, par les élytres distinctement striées, dont tous les interstries sont également parsemés de fines petites soies assez serrées. La densité de ces soies distingue le *laticollis* à ses élytres du *spinimanus*, chez lequel elles sont très-éparses. Les élytres sont un peu élargies par derrière ou presque parallèles avec les côtés légèrement arrondis, et égalent pour la forme au moins celles de *l'alternans*. Le prothorax est proportionnellement large, a les côtés arrondis, les angles postérieurs, et une légère impression transverse distincte sur la partie antérieure, souvent aussi un sillon longitudinal légèrement marqué. — Long. 2,5 à 3 mill.

Le ♂ se distingue par sa forme ordinairement plus allongée ; il a une impression distincte sur l'abdomen, entre le 1^{er} et le 2^e segment, et aux jambes antérieures non pas des dents, mais de simples épines qui reproduisent tout-à-fait celles des ♀.

Les ♀ sont ordinairement plus épaisses, et ont aux jambes antérieures 3 courtes dents obtuses mais distinctes,

dont la médiane porte 2 épines; entre ces 2 épines et l'interne se trouve d'ordinaire dans les deux sexes une 3^e petite épine.

France, Italie supérieure, Sicile, Tyrol, Allemagne et Suède, Anatolie (Chevrolat).

10. TRACH. ALTERNANS Gyl. Sch. Curc. n 1834. 493, 8. — Seidl. Otiorh. 1868. 108, 12. — *scaber* Redt. Fn. Aust. 2^e éd. 1858. 734.

Le *Tr. alternans* se reconnaît dans le groupe, à ce qu'il a d'assez longues soies seulement sur les interstries alternes, qui sont un peu élevés, tandis que dans les autres espèces, il y en a sur tous les interstries et ils sont d'ordinaire plus courts. Du reste, il ressemble beaucoup au *spinimanus* et surtout au *laticollis*; il se distingue du 1^{er} par des épines et des dents plus courtes aux jambes antérieures et par le rostre plus fortement rétréci par devant dans sa moitié supérieure, du 2^e par les épines externes des jambes antérieures un peu plus hautes.

La tête est en-dessus également convexe jusqu'aux yeux qui sont libres. Les scrobes s'avancent jusqu'à leur bord antérieur. Les antennes sont courtes et épaisses; le scape très-fortement en massue; le 1^{er} article du funicule épais, les suivants de moitié moins larges. Rostre non canaliculé; la partie située au-dessus des scrobes assez fortement rétrécie par devant, de sorte qu'on peut voir d'en haut l'extrémité des scrobes. En cela consiste la plus importante distinction du *scabriculus* L. (*scaber* Sch.) auquel Schœnherr l'a réuni dans son 7^e vol. Le prothorax est à peine de moitié aussi large que long, fortement arrondi sur les côtés, légèrement déprimé avant le sommet. Elytres un peu ovales, pas si parallèles que dans le *spinimanus*, finement et indistinctement striées; les interstries alternes un peu élevés et garnis d'un rang de petites soies dressées. Les jambes postérieures ont le bord apical tranchant; les antérieures sont au bout légèrement élargies en 3 dents obtuses saillantes; l'externe la plus petite n'est pas très-haute et porte une épine; la médiane, large et courte, en porte 2 divergentes; l'interne, une un peu en crochet. — Long. 2,5 à 3,2 mill.

Schœnherr dans son 7^e volume a fait de l'*alternans* une

variété du *scaber* Sch. (*scabriculus* L.), cependant déjà Walton (Stet. 1848. 344.) l'avait reconnu pour une bonne espèce. La structure du rostre, courbé par devant, ne laisse aucun doute que cette espèce ne diffère du *scabriculus*.

Largement répandu depuis la France jusqu'en Hongrie, il s'étend même en Italie et ne manque pas même au Caucase ; le 2^e exemplaire du *lanuginosus* cité par Schœnherr se rapporte ici.

41. TRAC. TRUQUII Seidl. Otiorh. 1868. 109, 13.

Le *Truquii* est si voisin du *spinimanus* qu'il suffit de noter les différences. Le rostre est plus long et la portion qui est au-dessus des scrobes est beaucoup plus fortement rétrécie par devant, de sorte que les scrobes sont visibles en dessus presque dans toute la longueur ; les yeux sont aussi plus visibles d'en haut, parce que le front est plus étroit que dans le *spinimanus*. Le prothorax est plus fortement arrondi par devant, plus convexe, distinctement impressionné près du sommet. Les élytres sont près de moitié plus larges que le prothorax, ayant leur plus grande largeur aux épaules, et rétrécies par derrière, tandis qu'elles ne sont ni aussi larges ni aussi parallèles dans le *spinimanus* ; il se trouve une élévation plus distincte sous les épaules. Les petites soies des élytres ne sont pas plus longues mais plus épaisses et bien plus serrées, presque aussi serrées que dans le *laticollis*. — Long. 2,5 à 3 mill.

Cypre.

42. TR. SPINIMANUS Germ. Ins. Spec. 1824. 405. — Seidl. Otiorh. 1868. 109, 14. — *lanuginosus* Gyl. Sch. Cure. II 1834. 494, 16.

Le *spinimanus* se distingue des espèces très-voisines *digitalis*, *Truquii*, *laticollis* et *alternans*, par les petites soies des élytres très-éparses, des *laticollis* et *alternans* en outre par les longues dents des jambes antérieures, ce qu'il a de commun avec le *digitalis* et le *Truquii*.

Rostre court, large, plan en dessus, très-légèrement rétréci par devant, de sorte que les scrobes sont à peine visibles au bout, d'en haut. D'ailleurs, il ressemble entièrement à l'*alternans* et ne s'en éloigne que par les points suivants : le prothorax, comparé aux élytres, est plus large, à peine impressionné transversalement avant le

sommet, et est beaucoup plus fortement rétréci en devant que vers la base; les élytres ont les côtés parallèles et sont obtusément arrondies par derrière, mais visiblement plus longues que larges; la forme générale est celle d'un court cylindre. Les stries sont rarement distinctes, de petites soies blanches, légèrement en massue, demi-couchées, sont très-éparses sur leur surface. Les jambes antérieures sont à l'extrémité divisées en 3 dents dont la médiane est longue et munie au bout de 2 longues épines, l'externe très-élevée, assez longue, munie d'une longue épine, l'interne courte munie d'une épine recourbée. — Long. 2,8 à 3 mill.

Le *lanuginosus* se rapporte ici d'après la description et d'après l'exemplaire original de Podolie; l'exemplaire du Caucase se rapporte à l'*alternans*. Schœnherr tient au contraire le *spinimanus* Germ. pour synonyme de son *scaber* (*scabriculus* L.), erreur que Walton a rectifiée Stet. 1848, p. 325.

Allemagne, Autriche, Podolie, France (Toulouse). Il manque en Suède.

13. TRAC. DIGITALIS Gyl. Ins. Suec. iv 1827. 615, 35-36. — Gyl. Sch. n 1834. 494, 9. — Thoms. Skand. Col vii 1869. 134, 6. — Seidl. Otiorh. 1868. 110, 15.

Le *digitalis*, à tout point de vue, est très-voisin du *spinimanus* et ne s'en éloigne que par les points suivants: le prothorax est plus large proportionnellement à sa longueur, plus fortement arrondi sur les côtés, et presque aussi fortement rétréci à la base qu'en avant; d'où un étranglement plus marqué entre le prothorax et les élytres. Celles-ci sont à peine plus longues que larges, très-obtusément arrondies par derrière, presque de forme carrée, distinctement striées; interstries, surtout par derrière, vaguement garnis de petites soies squamiformes ou squamules petites, larges, à demi-dressées. — Long. 2,5 mill.

Propre à la Suède.

14. TRAC. SCABRICULUS L. Mant. Plantarum. 1768. 531 (Sec. auct.) — F. S. Ent. 149, etc. — Payk. Fn. iii 285. — Herbst. Col. 351. Pl. 87. Fig. 10. — Gyl. iii 309. ♂. — *spinimanus* Gyl. Secc. iv 1827. 614, ♀. — *riverra* Herbst. Arch. 83. — *spinimanus* Gyl. Sch. ii 1834. 493, 7. — *scaber* Sch. vii 1843. 117, 15. — ♂ *setarius* Gyl. Sch. ii 1834. 492, 5. — ♀ *erinaecus* Redt. Aust. 1849. Ed. i 492. — *scabriculus* Bach. Deuts. 262. — Thoms. Skand. vii 1865. 133, 4. — ? *spinosulus* Gaut. Soc. Ent. Fr. 1861. 99.

Le *scabriculus* est distinct de toutes les autres espèces par la structure du rostre et du prothorax, et ne peut se confondre avec aucune autre.

Le rostre est creusé en dessus dans toute sa longueur, avec les bords parallèles, un peu courbés, et distincts jusqu'aux yeux, qui sont grands, peu convexes. Le prothorax est 2 fois aussi large que long, fortement étranglé tout près du bord apical, qui est un peu relevé, fortement dilaté sur les côtés en 2 bosses, dont chacune paraît encore plus saillante par un pinceau de petites soies ; ligne médiane distinctement enfoncée. Les élytres sont distinctement striées, souvent tachées, et garnies assez densément par derrière de longues soies écartées, épaisses. Les jambes antérieures ont, dans l'un des sexes ♀, à l'extrémité, 3 grandes dents dont la médiane est presque aussi longue que dans le *spinimanus*, et porte 2 épines divergentes ; l'interne est plus petite et porte seulement une épine un peu en crochet ; l'externe, un peu plus grande, porte 2 longues épines très-rapprochées l'une de l'autre, qui, à un faible grossissement, paraissent n'en faire qu'une. Dans l'autre sexe, ♂, les dents des jambes antérieures, excepté l'interne, sont très-légères, et ne paraissent sensibles que par la position des épines, qui sont aussi beaucoup plus courtes. Dans les 2 sexes, la dent externe, portant épine, presque aussi élevée que l'interne, fournit un bon caractère distinctif avec les *spinimanus*, *digitalis* et *Truquii*, qui l'ont beaucoup plus haute. — Long. 2,5 à 3,8 mill.

♂ Jambes antérieures à peine dentées à l'extrémité, épines plus courtes.

♀ Jambes antérieures fortement dentées, dent externe

avec 2 épines soudées, dent intermédiaire avec 2 épines distantes, et dent interne avec une épine en crochet.

Se trouve de Suède et de Finlande jusqu'en Dalmatie et dans le midi de la France, et n'est rare nulle part.

III^e GROUPE. — Jambes antérieures mutiques au bout; tarses très-larges; ongles connés à la base; 2^e segment abdominal séparé du 1^{er} par une suture droite, plus court que les 2 suivants ensemble, presque aussi long que chacun d'eux.

Petit groupe très-naturel qui comprend les plus grandes espèces du genre et se distingue par les jambes antérieures inermes, par le 2^e segment de l'abdomen étroit et parallèle et les ongles soudés. La forme du corps est très-ramassée, quelquefois presque sphérique (*ventricosus*); les élytres toujours distinctement, quelquefois très-profondément striées. La tête plus ou moins rétrécie par devant, avec ou sans impression transversale entre le front et le rostre. Les yeux sont grands, plus ou moins arrondis, saillants. Les jambes postérieures sont arrondies au bout et densément garnies de fines soies, ainsi que les antérieures, qui sont distinctement prolongées en crochet à l'extrémité interne et portent là quelquefois une petite épine (*ventricosus*). Le 2^e segment de l'abdomen est séparé du 1^{er} par une suture droite, et beaucoup plus court que les 2 suivants ensemble (*ventricosus*), ou pas plus long que chacun des 2 (*ypsilon*).

A l'espèce de Germar, vient s'en joindre 3 nouvelles.

Le groupe est limité à l'Orient et à la Dalmatie, Hongrie et Turquie. Il y a sans doute d'autres espèces de ce groupe sur le littoral de la mer Noire.

11^a TRACH. MACULATUS Perris, Ab. VII 1870. 21. 20.

Ovale, couleur foncière noire, mais entièrement voilée par une squamosité cendrée ou crétaée. Tête peu convexe, bas du front subdéprimé et hérissé de petites soies; rostre épais, un peu plus long que la tête, gibbuleux, non canaliculé sur le dos, déprimé au bout, hérissées de soies

cendrées assez épaisses; antennes d'un brun de poix, massue plus claire. Prothorax court, 2 fois plus large que long, 2 fois plus étroit en devant qu'à la base, avec une assez forte impression transverse près du bout, très-dilaté arrondi sur les côtés, canalicule dorsale nulle ou à peine visible, creusé de chaque côté au milieu à la base d'une fovéole oblongue, marqué de 3 taches confuses, 2 antérieures et 2 dans les fovéoles, hérissé de soies brunes et blanches, laissant libre un espace linéaire médian, hispide. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, subdéprimées, arrondies à l'épaule, subparallèles jusqu'au-delà du milieu, ensuite arrondies, noirâtres sur la suture, surtout à la base, taches brunes, 4 basales, d'autres formant 4 fascies arquées, rapprochées par paires, d'autres apicales et d'autres latérales, striées-punctuées, assez densément hérissées de soies plus longues et plus épaisses, brunes et blanches, disposées en séries sur chaque interstrie. Dessous cendré de blanc, varié de brun. Pattes testacées, garnies de squamules blanches assez peu nombreuses et de soies très-courtes. — Long. 3,3 mill.

Les fossettes prothoraciques limitent le nombre des espèces auxquelles on puisse le rapporter. Le *scabriculus* est celui dont il est le plus voisin; il en diffère par le rostre non canaliculé, le prothorax sans rainure médiane appréciable et par les élytres plus déprimées sur le dos et parallèles, par conséquent moins ventruës.

Sardaigne, sous les pierres.

15. TRAC. VENTRICOSUS Germ. Spec. ii 1824. 405. — Sch. Syn. ii 1834. 490, 1. — Seidl. Otiorh. 1868. 113, 17.

Le *ventricosus* a l'aspect du *Peritelus familiaris* ou du *Mylicus seminulus*, seulement il n'est pas aussi bombé que le dernier. La tête est fortement étranglée par devant, de sorte que les yeux grands, assez plats, convergent, et le rostre paraît distinctement séparé d'eux; celui-ci s'élargit un peu vers le bout et est aussi large que long, fortement creusé dans sa longueur (comme dans le *scabriculus*), avec les bords épais, relevés, qui se dilatent en dehors au milieu et se terminent, à la base, tout à

Pétrangement du front, de chaque côté, en un bourrelet transversal indistinct.

Le prothorax est transversal, plus de 2 fois aussi long, nullement rétréci par derrière, assez fortement en devant, tronqué droit à la base et au sommet, en dessus avec plusieurs impressions rugueuses. Les élytres sont presque en cercle, aussi longues que larges, profondément striées, les interstries élevés en toit, garnis de très-petites et fines soies éparses, marquetées densément de squamules grises et noires. Les jambes antérieures portent au bout une petite épine en dedans. — Long. 3,8 à 5 mill. — Long. 2,5 à 3 mill.

Il est propre à la Hongrie, et c'est sans doute par erreur que Dahl le signale de Florence.

16. TRAC. RUGATICOLLIS. — *rugicollis* Scidl. Otiorh. 1868. 414, 18.

Le *rugaticollis* est voisin, d'un côté du *ventricosus* par des impressions rugueuses sur le prothorax et le rostre et par les interstries convexes des élytres, de l'autre de l'*ypsilon*, par son prothorax plus long et ses élytres plus allongées; la tête est très-légèrement rétrécie par devant et le rostre peu rétréci à la base, pas plus étroit qu'elle au bout; de là, les yeux sont peu convergents. Le rostre est plus long que dans le *ventricosus*, les rebords en bourrelet sur les côtés du large sillon longitudinal, ne sont pas élargis au milieu, mais parallèles, et finissent en un bourrelet transverse indistinct. Derrière ce bourrelet transverse, dans un individu, le front est légèrement impressionné; dans les autres plus grands il a au milieu un trou profond transverse, et de chaque côté, au-dessus des yeux, un fort bourrelet longitudinal, qui paraît comme une saillie du bord supérieur du rostre et s'abaisse brusquement par derrière. Le prothorax est moins de deux fois aussi large que long, rétréci légèrement par derrière, plus fortement par devant, tronqué à la base et au sommet, densément et rugueusement impressionné et marqué d'une profonde ligne médiane. Les élytres sont distinctement plus longues que larges, légèrement arrondies latéralement, et moins convexes que dans le *ventricosus*; les

interstries aussi moins convexes. Les jambes antérieures n'ont au bout, par en dedans, aucune épine. — Long. 4 à 6 — larg. 2 à 3 mill.

La structure aberrante du rostre et du front des 2 exemplaires que j'ai devant moi, jointe à la différence frappante de taille, avec de plus riches matériaux, pourraient peut-être permettre d'en faire une espèce différente.

Les plus grands viennent de Dalmatie, les plus petits de Roumélie.

17. TRAC. GRACILICORNIS Seidl. Otiorh. 1868. 115, 19.

Le *gracilicornis* est très-voisin, pour la forme, du *rugaticollis*, et présente les caractères distinctifs suivants : le prothorax est encore un peu plus long, fortement arrondi sur les côtés et sans rugosités. Il se distingue de toutes les autres espèces du groupe par le funicule des antennes menu, dont le dernier article n'est pas transversal, mais aussi long que large, tandis que le 1^{er} est assez allongé et égale les 2 et 3 ensemble. Le rostre a, comme dans le *rugaticollis*, les bords épaissis et s'allongeant comme un épais bourrelet jusqu'au-dessus des yeux ; cependant ils convergent un peu par devant et sont en droite ligne, ce qui distingue le rostre de celui du *rugaticollis*, ainsi que du *ventricosus*. Les élytres sont plus étroites et plus parallèles que dans le *rugaticollis*, les stries sont profondes, mais les interstries plans et garnis de soies longues, dressées, en massue. — Long, 4,5 mill.

3 exemplaires de Beyrouth, Syrie.

18. TRAC. YPSILON Seidl. Otior. 1868, 115, 20.

L'*ypsilon* se distingue du précédent d'une manière très-frappante, par le rostre beaucoup plus long, plan et non séparé du front. La seule inégalité remarquable qui s'y trouve est une ligne enfoncée, commençant entre les yeux et se divisant en forme de Y sur le rostre. Le prothorax est à peine 2 fois aussi large que long, fortement arrondi sur les côtés, rétréci distinctement vers la base, plus fortement vers le bout, près duquel il est très-légèrement et indistinctement étranglé ; on remarque quelques rides seulement à la base et sur les côtés. Les

élytres sont un peu plus longues que larges, un peu élargies par derrière, pas si convexes que dans le *ventricosus*; les stries sont fines, les interstries sont très-légèrement convexes, garnis de plus longues soies. Les jambes antérieures n'ont pas d'épine à l'extrémité interne. — Long. 3 à 6 — larg. 3 à 3,5 mill.

Hongrie, Mehadia. 1 seul exemplaire.

La var. *turcicus*, qui pourrait constituer une espèce avec de plus riches matériaux, a un rostre un peu plus court, et des yeux un peu plus déprimés. Il n'a pas sur le front la ligne en Y. Les élytres ont une forme plus étroite et plus parallèle.

Turquie. 1 exemplaire.

—

IV^e GROUPE. — Jambes antérieures brièvement épineuses au bout; ongles libres; 2^e segment abdominal séparé du 1^{er} par une suture droite, plus court que les 2 suivants ensemble; tête et rostre légèrement étranglés au bord antérieur des yeux; rostre renflé sous les scrobes.

Le 4^e groupe d'un côté est voisin du 3^e par la brièveté du 2^e segment abdominal, et par le corps grand épais; de l'autre par les petites épines aux jambes antérieures, il se rapproche du 2^e groupe sans cependant atteindre la structure qu'on y trouve. Les jambes antérieures sont, à l'extrémité par en dedans, un peu en crochet et avec une épine; par en dehors arrondies et garnies de 3 épines courtes également distantes l'une de l'autre. Les jambes postérieures n'ont pas le bord apical tout-à-fait tranchant, mais au contraire ce bord est arrondi et présente, à une petite distance de la couronne la plus extérieure de petites épines, une semblable de plus petites encore, de sorte que l'espace qui se trouve entre les deux reproduit la surface apicale oblique du 1^{er} groupe, sans cependant être aussi distincte. Les ongles sont très-éloignés l'un de l'autre, ce qui distingue parfaitement ce groupe des précédents. Le rostre est assez élargi au-dessous de la scrobe et jusqu'au devant des yeux, puis subitement étranglé; la tête est latéralement convergente jusqu'à la même

place et le front un peu déprimé, de sorte qu'ici un distinct étranglement vient à s'établir, lequel, du reste, ne s'est rencontré que dans le *granulatus* et le *ventricosus*. La scrobe est un peu courbée, longue, et s'étend jusqu'à l'œil, ou cesse tout au devant (*setiger*). Les antennes ont un scape presque droit, fortement en massue, et un funicule épais. Le 2^e segment abdominal est séparé du 1^{er} par une suture droite, et plus court que les 2 suivants ensemble, particulièrement dans le *scaber*, où il n'est pas plus long que l'un d'eux.

Ce petit groupe très-naturel, outre l'espèce la plus commune et la plus répandue du genre, en comprend 2 nouvelles, appartenant à la faune méditerranéenne, qui en sont très-voisines. Les différences consistent seulement dans la forme, la sculpture et les soies des élytres.

19. TRACH. SCABER L. Fn. Suec. 1761. 592^o. — Bach. Dents. 262. — Thoms. Skand. vii 1865. 131, 2. — Seidl. Otiorh. 1868. 117, 21. — *scabriculus* Gyl. Var. *b*. Ins. Suec. iii 1813. 309, 35. — ii, 490 (Excl. Syn.). — *bifoveolatus* Beck. Beitr. Bair. Ent. 1817. 22. T. 7 f. 36. — *squamosus* Gyl. Sch. Cure. ii 1834. 491, 3. — *tesselatus* Bohm. Sch. Cure. vii 1843. 114, 9. — *confinis* Steph. iv 1831. 121, 2.

Le *scaber* est très-reconnaissable à l'étranglement entre la tête et le rostre, et à la partie inférieure de ce dernier largement dilatée, caractère qu'il partage avec 2 autres espèces du groupe et avec le *granulatus*; il est ordinairement plus grand que le *scabriculus*; cependant il se rencontre aussi de petits individus qui le cèdent pour la taille à ce dernier.

La tête est légèrement rétrécie par devant, avec les yeux grands, aplatis, latéraux. Le front est déprimé jusqu'au bord antérieur de ces derniers, à partir de ce point le rostre est un peu convexe, la convexité légèrement sillonnée dans sa longueur, les bords supérieurs légèrement convergents en ligne droite, la portion qui se trouve sous la scrobe fortement élargie à partir des yeux, presque aussi large que la tête derrière les yeux, et comme renflée jusqu'au bout. Les scrobes latérales, longues, un peu courbées, s'étendent jusqu'aux yeux. Le prothorax 2 fois aussi

large que long, fortement rétréci par devant, un peu plus étroit à la base qu'au milieu ; une légère ligne médiane est pour l'ordinaire visible. Les élytres sont un peu ventrues, plus ou moins distinctement et finement striées ; les interstries paraissant un peu ondulés par de faibles inégalités, et aussi un peu irrégulièrement sinués sur les côtés ; les interstries alternes quelquefois distinctement plus élevés, tous garnis de petites soies, qui souvent manquent tout-à-fait par devant et sont distincts par derrière seulement sur la convexité. Le 2^e segment ventral est des plus courts dans le *scaber*, puisqu'il dépasse à peine en longueur chacun des suivants. — Long. 2,8 à 3 mill.

Toute l'Europe, peut-être à l'exclusion de l'Espagne et de la Sicile, il est très-commun, en particulier sur l'ortie. Madère (Wollaston) — Transcaucasie (Kolenati) sous le nom de *scabriculus* (Mosc. 1858. iv 417.

19^a. TRACH. COLORATUS Allard. Berl. 1869. 325.

Corps couvert en entier de squamules épaisses et très-serrées, d'un gris un peu flave, plus claires sur les côtés du prothorax et des élytres, ainsi qu'à l'extrémité de celles-ci, et formant deux taches brunes peu distinctes placées parallèlement sur le prothorax, et quelques autres inégales, de même couleur et plus ou moins nombreuses sur le dos des élytres. Pattes d'un roux ferrugineux ainsi que les antennes, couvertes de squamules blanchâtres et pubescentes ; quelquefois les squamules tournent au verdâtre-clair sur les côtés et à l'extrémité des élytres. Rostre de la longueur de la tête, presque plan avec une ligne longitudinale fine, creusée dans son milieu. Prothorax 2 fois aussi long que large, tronqué aux 2 bouts, rétréci en devant, fortement arrondi sur les côtés. Elytres en ovale très-court, très-convexes, très-arrondies aux épaules, sur les côtés et à l'extrémité ; stries étroites, interstries plans et éparsement vêtus en arrière de petites soies courtes. — Long. 3,2 — larg. 3,8 mill.

Ressemble au *Trach. scaber* L. par la tête et le prothorax, mais ses élytres forment un ovale plus court et plus large.

Algérie, Constantine.

20. TRACH. SETERMIS. — *setiger* Seidl. Otiorh. 1868. 118, 22.

Le *setermis* est très-voisin du *scaber*, mais facile à distinguer parce que les élytres sont plus convexes en dessus, mais moins arquées sur les côtés, presque parallèles et plus étroites. En outre elles sont profondément striées, les interstries également convexes et densément garnis de soies longues, un peu dressées, qui couvrent aussi le prothorax et la tête.

Le rostre est en dessus un peu plus large que dans le *scaber* et non convergent, mais parallèle. Le prothorax est étranglé plus fortement à la base et par conséquent plus fortement arrondi sur les côtés. Les élytres sont marquées sur leur convexité postérieure pour l'ordinaire de 2 bandes blanches, arquées, convergentes par derrière, bordées d'obscur par devant. Les jambes sont tout comme dans le *scaber*, mais le 2^e segment abdominal est un peu plus long, cependant distinctement plus court que les 2 suivants ensemble. — Long. 3,2 à 5 mill.

Un individu recueilli en Espagne; d'autres viennent de France méridionale (Montpellier, Metz), de Sicile et d'Algérie.

21. TRACH. ALGERINUS Seidl. Otiorh. 1868. 119, 23.

L'*algerinus*, par ses soies dressées squamuliformes très-épaisses, s'éloigne tant des 2 précédents que je ne balance pas à le regarder comme une espèce particulière. Les élytres sont plus parallèles que dans le *scaber*, mais plus larges et plus courtes que dans le *setermis*, avec lequel elles s'accordent pour la profondeur des stries et la convexité égale des interstries; elles sont garnies densément de soies claviformes presque aussi larges que longues au bout, qui couvrent également le prothorax et la tête. La structure de l'abdomen se rapproche de celle du *setermis*. — Long. 4,5 — larg. 2,3 mill.

1 individu d'Oran, Algérie.

V^e GROUPE. — Jambes antérieures arrondies au bout, brièvement épineuses ou hispides; 2^e segment de l'abdomen séparé du 1^{er} par une suture arquée, plus long ou aussi long que les 2 suivants pris ensemble; corps oblong, subdéprimé; rostre court.

Le 3^e groupe se rattache au précédent par les courtes épines qui garnissent l'extrémité arrondie des jambes antérieures (dans l'espèce typique), mais il s'en éloigne par le 2^e segment abdominal long, avec la suture antérieure anguleuse; il se sépare du suivant, dont il a la structure abdominale, par la dentelure des jambes antérieures, et du 2^e par le manque de dentelures à ces mêmes jambes. Quelques ♂ du 2^e groupe n'ont pas non plus de dents aux jambes antérieures, cependant leurs épines représentent celles de la ♀, et jamais celle qui est dirigée horizontalement en dehors ne manque, tandis que dans une espèce du 3^e groupe tout le bord apical est également garni de courtes épines, et dans les autres quelques soies jaunes, très-rapprochées les unes des autres, forment des fascicules dentiformes. Le corps est plus ou moins allongé et déprimé, les squamules, distinctes et épaisses, pénètrent l'une dans l'autre en forme d'écailles de poisson, dans le *variegatus*. Le groupe est très-reconnaissable par le rostre fort court (en quoi le *cruciatus* du 1^{er} groupe seul lui ressemble) et les yeux très-avancés sur le devant.

2 espèces seulement (*) dont la 2^e est très-voisine de quelques espèces de *Cathormiocerus*, mais cependant doit se placer parmi les *Trachyphlorus* à cause de la forme de ses squamules.

Toutes deux appartiennent à la faune méditerranéenne et sont confinées en Espagne, Algérie et Sicile.

(*) Je ne dois pas mentionner le *Mitomermus Raymondi* Gant. Fr. 1861. 99. qui, d'après la déclaration de l'auteur, doit être voisin du *Mit. hystrix* (= *variegatus* Kiesw.). Les seuls caractères auxquels on peut reconnaître l'espèce dans la diagnose sont : *dense nigro squamosus, prothorace spinosulo, clytris striatis, squamulis dupliciter dispositis*, deviennent dans la description de petites soies au lieu de squamules, et le prothorax est garni comme les élytres, non plus d'espèces d'épines mais de petites soies. Ce n'est peut-être que le *Trachyphlorus aristatus*.

22. TRACH. VARIEGATUS. Küst. Käf. Eur. XVIII 1849. 85. — Seidl. Otiorh. 1868. 120, 24. — *Mitomermus hystrix* Duv. Gen. Curc. 1853. 33, Pl. 14. f. 64.

Le *variegatus* s'éloigne, par son rostre court, son prothorax fortement arrondi et sa forme aplatie, de tous les autres *Trachypylæus*, mais ne peut en être séparé génériquement ; il ressemble beaucoup encore à l'*aristatus*, mais il est plus grand et plus large aux épaules.

Le rostre est plus court que large, presque aussi large que la tête ; les scrobes sont au bout assez avancées par en haut, profondes et étroites, et vont assez droit jusqu'aux yeux, qui sont très-fortement avancés au milieu, entre les bords supérieur et inférieur de la tête, et sont assez peu convexes. Le rostre est plan en dessus et creusé d'un léger sillon médian. Les antennes diffèrent de celles des autres *Trachypylæus* seulement en ce que la pointe des articles du funicule est tronquée et non arrondie. Le prothorax est un peu plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, aussi rétréci par derrière que par devant. Les élytres ont leur plus grande largeur aux épaules qui sont un peu saillantes, arrondies ; de là très-légèrement rétrécies par derrière, presque parallèles, obtusément arrondies par derrière, assez profondément striées, très-densément squamuleuses, les squamules se mêlent les unes dans les autres comme des écailles de poisson. La couleur est brune, marquetée de noir et de gris, ou aussi entièrement d'un gris foncé, avec quelques petites taches claires. Les élytres, ainsi que le prothorax, la tête, les antennes et les pattes, sont garnies de soies dressées, assez longues, peu épaisses. Les tarses ne sont pas très-larges, le 4^e article plus long que les précédents ensemble, muni de 2 ongles séparés. Le 2^e segment abdominal est séparé du 1^{er} par une suture fortement arquée en angle et beaucoup plus long que les 2 suivants. — Long. 3 à 4 mill.

Le *variegatus* a été bien décrit et très au long par Kuster comme un *Cathormiocerus*. Cependant Duval l'a décrit de nouveau comme *Mitomermus hystrix*, caractérisant principalement ce nouveau genre par la structure des antennes, auxquelles il a donné beaucoup de valeur. M. Jekel (Soc.

Ent. Fr. 1836. 72) a réuni les 2 espèces, en les plaçant toutefois parmi les *Cuthormiocerus*. Lacordaire le premier les a rangés à leur véritable place dans les *Trachyphlorus*.

Appartient à la faune méditerranéenne; j'en ai des exemplaires de Sardaigne et d'Alger; il se trouve aussi en Espagne (Duval), en Sicile (Jekel); je regarde comme une erreur l'indication de la Hongrie pour patrie.

23. TRACH. BREVIROSTRIS Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. 1866. 407 (*Peritelus*). — Seidl. Otiorh. 1868. 121, 25.

C'est au *variegatus* que le *brevirostris* ressemble le plus, mais il est un élément très-hétérogène du genre, et il serait peut-être mieux de le rapprocher des *Cuthormiocerus* si la squamosité de l'abdomen ne la plaçait ici, disposition qui constitue la principale différence entre les *Trachyphlorus* et les *Cuthormiocerus*. La squamosité gris-clair, égale, et les soies très-mennues lui donnent un aspect poli et il ressemble en cela à un *Peritelus*, cependant les serobes qui s'étendent jusqu'aux yeux et s'avancent au bout un peu vers en haut et sont tout-à-fait latérales.

La tête est étroite, avec les yeux grands, légèrement convexes, qui sont tout-à-fait latéraux et assez avancés par en devant. Le rostre est plus étroit que la tête, assez rétréci en dessus vers l'extrémité. Les serobes sont très-profondes et nettement limitées, vont d'abord parallèlement, puis se courbent un peu en bas, pour aller aux yeux, tout comme dans le *Cuthormiocerus horrens*, avec lequel surtout le *brevirostris* a le plus d'analogie pour la structure de la tête. Les antennes sont aussi longues que la tête et le prothorax ensemble, ont le scape un peu courbé et le funicule pas beaucoup plus menu, semblable à celui du *Cuthormiocerus socius*. Le prothorax est beaucoup plus étroit par devant que par derrière, pas très-fortement arrondi sur les côtés, la base largement arrondie. Les élytres assez allongées, pas fortement arrondies sur les côtés, indistinctement striées, garnies éparsement de fines petites soies blanches, surtout par derrière et couvertes, ainsi que le prothorax, la tête et tout le dessus de squamules épaisses, un peu anguleuses, condensées. Les pattes présentent une particularité qui manque à tous les autres *Trachyphlorus*;

les jambes antérieures sont arrondies au bout, garnies en dehors d'un petit fascicule de 2 à 3 soies jaunes que suit un plus large dirigé par devant, de plusieurs semblables; par en dedans est une grande épine noire courbée; les jambes postérieures ont aussi, à l'angle apical postérieur de longues soies jaunes qui les font paraître élargies. Les tarses ne sont pas très-larges, le dernier article aussi long que les précédents ensemble; les ongles grands et séparés. Le 2^e segment abdominal est séparé du 1^{er} par une suture légèrement arquée, et aussi long que les 2 suivants ensemble. — Long. 4 mill.

Découvert à Aranjuez par M. Ch. Brisout en 1865, et décrit comme un *Peritelus*, où il est placé à tort près de l'*astragali*; si on voulait le reporter dans ce genre, il devrait se placer près du *platysomus*.



VI^e GROUPE. — Jambes antérieures mutiques; ongles libres ou soudés (*Tr. granulatus*, *syriacus*); 2^e segment abdominal séparé du 1^{er} par une suture arquée, ou droite (*aristatus*, *squamulatus*), plus long que les 2 suivants ensemble (exclus. *aristatus* et *squamulatus*).

Le 6^e groupe n'est pas aussi naturel que les précédents, et les espèces qui le composent n'ont d'autre lien commun que de manquer des caractères propres aux autres groupes. Il se distingue du 3^e groupe, qui a aussi les jambes antérieures inermes, par le 2^e segment abdominal long (*granulatus*, *syriacus*), ou les ongles libres (*aristatus*, *squamulatus*), ou les 2 caractères ensemble (*myrmecophilus*, *inermis*, *quadarramus*). Il se distingue des 1^{er}, 2^e, 4^e et 5^e groupes, par les jambes antérieures tout-à-fait inermes, qui n'ont que le petit crochet dirigé en dedans. A l'exception d'*aristatus* et *squamulatus*, toutes les espèces ont le bord antérieur du 2^e segment abdominal courbé et les ongles libres, sauf dans les *granulatus* et *syriacus*. Les scrobes antennaires ont une conformation assez uniforme et ne présentent quelque chose d'anormal que dans l'*inermis*, parce qu'une partie est courbée en bas; la forme du rostre s'éloigne beaucoup dans les 2 espèces et ressemble à celui du 4^e groupe.

Aux 3 espèces décrites par Schœnherr ou avant lui, viennent se joindre 4 nouvelles, dont l'une (*quadrummus*) n'appartient peut-être pas à ce groupe, mais est un ♂ du 2^e.

A l'exception des 2 l^{res} qui s'étendent dans une partie de l'Europe, les espèces ont un habitat très-restreint, en Espagne (*myrmecophilus*, *granulatus*), dans le sud de la France (*granulatus*), en Autriche (*inermis*) et en Syrie (*syriacus*).

21. TRACH. ARISTATUS Gyl. Ins. Suec. iv 1827. 613, 35-36. — Gyl. Sch. Syn. Curc. ii 1834. 491, 4. — Seidl. Otiorh. 1868. 123, 26. — *asphaltinus* Gyl. Sch. Syn. Curc. ii 1834. 496, 12. — ? *stipulatus* Germ. Fn. Eur. xiii pl. 15.

L'aristatus ressemble un peu au *scabriculus*, mais on le reconnaît aussitôt à son rostre rétréci en devant et à ses jambes antérieures inermes.

Le rostre a un sillon médian étroit, ordinairement profond et est convergent en ligne droite vers l'extrémité, légèrement au-dessous de la scrobe, plus fortement au-dessus. La scrobe va droit et assez horizontalement jusqu'aux yeux. Le prothorax est 2 fois aussi large que long, fortement arrondi sur les côtés et paraissant presque anguleux par les soies, fortement rétréci par derrière; sur la surface on voit, la plupart du temps, un sillon médian distinct. Les élytres sont assez profondément striées, les interstries garnis d'une rangée serrée de soies longues, en massue, dressées. Les jambes antérieures sont terminées en pointe oblique par en dedans vers le bout et un peu en crochet. Le 2^e segment abdominal, séparé du 1^{er} par une suture droite, est un peu plus court que les 2 suivants ensemble. — Long. 3 à 3,5 mill.

L'aristatus ne doit pas être réuni au *squamulatus* comme Walton (Stet. 1848. 344) l'a fait, mais il s'en éloigne par son prothorax plus court et ses soies plus longues, ainsi que par le 2^e segment abdominal constamment un peu plus court. Au contraire, je puis regarder l'*asphaltinus*, d'après le type, comme un exemplaire tout détérioré du précédent.

L'aristatus étend son habitat presque dans toute l'Europe, comme le *scabriculus* : Suède, Allemagne, Autriche, Italie, France.

25. TRACH. *SQUAMULATUS* Ol. Ent. v 1808. 83°, p. 863. pl. 31 f. 477. — Gyl. Sch. Curc. n 1834. 492, 6. — Seidl. Otiorh. 1868. 124, 27.

Le *squamulatus* ressemble beaucoup à l'*aristatus*, mais il en diffère, outre le 2^e segment abdominal un peu plus long, par son prothorax plus étroit et les soies des élytres beaucoup plus courtes. Le rostre et la tête sont tout comme dans l'*aristatus*, seulement les yeux sont plus petits et plus convexes. Le prothorax est plus étroit, pas 2 fois aussi large que long, arrondi sur les côtés beaucoup plus légèrement, au contraire plus distinctement à la base, n'a pas la plupart du temps de sillon longitudinal, et ainsi que la tête presque pas de petites soies. Les élytres sont garnies d'une rangée de petites soies beaucoup plus courtes et plus fines. Les jambes ne diffèrent pas de celles de l'*aristatus*, mais le 2^e segment abdominal est proportionnellement un peu plus long, égal en longueur aux 2 suivants ensemble. — Long. 2,5 à 3,2 mill.

Le *squamulatus* est moins largement répandu que l'*aristatus* et se trouve confiné dans les contrées les plus méridionales de l'Europe. Il se trouve en France, Autriche et sud de l'Allemagne (Francfort-sur-Mein).

26. TRACH. *MYRMECOPHILUS* Seidl. Otiorh. 1868. 125, 28.

Le *myrmecophilus* réunit la forme du *squamulatus* avec les soies de l'*aristatus* et paraît en outre peu différent du *Cathormiocerus curvipes* et aussi des plus petits individus du *Cathormiocerus Chevrolati*. Il se distingue du *Tr. squamulatus* par ses longues et épaisses soies sur les élytres et le prothorax, de l'*aristatus* par son prothorax plus étroit, des deux par le 2^e segment abdominal plus long et par la forme des scrobes. Celles-ci sont un peu élevées et rapprochées l'une de l'autre au bout, près de l'insertion des antennes, puis descendent vers les yeux où le bord supérieur n'est pas aussi nettement limité que dans le *squamosus*. La forme du prothorax est semblable à celle du *squamulatus*, seulement il est plus fortement arrondi sur les côtés, et la rondeur paraît encore plus forte à cause des soies. Les élytres sont un peu plus allongées et garnies de soies qui

ressemblent assez à celles de l'*aristatus*. — Long. 2,8 à 3 mill.

Escorial, trouvé en 1865 et communiqué par M. Ch. Brisout sous le nom de *Meira myrmecophila* (Chevl.).

27. TRACH. GUADARRAMUS Seidl. Otiorh. 1868. 125, 29.

Le *guadarramus* se distingue par ses yeux petits, fort convexes, saillants, dont la position est tout comme dans le 1^{er} groupe, sans qu'ils soient aplatis et surmontés par le front. Les jambes antérieures paraissent avoir la structure de ce groupe, cependant elle n'est pas tout-à-fait distincte dans quelques exemplaires, d'où la possibilité, que ce soit un ♂ du 2^e groupe dont la ♀ a les jambes dentées.

Le rostre est très-court, la partie inférieure arrondie latéralement, la supérieure très-fortement rétrécie par devant, de sorte que sa pointe, avant la fin des scrobes antennaires, est moitié aussi large que le front au-dessus du bord postérieur des yeux. Les scrobes sont par là très-rapprochées l'une de l'autre en devant, larges et très-profondes, s'abaissent vers les yeux, cependant cessent peu avant, leur bord supérieur fortement courbé. Les yeux sont très-bas, tout au bord inférieur de la tête et sont très-petits, mais fort convexes et très-saillants. Les antennes sont plus menues que dans *aristatus* et *squamulatus* et le scape est un peu plus fortement courbé. Le prothorax est large, arrondi sur les côtés et a un léger sillon médian. Les élytres finement striées et garnies particulièrement par derrière de petites soies courtes en massue. Le 2^e segment abdominal est distinctement plus long que les 2 suivants ensemble. — Long. 2,7 mill.

Un seul exemplaire trouvé par M. de Kiesenwetter dans la Sierra Guadarrama

28. TRACH. INERMIS Bohm. Sch. Curc. vii 1843. 419. — Seidl. Otiorh. 1868. 126, 30. — ? Redt. Aust. 2^e éd. 1858. 731. — ? *sabulosus* Redt. Fn. Austr. 2^e éd. 1858. 731.

L'*inermis* est très-distinct de tous les autres *Trachypheus* par la structure remarquable des scrobes antennaires; la

forme approche le plus de celle du *squamulatus* pourtant avec le prothorax plus large.

La tête est très-convexe, le rostre beaucoup plus étroit qu'elle et creusé d'un sillon médian distinct. Les yeux sont assez bas et assez aplatis, cependant la surface est un peu tournée par en haut, ce qui les fait paraître plus saillants lorsqu'ils sont vus d'en haut. Les scrobes sont grandes et profondes, en triangle allongé, avec le bout tourné en dessous, sans atteindre les yeux, leur bord postérieur tombe tout au devant d'eux, et leur pointe inférieure ne descend pas beaucoup plus bas que le bord inférieur des yeux. Les antennes ont un scape très-courbé, du reste elles sont semblables à celles du *squamulatus*. Le prothorax est large, pas fortement arrondi sur les côtés et paraissant laminé par une épaisse vestiture de squamules, ainsi que les élytres, qui sont finement striées et garnies de toutes petites soies éparses. Les pattes sont conformées comme dans l'*aristatus*, seulement les jambes sont plus robustes et en particulier les 3 1^{ers} articles des tarses très-larges. Le 2^e segment abdominal, séparé du 1^{er} par une suture anguleusement en arc, est beaucoup plus long que les 2 suivants ensemble. — Long. 2,3 à 3,7 mill.

Lacordaire cite, p. 52, l'*inermis* comme synonyme du *Platytarsus setiger*; vraisemblablement sur la parole de Suffrian; quoique l'erreur de ce dernier ait été déjà rectifiée par Jekel, mais en même temps il l'exclut du genre *Trachyphlæus* p. 192. L'*inermis* et le *sabulosus* de Redtenbacher se rapportent peut-être ici.

Paraît confiné à l'Autriche.

29. TRACH. GRANULUS. — *granulatus* Seidl. Otiorh. 1868. 127, 31.

Le *granulus* est très-distinct par les ongles soudés à la base et la surface granulée des élytres et du prothorax; par sa forme il se rapproche du *Trachyphlæus laticollis*.

Le front est déprimé entre les yeux et le rostre, de là il est un peu élevé en dessus et un peu élargi en dessous des scrobes, en quoi il se rapproche de la forme du *scaber*. En dessus il est distinctement impressionné dans la longueur. Les scrobes sont profondes et larges et s'éten-

dent jusqu'aux yeux, qui sont assez plats et sont avancés tout au bord inférieur de la tête. Le scape est fortement en massue, un peu courbé; le funicule délié, le 2^e article aussi long que le 1^{er}. Le prothorax est également arrondi devant et sur les côtés, très-légèrement déprimé avant le sommet, un peu plus large que long. Les élytres ont les angles huméraux petits, distincts, arrondis et sont ensuite peu à peu légèrement élargies par derrière et arrondies au bout, légèrement striées; les interstries granulés, et de petites granulations, telles qu'on ne peut pas distinguer, comme sur le prothorax, s'ils appartiennent à la surface même ou à une épaisse vestiture de squamules; en outre les élytres et le prothorax sont garnis de petites soies blanchâtres assez éparses. Les pattes s'éloignent, pour la structure, de celles des autres espèces du groupe, en ce que les jambes antérieures sont arrondies au bout et pas du tout élargies en crochet en dedans; les tarses sont larges; les ongles sont très-petits et soudés à la base. Le 2^e segment abdominal, séparé du 1^{er} par une suture arquée en angle, est beaucoup plus long que les 2 suivants ensemble. — Long. 3 mill.

Recueilli par Pérégallo, à Nice.

30. TRACH. SYRUS. — *syriacus* Seidl. Otiorh. 1868. 128, 32.

Le *syrus* est si voisin du *granulus* sous tous les rapports, que je ne devrais pas le séparer spécifiquement, s'il n'avait pas, sur le prothorax et les élytres, des squamules distinctes assez épaisses. En outre le prothorax est beaucoup plus arrondi latéralement, élargi et très-fortement impressionné avant l'extrémité; les élytres sont beaucoup plus larges. — Long. 3,5 mill.

Syrie, un seul individu.

Espèces douteuses, probablement de ce genre :

31. TRACH. RAYMONDI Gaut. Soc. Ent. Fr. 1861. 99, 5 (*Mito-mermus*).

Ovale-oblong, brun; tête, antennes et pattes plus claires, entièrement revêtu de petites soies noires, raides,

plus denses sur le prothorax, ce qui le fait paraître épineux; la tête en est dépourvue et fortement ponctuée; rostre couvert de soies droites, noires, clair-semées, semblables à de petits tubercules, ponctué et sillonné dans toute sa longueur; antennes à scape granuleux; funicule un peu moins; 1^{er} article un peu épaissi, obconique, 2^e à peu près de la longueur du 3^e, 3-7 très-courts, comprimés, tronqués; massue ovulaire. Elytres en ovale allongé, notablement plus larges que le prothorax; soies pariales comme les stries et implantées sur les interstries. Pattes granuleuses et vêtues de soies noires; jambes antérieures garnies dans toute leur longueur de petites épines très-courtes; ongles séparés. — Long. 3,2 mill.

France méridionale, Saint-Raphaël. — 1 seul individu.

32. TRACH. VESTITUS Küst. Kæf. Eur. xv 1848. 61 (*Cathormiocerus*).

Ovale un peu court, brun de poix rougeâtre, vêtu de squamules d'un gris jaune, denses, presque en forme de feutre, un peu rugueuses. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, rouge-ferrugineux; scape presque droit, rugueusement poilu de gris, les autres articles courts, légèrement garnis de poils courts, raides, dirigés en avant, massue en ovale court, terminée en pointe, les 4 articles garnis au bout de duvet blanchâtre. Tête courte, peu convexe, front grossièrement ponctué-ridé, avec une squamosité jaune, vertex finement et densément ridé transversalement; rostre un peu plus long que la tête, épais, droit, plan, avec un fort sillon médian, au fond duquel on remarque une fine carène vers le bout, surface garnie de squamules sétiformes. Prothorax presque aussi long que large à la base, tronqué droit devant et derrière, fortement arrondi sur les côtés, rétréci par devant, obliquement rentrant à la base, convexe, assez densément marqué de points forts, avec des poils sétiformes, serrés, arqués entr'eux, les parties inférieures avec des points fovéiformes serrés, dont les intervalles élevés forment des mailles arrondies, les points sont munis de poils squamuleux jaunes séparés. Elytres à peine plus ovales,

larges en devant que le prothorax à la base, élargies aux épaules, légèrement arrondies sur les côtés, rétrécies par derrière, conjointement en pointe arrondie au bout, convexes, rabattues brusquement et presque droites par derrière, fortement striées, avec des points faibles mais grands et rapprochés dans les stries; interstries inégaux, étroits, un peu élevés, également garnis de squamules gris-jaune, avec une rangée de soies claviformes jaunes, demi-couchées; dessous finement ponctué-rugueux, garni d'une légère pubescence jaune. Pattes d'un rouge-ferrugineux, robustes; cuisses et jambes assez densément garnis d'épaisses soies un peu claviformes. Tarses presque glabres, garnies en dessous de brosses blanchâtres. — Long. 4,6 — larg. 2,3 mill.

Illyrie, Trieste.

33. TRACH. ROSTRATUS Thoms. Skand. Col. x 1868. 175, 2. — *scaber* Thoms. id. vii 1865. 131, 2.

Obovale, noir, opaque, densément squamuleux de brun, antennes et pattes d'un brunâtre de poix; rostre canaliculé au milieu, ainsi que le prothorax; serobes antennaires non prolongées jusqu'aux yeux. Prothorax non ou à peine resserré à la base où il est plus large qu'au sommet, marqué de chaque côté d'une fovéole. Elytres hérissées postérieurement de squamules blanches dressées, disposées en séries. Jambes antérieures distinctement denticulées au bout. — Long. 2,3 à 3,3 mill.

Scandinavie.

Thomson, dans son 7^e volume, avait rapporté cette espèce au *scaber* de Linné et de Gyllenhal, mais dans le 10^e, il reconnaît son erreur.

34. TRACH. CANALICULATUS Schauf. Har. Col. Heft. II 1867, 20 (*Misomermus*).

Ovalaire-oblong, convexe, noir, densément couvert de squamules d'un jaune cendré tomenteuses, garni de petites soies claviformes; rostre avec une impression longitudinale peu marquée; tête marquée en devant d'une profonde impression transverse. Prothorax transverse, ar-

rondi sur les côtés, rétréci en devant, garni de soies, marqué au milieu de 2 lignes longitudinales parallèles (brisées en devant), d'un noirâtre clair — avec 2 larges foveoles creusées profondément de chaque côté, légèrement arrondi à la base. Elytres striées-ponctuées, squamuleuses de jaune-cendré et variées, interstries pointillés, garnis d'une rangée de soies; antennes et pattes brunes. — Long. 4,5 — larg. 2 mill.

Faciès du *squamosus* Gyll. Sch. Il s'en distingue par le sillon médian du prothorax bien accusé et les stries des élytres plus profondes; il ressemble beaucoup aussi au *variegatus*, mais il est beaucoup plus grand et en diffère par son prothorax bien impressionné et sa ligne médiane raccourcie par devant. Le prothorax est aussi plus court, creusé de chaque côté par derrière d'une profonde et grande impression, ainsi que vers les angles antérieurs. Le scape est peu courbé, renflé en massue au bout, le 2^e article du funicule est pyriforme épais, le 3^e obconique, 4 à 7 à peine aussi longs que larges; massue ovale, en pointe.

Espagne, Majorque.

XXVI. — CATHORMIOCERUS (καθόρμιον, *collier*; κέρας, *corne*) Sch. Curc. vii 1843. 120, 300. — Seidl. Otiorh. 1868. 128, 35.

Scoliocerus Wollast. Ins. Mad. 1854. 391. — **Schaumius**
Ch. Bris. Fr. 1866. 44.

Scrobes latérales, profondes, atteignant les yeux.

Rostre court, avec un rebord plus ou moins aigu.

Antennes courtes, différentes selon le sexe.

Prothorax plus court que large, arrondi ou anguleux sur les côtés.

Elytres oblongues, plus ou moins planes sur le dos.

Corps déprimé ou subdéprimé.

Abdomen squamuleux de noir, squamules connées, un peu brillantes, granuliiformes; avance intercoxale large

tronquée, 2^e segment anguleux en devant, plus long que le 3^e et le 4^e ensemble.

Cuisses mutiques; jambes mutiques au bout; ongles libres ou connés.

Le genre *Cathormiocerus* est un groupe très-naturel d'espèces très-voisines. Il est très-voisin du genre *Trachypplus* et a une forme très-rapprochée de la sienne. Cependant on trouve une différence qui sépare leurs espèces d'une manière tranchée. La vestiture du dessous est, dans les *Cathormiocerus*, formée de squamules luisantes, granuli-formes, soudées et par là même non sujettes à disparaître par le frottement, lesquelles sont souvent si étroitement liées, qu'elles présentent l'aspect d'une surface lisse non squamuleuse, comme c'est aussi le cas en dessus dans la 2^e division.

La tête n'est pas aussi rebordée en bourrelet que dans *Trachypplus*, mais avec le rostre plus ou moins en arête tranchante; les yeux sont latéraux, mais moins bas que dans *Trachypplus*. Les scrobes sont latérales, souvent avancées plus ou moins en dessus au bout, cependant atteignant les yeux latéralement, de sorte qu'on ne peut pas les confondre avec une scrobe supérieure. Les antennes présentent d'étonnantes différences selon le sexe: tantôt le scape est dans le ♂ marqué d'un élargissement anguleux, tantôt la ♀ a le funicule plus épais avec les articles lenticulaires, serrés l'un contre l'autre. A ces différences quelquefois se joint la circonstance remarquable, que le ♂ a les ongles des tarses antérieurs soudés, la ♀ les a libres.

Le prothorax est arqué en angle latéralement seulement dans *cordicollis* et *Cherrolati*, du reste uniformément arrondi, et sa surface sans inégalités, cependant il n'est jamais régulièrement cylindrique, comme le dit Lacordaire (vi p. 494). Les élytres ne sont pas très-convexes, mais toujours plus ou moins déprimées sur le dos, de forme allongée, pour l'ordinaire de forme parallèle ou ayant leur plus grande largeur aux épaules.

Les pattes ne présentent pas de distinction, seulement les jambes antérieures manquent de cette dentelure qui

est commune dans les *Trachyphleus*, et elles ont seulement un petit angle apical tourné en dedans; les jambes postérieures ont dans une espèce, *lapidicola*, une structure de la pointe qui se rapproche de celle décrite dans le 1^{er} groupe des *Trachyphleus*. Les ongles sont d'ordinaire libres, dans quelques ♂ ils sont soudés aux 4 tarses antérieurs.

Le dessous présente sur l'abdomen une vestiture de squamules noires, luisantes, soudées, qui ressemblent à des granules; seulement la partie du mésosternum à laquelle se soude le prothorax, porte souvent sur une étendue plus ou moins grande des squamules claires isolées, de couleur plus claire, qui se trouvent aussi sur les hanches.

Le dessus présente une grande différence dans la vestiture, de sorte qu'on peut séparer les espèces en 2 groupes par ce moyen: le 1^{er} qui se rattache aux *Trachyphleus* a des squamules séparées, ordinairement mates, rarement un peu soyeuses (*horrens*); dans le 2^e les squamules sont luisantes et liées en une surface plus ou moins polie, qu'à l'œil nu on croirait dépourvue de squamules. Cette disposition est désignée dans la diagnose par ces mots: *Corporē elytrisque quasi esquamosis*.

Le genre *Cathormiocerus* a été établi par Schöenherr pour le *Trachyphleus horrens* et une nouvelle espèce *Cathormiocerus socius*. Ces 2 espèces sont demeurées longtemps inconnues à cause de leur rareté et ont été d'ordinaire faussement signalées. Küster décrit, comme *Cath. horrens*, une espèce voisine, probablement le *curviscapus*, Duval et Jekel ont pris pour lui le *variegatus* Küst. Lacordaire a obtenu le premier le type de la collection de Schöenherr, mais en disant: *prothorax cylindrique et ressemble extraordinairement à la Meira crassicornis avec une taille 5 fois plus grande*, il a rendu plus difficile la reconnaissance de l'espèce (*). Küster décrit 2 nouveaux *Cathormiocerus*: *vestitus* des environs de Trieste, et *variegatus* de Sardaigne. Le dernier

(*) On dirait même qu'il n'a pas eu le vrai type entre les mains. Le type du reste du 2^e vol. était dans la collection de Gyllenhal.

se rapporte au genre *Trachyphlorus*, le 1^{er} me demeure inconnu, et l'exemplaire original de la collection de Küster est devenu la pâture des anthrènes. Cependant, d'après la description, il est évident qu'il ne se rapporte pas au genre *Cathormiocerus*, puisqu'il le place dans le voisinage du *variegatus*, vraisemblablement c'est un *Otiorhynchus*, comme l'indique la sculpture du prothorax et des élytres et la fine pubescence jaune du dessous.

Le nombre des *Cathormiocerus* n'est pas non plus augmenté par les *Cathormiocerus muricatus* Chevrl. et *squamulatus* Reiche, puisque ces 2 espèces appartiennent aux *Peritelus* auxquels il faut aussi joindre le *Pfisteri* Stierl. En 1854, lorsque parurent les *Insectes de Mulère* de Wollaston, le genre *Cathormiocerus* était comme inconnu, et il n'est pas surprenant que Wollaston en ait créé un qui lui est identique (**). Les deux espèces *Scoliocerus Mulèrei* et *curripes* Wollast. forment les 3^e et 4^e espèces du genre; comme 5^e Schœnherr avait dans sa collection un *Cathormiocerus hirtus* n. sp., alors non encore publié, mais qui, pour la 1^{re} fois, a été décrit en 1862 par le D^r Stierlin dans un supplément à sa Monographie sous le nom d'*Otiorhynchus excursor*. Dans l'excursion en Espagne au printemps de 1863, on a récolté le nombre extraordinaire de 9 vrais *Cathormiocerus* dont 3 seulement se rapportent à des espèces déjà connues (*horrens*, *socius* et *excursor*). Chevrolat en a décrit aussitôt 4 (parmi lesquelles le *horrens*), et sous 4 noms de genres différents, l'un d'eux avait été décrit par M. Ch. Brisout dans les *Annales* comme *Schaumius Vuillefroyi*. Parmi les 5 autres, il y en a encore 3 non décrits, l'un trouvé dans l'Escorial, en 1864, et l'autre découvert depuis plus longtemps par Stableau dans les Pyrénées, de sorte que le nombre peut être porté à 13.

(**) Ce que dit Lacordaire de « l'intégrité, du rostre à son extrémité » et « antennes terminales, » ne peut être constaté.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

A Corps et élytres densément squamuleuses ou seulement sur les côtés; squamules non soudées.

1^{er} GROUPE.

B Squamules opaques.

C Scape régulièrement plus ou moins courbé, prothorax dilaté anguleusement sur les côtés.

D Prothorax un peu sillonné dans sa longueur, fortement arrondi à la base; rostre sillonné seulement au bout, scape (♂?) dilaté-droit; funicule très-grêle; scrobes fovéiformes n'atteignant pas les yeux.

1. *cordicollis* Seidl. Pyr. E.

D' Prothorax non sillonné, peu arrondi à la base; rostre distinctement sillonné jusque sur le front.

E Scrobes rapprochées en dessus, d'où le rostre est un peu rétréci au milieu de sa surface supérieure; ♂ scape dilaté-courbé; funicule grêle, ♂ scape un peu courbé, funicule épais, articles transverses à partir du 4^e; scrobe fovéiforme n'atteignant pas les yeux.

2. *socius* Bohm. Sch. E

E' Scrobes non rapprochées en dessus; dessus du rostre rétréci en devant; scape courbé; funicule épais.

F Scrobes fovéiformes en devant, indistinctes postérieurement, atteignant à peine les yeux; funicule très-épais, articles transverses à partir du 2^e; front garni de fines soies à peine en massue; prothorax tronqué au bout.

3. *mutandus* (Chevrolati Seidl.) E.

F' Scrobes plus larges en devant, plus étroites par derrière, nettement limitées, profondes jusqu'aux yeux; funicule (♂?) épais, articles transverses à partir du 3^e; front garni au-dessus des yeux de soies épaisses, squamiformes; prothorax arrondi au bout.

4. *Diecki* Seidl. E.

G' Scape courbé anguleusement entre la base et le milieu.

- D Scrobes plus larges en devant, moins nettement limitées; rostre plus court que large; scape grêle à la base, épais au bout.
5. curvipes Wollast. F. Alg. Mad.
- D' Scrobes étroites devant et derrière, nettement limitées, atteignant les yeux; rostre pas plus court que large, dessus large, parallèle; scape (♂?) épais dès la base. *6. curviscapus* Seidl. E Alg.
- B' Corps et élytres garnis de squamules grises d'un éclat soyeux; scrobes étroites, profondes jusqu'aux yeux, nettement limitées.
- C Scape peu courbé; ♂ ongles des pattes antérieures connées; funicule plus grêle; ♂ ongles libres; funicule très-épais. *7. horrens* Gyl. Sch. E.
- C' Scape dilaté à la base et fort anguleux; ongles libres. *8. Maderæ* Wollast. Mader.
- A' Squamules connées, luisantes, d'où le corps et les élytres comme dénudés. 2^e GROUPE.
- B Squamules des élytres à peine visibles, irrégulières.
- C Elytres garnies de poils tenus.
- D Jambes postérieures avec la marge apicale épaissie; 2^e article du funicule (♀?) courbé; élytres à peine poilues. *9. lapidicola* Chevrol. E
- D' Jambes postérieures avec la marge apicale aiguë; funicule simple; élytres avec de plus longs poils.
- E Prothorax subanguleusement arrondi sur les côtés; élytres près de 2 fois plus larges que le prothorax, rétrécies par derrière à partir des épaules qui sont élargies, à peine de moitié plus longues que larges; funicule plus grêle, articles non transverses; ♂ ongles des pattes antérieures connés, ♀ ongles libres.
10. hirticulus Seidl. E^s Alg.
- E' Prothorax orbiculaire tronqué au bout; élytres de moitié plus larges que le prothorax, subparallèles, plus de moitié plus longues que larges; funicule (♀?) épais, articles transverses; ongles (♀?) libres. *11. excrucer* Stierl. E
- C' Elytres garnies de soies plus ou moins raides.
- D Soies plus courtes, blanches.

E Prothorax non moins rétréci à la base qu'au bout, fortement dilaté sur les côtés en angle au milieu.

12. *gracens* (gracilis Seidl.) E

E' Prothorax à peine rétréci à la base, peu arrondis sur les côtés. 15. *Lethierryi* Chevrol. E

D' Soies plus longues, noires, un peu dressées.

14. *irrasus* Seidl. E

B' Interstries des élytres formés chacun d'une double série de squamules distinctes.

15. *lilliputianus* (pygmæus Seidl.) E

Le genre est presque tout propre à l'Espagne, où il doit s'en trouver encore plusieurs autres espèces inconnues, si l'on fait attention que près de la moitié ont été trouvées dans une seule excursion. 2 seulement n'ont pas été découvertes en Espagne, *curvipes* et *Maderæ*, et entre les autres il ne s'en trouve que 2 (*excursor* et *curviscapus*) en Algérie et 1 dans les Pyrénées (*cordicollis*). La var. *Capimontii* du *Lethierryi* est d'Alger et du sud de la France, le *curvipes* s'est aussi retrouvé en France.

Ces insectes se trouvent toujours sous les pierres, ordinairement dans les monts et souvent à la hauteur des neiges, quelquefois en société avec les fourmis (*Chevrolati*, *Maderæ* et *curvipes*).

1^{er} GROUPE.

1. CATH. CORDICOLLIS Seidl. Otiorh. 1868. 132, 1.

Le *cordicollis* est très-distinct par sa forme large et son prothorax cordiforme, et ne peut être confondu avec aucun autre. Le rostre est beaucoup plus large que dans le *socius*; les scrobes aussi également élargies au milieu vers en haut, et par là fovéiformes. Le scape est beaucoup plus large que dans le *socius* ♂, très-fortement élargi en angle à la base, mais non courbé; le funicule mince et délié. Peut-être cette conformation est-elle particulière au ♂, et la ♀ pourrait avoir, par analogie avec le *socius*, un scape simple et un funicule plus épais. Le prothorax est fortement, presque anguleusement dilaté avant le milieu, par suite cordiforme, et a un sillon médian superficiel, et la squamulosité forme, comme sur les élytres, une vestiture d'un brun gris, d'une structure indistincte. Les dernières sont très-larges, particulièrement aux épaules et à peine environ d'un quart plus longues, très-finement striées et garnies de toutes petites soies claires, qui ne

troublent pas l'aspect lisse. — Long. 4,2 à 4,8 — larg. 2,5 mill.

Les 5 exemplaires que j'ai sous les yeux, qui probablement sont tous des ♂, ont été recueillis par M. Stableau dans les Pyrénées. M. G. Dieck en a pris un exemplaire en Aragon.

Il n'est pas impossible que des exemplaires plus frais et plus nombreux ne nous apprennent que c'est un *Tra-chypheus*.

2. CATH. SOCIUS Bohm. Sch. Curc. VII 1842. 121, 2. — Seidl. Otior. 1868. 133, 2.

Le *socius* est voisin du précédent, mais il a la forme beaucoup plus étroite. Il se distingue, avec le *cordicollis*, des autres *Cathormiocerus*, par la forme des scrobes. Celles-ci ne sont pas linéaires, mais foveiformes et un peu élargies au milieu supérieurement, d'où elles se rapprochent un peu l'une de l'autre à l'insertion des antennes et sont visibles en dessus. Le rostre est un peu plus long que dans le *curvipes* et plan en dessus, avec un sillon médian indistinct s'étendant jusqu'au vertex. Le scape ♂ est élargi anguleusement près de la base (la dilatation s'étend jusqu'au bout) et en outre distinctement courbé, avec le funicule plus grêle, celui de la ♀ est dilaté peu à peu près de la base, et n'est que légèrement courbé, avec le funicule plus épais. Le prothorax est beaucoup plus large que long, a les côtés fortement arrondis et est fortement rétréci vers la base; la squamulosité comme dans le *curvipes*, cependant indistinctement en forme de cellules, plus clair sur la ligne médiane et sur les côtés dans les exemplaires frais. Les élytres sont en ovale allongé, les interstries également aplatis et garnis d'assez longues soies brun-clair. — Long. 3,5 à 4 mill.

Le *socius* a été récolté en petit nombre par Kiesenwetter, sur la Sierra Nevada, dans le voisinage des neiges, sous les pierres, de sorte qu'il n'y a pas de doute sur le rapprochement des 2 sexes.

L'exemplaire original de Schönherr est un ♂ défloré, qui est identique à un ♂ de la Sierra Nevada. Je prends pour une anomalie individuelle l'élévation remarquable du rostre entre les antennes, car elle est plus élevée à gauche qu'à droite.

3. CATH. MUTANDUS. — *Chevrolati* Seidl. Otioch. 1868. 135, 5 ♀.

Corps et élytres squamuleux-opaques; prothorax fortement dilaté en angle au milieu, peu arrondi à la base, tronqué au bout; rostre sillonné jusque sur le front; dessus non resserré; funicule (♀?) très-épais, articles transverses à partir du 2^e, front garni de soies fines à peine claviformes. — Long. 3,3 à 3,8 mill.

Le *mutandus* ressemble beaucoup au *socius*, et d'un autre côté se rapproche aussi du *Trachyphleus myrmecophilus*, mais il se distingue de l'un et de l'autre par les scrobes, qui sont superficielles au-devant des yeux, en outre du 1^{er} par les côtés du prothorax fortement presque anguleusement dilatés au milieu, et le funicule épais des antennes ♀ qui se rapproche de celui de la ♀ de l'*horrens*.

Le rostre est en dessus plus parallèle que dans le *socius*, parce que les scrobes ne se rapprochent pas l'un de l'autre au milieu, et qu'il a seulement un léger sillon longitudinal; les antennes sont tout comme celles de l'*horrens* et présentent la même différence sexuelle.

Castille, Escorial.

L'insecte que je prenais autrefois pour le ♂ ayant les scrobes différentes, doit être exclu. Chevrolat l'a décrit sous le nom de *Trachyphleus? socius* Guér. 1866. 26, 23, qui fait double emploi, et l'a trouvé parmi les fournis.

4. CATH. DIECKI Seidl.

Corps et élytres avec des squamules opaques, garnis de soies courtes, épaisses. Prothorax fortement dilaté au milieu, un peu arrondi à la base et au sommet. Rostre canaliculé jusque sur le front; dessus non rétréci; funicule épais, articles transverses à partir du 3^e; front garni de soies épaisses squamuliformes, plus épaisses au-dessus des yeux. — Long. 3 mill.

Espagne méridionale (Valence, Algéziras). Découvert par M. Dieck.

Ressemble beaucoup au précédent, mais il s'en distingue surtout par les soies squamiformes du front et par son prothorax proportionnellement plus long, arrondi en avant.

5. CATH. CURVIPES Wollst. Ins. Mad. 1854. p. 392. (*Scoliocerus*.)
— Seidl. Otiorh. 1868. 134, 4.

Le *curvipes* a de la ressemblance avec les formes certaines du genre précédent, surtout avec le *squamulatus* et le *myrmecophilus*, mais il est facile à distinguer des deux au scape courbé fortement, presque en angle, près de la base.

Le rostre est très-court et assez élevé entre les antennes, de sorte que les scrobes étroites descendent un peu vers les yeux. Le scape est délié et fortement coarbé à la base, mais fortement épaissi en massue vers le bout; le funicule est plus étroit que le scape au bout. Le prothorax est un peu plus large que long, inégal et densément couvert de squamules enfoncées, qui lui donnent une apparence de cellules; en outre il est garni de courtes soies noires dressées. Les élytres sont légèrement arrondies ou assez parallèles sur les côtés, à peine 4 fois 1/2 aussi longues que larges, arrondies par derrière, finement striées, tous les interstries garnis d'une rangée de petites soies noires courtes. — Long. 2,5 mill.

France (Brest, Auvergne), Collioure; Alger et Madère. Vit sous les pierres, en compagnie des fourmis. (Wollaston.)

6. CATH. CURVISCAPUS Seidl. Otiorh. 1868. 134, 3.

Le *curviscapus* est tellement semblable au *socius* qu'il suffit de noter les différences. Les scrobes ne sont pas élargies au milieu supérieurement, mais simplement linéaires, d'où le dos du rostre n'est pas rétréci au milieu, mais parallèle et plus large. Le scape est plus fort à la base, presque anguleusement courbé, mais pas si fortement élargi que dans le *socius* ♂; le funicule représente celui du *socius* ♂, c'est pourquoi je prends pour des ♂ les individus que j'ai sous les yeux.

Corps et élytres couverts de squamules opaques; prothorax rétréci à la base, dilaté-arrondi très-fortement sur les côtés; rostre pas plus court que large, parallèle en dessus. — Long. 4,3 mill.

Espagne (Andalousie); Algérie.

7. CATH. HORRENS Gyl. Sch. Curc. VI 1834. 495, II (*Trachyphlæus*).
— VII 121, 1. — Seidl. Otiorh. 1868. 136, 7. — *sulcirostris* Chevrl.
Guér. Rev. 1866. 104, 39°.

Le *C. horrens* se distingue par la vestiture mate de fines squamules grises, enfoncées au milieu, sur les côtés du prothorax et des élytres, plus rarement sur toute la surface de celles-ci. En outre, les élytres sont garnies de fines petites soies claires, qui cependant sont beaucoup trop fines pour troubler l'aspect soyeux lisse de l'insecte, en contradiction avec le nom d'*horrens*.

Le rostre est aussi long que large, rétréci par devant, plan en dessus avec un sillon longitudinal profond, qui s'avance jusque sur le front. Les serobes sont assez étroites et nettement limitées, un peu courbées au milieu, par devant un peu avancées supérieurement, descendant un peu à partir du milieu, atteignant les yeux au milieu de leur bord antérieur. Scape également épaissi et légèrement courbé dans les 2 sexes. Le funicule ♂, proportionnellement délié, les articles pas beaucoup plus épais que longs, ceux de la ♀ cependant très-épais, tous les articles transverses, le 2^e faiblement déprimé à la base, puis fortement élargi et légèrement sinué en dedans; c'est la structure décrite dans le *lapidicola* à un moindre degré. Le prothorax est légèrement rétréci à la base, plus fortement vers le sommet, distinctement arrondi sur les côtés, également couvert de gros points serrés en dessus, finement squamuleux gris-clair sur les côtés. Elytres ayant leur plus grande largeur aux épaules, assez fortement rétrécies par derrière et enfin presque en pointe courte, particulièrement ♂; distinctement striées-punctuées, le 3^e interstrie souvent distinctement élevé surtout à la base. — Long. 3,5 à 4 mill.

Les ongles présentent une disposition remarquable qui se retrouve dans l'*excursor*; ils sont ♂ soudés à la base aux 4 tarses antérieurs, et séparés à tous les tarses ♀.

L'*horrens* est resté longtemps inconnu depuis sa description, sans doute parce qu'il n'avait pas été retrouvé. Mais en 1865 il a été recueilli en grand nombre sur l'Escorial; j'en ai pris un individu sur le *Pena de Francia*, sous de petites pierres, en compagnie du *Thylacites*

longipilis et du *Crypticus Kraatzii*. Chevrolat l'a décrit sous le nom de *Peritelus sulcirostris*.

7^a. CATH. GRACILIOR Fairm. Soc. Ent. France 1870. 400.

Oblong, d'un brun plombé, assez luisant, hérissé de quelques soies. Rostre court, épais, rugueux, creusé au milieu d'un sillon longitudinal, partant d'un gros point interoculaire. Antennes brun-rougeâtre, rugueuses, hérissées de soies courtes, couchées, funicule grossissant peu à peu jusqu'à la massue, dont le 1^{er} article est grand, les derniers très-courts et très-serrés, formant une pointe. Prothorax transverse, fortement arrondi sur les côtés, rugueux et marqué de points aplatis. Elytres ovalaires, tronquées à la base avec les épaules obliques; stries bien marquées, peu profondes, à points assez gros, espacés; interstries presque plans, rugueusement ponctués avec une série de soies courtes; suture élevée par derrière. — Long. 3,3 mill.

Ressemble beaucoup à l'*horrens*, mais plus allongé, rostre à sillon moins profond, antennes bien plus grêles, prothorax plus large, marqué de gros points aplatis, au lieu d'une ponctuation fine et serrée, élytres bien plus allongées, à interstries bien plus rugueux.

Maroc, Tanger.

8. CATH. MADERÆ Wollast. Ins. Mad. 1854. 392. Pl. 8, 2. (*Scoliocerus*.) — Seidl. Otiorh. 1868. 136, 6.

Si voisin du *C. horrens* qu'on pourrait le regarder comme identique à celui-ci; cependant il s'en éloigne par les points suivants: les scrobes antennaires n'atteignent pas le milieu du bord antérieur des yeux, qui sont fort convexes, mais vont plutôt vers le bord inférieur; le scape est fortement courbé près de la base et épaissi à partir de là, comme dans le *socius* ♂, seulement un peu moins; le funicule est conformé comme dans l'*horrens* ♂, c'est pourquoi je regarde mon seul exemplaire comme un ♂; il a à tous les tarses les ongles libres. Le prothorax est plus fortement rétréci par derrière que dans l'*horrens*. — Long. 4 mill.

Madère, sous les pierres, en société avec les fourmis. Le seul exemplaire que j'ai se rapporte au *Chevrolati*.

II^e GROUPE.

9. CATH. LAPIDICOLA Chev. Guér. Rev. 1866. 322, 48. (septembre).
 — Seidl. Otiorh. 1868. 138, 8. — *Schaumius Vuillefroyi* Ch. Bris.
 Fr. Ann. Soc. 1866. 411. (décembre).

Le *lapidicola* est très-reconnaissable à son fort éclat, à ses poils fins et courts, et à la courbure des 2 4^{es} articles du funicule, ce qui le fait paraître coudé; ce dernier caractère pourrait être une différence sexuelle.

Le rostre est large et court, presque d'égale largeur, très-faiblement rétréci par devant, plan en dessus avec une strie longitudinale enfoncée au milieu, un peu rugueux et garni de petites soies plus épaisses serrées; scrobes latérales un peu aplaties vers les yeux, un peu élevées par devant et visibles en dessus. Les antennes ont le scape très-légèrement arqué, épaissi peu à peu, et un funicule très-épais; le 1^{er} article est courbé de bas en haut, le 2^e de dehors en dedans, les 2 fortement épaissis de la base vers le bout. La courbure des 2 articles ne se réunit pas dans une seule, mais en 2 plans qui se coupent presque perpendiculairement, d'où on ne peut les observer tous deux à la fois. Les suivants sont transverses, la massue épaisse et courte; peut-être que cette structure est propre à l'un des sexes, car les 3 individus qui me sont connus sont tous des ♀, et que le ♂ se distingue par un funicule plus menu, analogue à celui de *C. horrens* et *excursor*, et par des ongles soudés. Le prothorax est fortement arrondi sur les côtés, plus large que long, plat en dessus, la surface, à un plus fort grossissement, se compose de squamules soudées, engagées les unes dans les autres, qui forment une surface noire si lisse qu'elle paraît être sans squamules et a un fort éclat. Sur les élytres et en dessous, la structure est la même; seulement, sur la portion du mésosternum couverte par le prothorax, ainsi que sur les hanches des pattes, il y a des squamules claires, libres. Les élytres sont distinctement arrondies sur les côtés, ayant leur plus grande largeur avant le milieu, largement arrondies par derrière, finement striées-punctuées, garnies de petits poils clairs en rangées, très-

fin, petits, à peine visibles. Les jambes postérieures sont élargies au bout par derrière distinctement, et par devant en un crochet; le bord apical n'est pas tranchant, mais épais et coupé obliquement, de sorte qu'il se rapproche de la structure du 1^{er} groupe des *Trachypphrus*. Les jambes antérieures sont échanérées en dedans avant l'extrémité, et armées au bout d'un crochet dirigé en dedans. — Long. 4,5 mill.

Le *lapidicola*, découvert en Espagne en 1865, a été décrit à la fois par MM. Chevrolat et Brisout (*); le premier paraît avoir la priorité quoiqu'il ait donné une description incomplète, tandis que le deuxième en a donné une très-bonne.

Brisout a créé, sur cette espèce, le genre *Schaumius*, basé sur la forme des 2 1^{ers} articles du funicule, qu'on retrouve, moins marquée cependant, dans la ♀ de *horrens* et du *Chevrolati*.

10. CATH. HIRTICULUS Seidl. — *C. excursor* Seidl. Otiorn. 1868. p. 139, 9 ♂.

Corps oblong et élytres luisantes, comme dénudées de squamules, avec des poils plus longs, sérialement disposés, hérissés; prothorax subanguleusement arrondi sur les côtés; élytres presque 2 fois plus larges que le prothorax, dilatées à l'épaule, rétrécies par derrière à partir de là, à peine de moitié plus longues que larges, funicule plus grêle, articles non transversaux. ♂ Ongles des pattes antérieures connés, ♀ ongles libres. — Long. 4 à 5 mill.

Espagne méridionale; Algérie.

Je l'avais pris d'abord pour le ♂ du suivant, dont il se distingue bien par la forme et le funicule grêle. M. V. Bruck a pris les 2 sexes en Espagne, près d'Alicante et à Valence. Il se trouve aussi en Algérie.

(*) La description de Chevrolat a été publiée dans le numéro de septembre de la *Revue zoologique*; celle de Brisout, présentée à la séance de juin, n'a paru que dans le 3^e numéro des *Annales*, en décembre 1865.

11. CATH. EXCURSOR Stierl. Ot. Berl. 1862. 363. (*Otiorynchus*.)
— Seidl. Otiorth. 1868. 139, 9. ♀.

Corps allongé et élytres luisantes comme dénudées de squamules, hérissées de poils plus longs disposés en séries, prothorax orbiculaire, tronqué au bout; élytres de moitié plus larges que le prothorax, subparallèles, plus de moitié plus longues que larges, funicule (♀?) épais, articles transverses, ongles (♀?) libres. — Long. 5,5 à 6 mill.

Le rostre ressemble à celui du *lapidicola*, mais il est beaucoup plus large, et les serobes sont plus ou moins avancées en haut vers le bout, de sorte qu'elles se rapprochent de la disposition de celles des *Otiorynchus*; cependant il manque des ptéryges lobiformes qui caractérisent ce genre, et les serobes vont par derrière distinctement sur les côtés vers les yeux. Le dos du rostre est canaliculé et profondément ponctué. Les antennes ont un scape légèrement courbé, pas fortement épaissi.

Andalousie.

Je ne connais que des exemplaires à crochets libres: peut-être ce caractère, comme l'épaisseur du funicule, n'appartient-il qu'à la ♀.

M. Vom Bruck en a trouvé quelques exemplaires à Grenade.

12. CATH. GRACENS. — *gracilis* Seidl. Otiorth. 1868. 140, 10.

Le *gracens* se reconnaît à sa forme petite allongée et à son prothorax fortement élargi latéralement, presque cordiforme.

Le rostre est semblable à celui de l'*excursor*, seulement plus aplati en dessus et assez densément garni de soies serrées squamuliformes. Les serobes sont latérales et le scape est plus fortement courbé, le funicule est plus délié que dans l'*excursor* ♀, mais plus épais que dans l'*excursor* ♂, disposition qui paraît constante. Le prothorax est rétréci fortement et assez en droite ligne, vers la base et le sommet, élargi en angle obtus au milieu. La surface du prothorax et des élytres est comme dans l'*excursor*, seulement, à la place de longs poils, il y a de courtes soies

épaisses un peu rapprochées, de couleur claire, qui deviennent squamuliformes sur la tête et les pattes ; sur le métasternum, la plupart des squamules sont aussi distinctes. La forme des élytres est comme dans l'*excursor* en petit, un peu moins allongée et les points des stries sont plus profonds. Les pattes ressemblent à celles de l'*excursor* ♀. Je n'ai pas pu constater de différences sexuelles. — Long. 3 à 3,5 mill.

Trouvé en nombre sur la Sierra-Nevada, près des neiges, sous les pierres, 1 exemplaire à l'Escorial.

13. CATH. LETHIERRYI Chevrl. Guér. Rev. 1866. 104. 38° (*Otiorynchus*.) — Seidl. Otiorh. 1868. 141, 11.

Le *Lethierryi* est si voisin du précédent, qu'il n'en est peut-être que l'autre sexe ; cependant, parmi les nombreux exemplaires de *gracens* trouvés sur la Sierra-Nevada, il n'y avait pas un *Lethierryi*, et il diffère pour la forme du prothorax, qui n'offre pas de différence sexuelle dans les *Cathormiocerus*.

Le rostre est plus étroit que dans le *gracens* et les scrobes sont plus en dessus, comme dans l'*excursor* ; le funicule est un peu plus épais (♀?), le prothorax rétréci à peine vers la base, faiblement en devant et peu arrondi sur les côtés, également plus court que dans le *gracens*. Les élytres sont, ainsi que tout le corps, beaucoup plus courtes et plus larges, luisantes comme dénudées, garnies de soies courtes, fauves, les points des stries plus légers et les petites soies d'un brunâtre un peu plus foncé. Les pattes et les ongles se rapprochent de ceux du *gracens*. — Long 3,2 mill.

Escorial, 1 seul individu.

Var. *Capiomonti*. Plus grand et plus large, distinctement déprimé sur le dos, avec de très-petites soies ponctiformes, rostre plus large. — Long. 3,5 à 4 mill.

Peut-être doit-il former une espèce distincte, mais je n'ai pas assez de matériaux pour l'établir d'une manière sûre. Il a à peu près la même forme, seulement il est plus grand, et les élytres sont plus distinctement déprimées sur le dos et plus rétrécies par derrière, les stries

plus profondément ponctuées et les petites soies réduites à de toutes petites squamules ponctiformes de couleur jaune. Le rostre est aussi un peu plus large.

France méridionale (Toulon); Alger.

14. CATH. IRRASUS Seidl. Otiorh. 1868. 142, 12.

L'irrasus se distingue de toutes les espèces de la 2^e division, par les soies obscures et la surface plus rugueuse, moins luisante

Le rostre se rapproche beaucoup de celui de l'*excursor*, seulement les scrobes antennaires sont encore plus avancées par en haut, et le dessus est couvert de fortes rides, de sorte que le sillon médian entr'elles est tout-à-fait obsolète. Les antennes ont le scape assez fortement courbé et le funicule épais, avec le 2^e article distinctement abaissé (comme dans l'*horrens* ♀), puis graduellement un peu raccourci, de sorte que le dernier article est un peu plus étroit que la massue. Le prothorax est court, assez fortement arrondi sur les côtés, rétréci plus fortement en devant que par derrière, très-rugueux en dessus et couvert de gros points entre lesquels on peut apercevoir très-indistinctement des squamules luisantes, noires, soudées, inégales. Les élytres à surface rugueuse, très-fortement striées-ponctuées, presque sillonnées et garnies, comme le prothorax, de soies longues, brun-noir, dressées, qui sont aussi longues que les poils dans l'*excursor*. La forme des élytres est large et assez courte, presque parallèles latéralement, arrondies par derrière. Les pattes sont comme dans l'*excursor* ♀. — Long. 4 à 4,5 mill.

Si les 3 individus que j'ai sous les yeux sont ♂ ou ♀, je ne puis le dire, parce qu'ils ont les crochets libres.

Escorial, à la racine d'un pin mort. Il est répandu dans plusieurs collections sous le nom d'*excursor*.

15. CATH. LILLIPUTANUS. — *pygmaeus* Stierl. Otiorh. 1868. 142, 13.

Le *lilliputanus* a la forme du précédent, mais il n'est pas moitié si long et est le plus petit du genre. Il est remarquable par les squamules distinctes, noires, régulièrement en forme de perles, sur le prothorax, qui forment

sur chaque interstrie des élytres 2 rangées serrées, si régulières qu'entr'elles, sur le milieu de chaque interstrie, on voit une strie plus fine qui porte de très-fines et petites soies blanches.

Le rostre est large, plat en dessus avec le sillon médian plus faible et garni d'épaisses petites soies assez serrées (comme *gracilis*). Les serobes sont assez latérales. Le scape est légèrement courbé, le funicule a un 1^{er} article grand, le 2^e est, comme les suivants, court, transverse, mais seulement moitié aussi large que la massue. Le prothorax est large, distinctement arrondi, les élytres au plus de 1/4 plus longues que larges, avec leur plus grande largeur aux épaules. — Long. 2 mill.

Je ne sais si les sexes diffèrent; je n'ai sous les yeux que 2 exemplaires de cette petite espèce, d'Aranjuez.

Espèce de place incertaine :

16. CATH. GRANDINI Desbr. Soc. Suis. Ent. III 1871. 313, 12.

Ovale, large, assez convexe, varié de squamules opaques brunes et d'autres d'un gris fauve, avec des soies dressées claviformes plus longues par derrière. Serobes allant jusqu'aux yeux, qui ne sont pas saillants, évidemment transverse, un peu plus étroit que la tête, nullement atténué; rostre très-court, creusé d'un large sillon; antennes courtes; scape des antennes médiocre, peu courbé, garni de soies, plus long que le reste de l'antenne; funicule cylindrique; articles 2 à 6 en carré un peu transverse; massue courte, ovale. Prothorax transverse, arrondi sur les côtés, également rétréci en arc en avant et en arrière; largement taché latéralement d'une squamose d'un gris roussâtre, souvent avec deux autres taches peu arrêtées sur le milieu. Elytres courbées sur les côtés, à peine plus étroites par derrière, avec les épaules et l'extrémité arrondies, striées fines; interstries larges; les soies varient de coloration avec celle du fond qui est taché de gris, de roux et de noir. Jambes antérieures pectinées au bout et munies d'une dent ou d'un petit ongle en dedans; crochets libres. — Long. 3,8 — larg. 1,6 mill.

Ressemble un peu pour la forme (surtout celle du prothorax), les soies des élytres quoique moins longues et plus épaisses, au *Trachyphlæus aristatus*, mais c'est réellement un *Cathormiocerus*, par l'avancement en angle obtus de la 2^e suture abdominale, le dessus brillant, etc.

Algérie, Mostaganem.

XXVII. — AXYRÆUS (ἀ, *priv.*; ξυραῖος, *tondu*). Kiesenw.

Berl. Zeit. 1864, 257. — Seidl. Otiorh. 1868. 143, 36.

Mandibules cachées par le menton.

Antennes courtes, robustes; scape dépassant les yeux;

1^{er} article du funicule obconique, les autres moniliformes.

Yeux petits, arrondis, convexes.

Rostre court, plan en dessus, un peu élevé, séparé du front par une ligne transverse.

Scrobes profondes par devant, ouvertes par derrière, abruptes, non courbées par en bas.

Prothorax grand arrondi ou subovalaire, peu convexe.

Elytres à peine plus larges que la base du prothorax, avec les épaules arrondies.

Hanches postérieures très-écartées; toutes les jambes dilatées au bout, ciliées d'épines, postérieures coupées obliquement au bout, sur la marge externe.

Ongles des tarses libres.

Ce genre, établi par Kiesenwetter sur une seule espèce, de Grèce, se distingue des *Trachyphlæus*, dont il imite la squamiosité, ainsi que de tous les genres de la 2^e division, par son prothorax d'une taille informe, surtout d'une grande longueur, et qui n'est pas beaucoup plus petit que les élytres.

1. AXYR. CRESSA. — *Kraatzii* Kiesenw. Berl. 1864. 258. Pl. III f. 4.

Tête convexe, finement ponctuée, à peine squamuleuse, presque glabre. Yeux latéraux, petits, arrondis, peu convexes. Rostre épais, en carré long, non rétréci par devant, hérissé en dessus de poils, parsemé au bout de squamules

blanches, submétalliques ou vertes, plan, tronqué-élevé vers le front, abruptement déclive latéralement. Scrobes entaillées profondément par devant, ouvertes largement par derrière. Antennes insérées sur les côtés vers le bout, courtes, épaisses, couleur de poix, scape peu épaissi vers le bout, atteignant ou même dépassant un peu le bord antérieur du prothorax; 1^{er} article du funicule obconique 2 fois plus long que large, les autres moniliformes, graduellement un peu plus courts et plus élargis, les 3 derniers transverses, massue oblongue, subacuminée au bout. Prothorax un peu plus long que large, tronqué aux 2 bouts, suborbiculaire, arrondi sur les côtés et à tous les angles, subdéprimé en dessus, déclive et non rebordé sur les côtés; peu densément rugueux-ponctué, hérissé de poils assez serrés. Elytres plus de 2 fois plus longues que larges, ovales-tronquées ou même largement échancrées à la base, légèrement arrondies sur les côtés, assez densément garnies de poils dressés, dirigés par derrière, striées-ponctuées; les stries munies de squamules, interstries assez convexes, ornés sur les côtés d'une série de points. Dessous densément squamuleux. Pattes assez courtes, garnies de poils et de squamules en partie d'un blanc métallique; cuisses peu renflées, inermes; jambes dilatées à l'extrémité et ciliées d'épines, postérieures carverneuses. Tarses à 1^{ers} articles légèrement dilatés, intermédiaires bilobés; crochets simples. — Long. 5,3 mill.

Crête.



MONOGRAPHIE DES PHYLLOBIIDES D'EUROPE

ET DES CONFINES DE LA MÉDITERRANÉE
EN AFRIQUE ET EN ASIE

Par M. J. DESBROCHERS DES LOGES

Depuis que je m'occupe plus spécialement de l'intéressante famille des *Curculionides*, je n'ai pas encore rencontré de groupe d'une étude aussi ardue que celui des *Phyllobiides*.

Les variétés sont nombreuses et prennent parfois assez de consistance pour tromper l'œil le mieux exercé. Certaines espèces, indubitablement distinctes, ont des rapports si intimes, que les caractères propres à les discerner n'apparaissent qu'à la suite d'une description minutieuse des organes où siègent les caractères distinctifs, et des différences réunies que présentent les deux sexes.

La synonymie est aussi embrouillée que possible, et les Catalogues sont surchargés d'espèces purement nominales. (J'ai dû en supprimer une trentaine au moins.) Les auteurs ne s'étant pas assez préoccupés des modifications sensibles que présentent les sexes, leur ont attribué une valeur spécifique. Aussi voit-on le mâle et la femelle de certains *Phyllobius* occuper les deux extrémités du genre. Quelques espèces appartenant à des tribus voisines ont

même été introduites parmi ces derniers; et la facilité avec laquelle on confond généralement les *Metallites*, *Polydrosus*, *Phyllobius*, etc., qui ont entr'eux, il faut le dire, les plus grands rapports de forme et de coloration, m'a surtout déterminé à embrasser, du même coup, la révision de tous ces insectes, bien qu'ils appartiennent à des groupes différents, d'après le système de classification admis jusqu'à présent (*).

Ma tâche eût rencontré des difficultés sérieuses, je dirai même presque insurmontables, si je n'avais eu à ma disposition la presque totalité des types des auteurs et particulièrement ceux de la collection Schønherr que le Musée de Stockholm, grâce au bienveillant concours de son conservateur, M. Stal, a bien voulu me confier.

La direction de cet établissement scientifique nous donne, à chaque instant, un exemple plein de désintéressement que tous les autres Musées devraient imiter. Malgré l'éloignement et les risques que peuvent courir, dans une longue traversée, des types précieux, souvent uniques, elle veut bien consentir à se priver d'une partie de ses richesses pendant un temps souvent prolongé, pour

(*) M. Jekel m'a communiqué un *Phyllobius* du Japon qui lui a été envoyé par M. de Motschulsky sous le nom de *picipes*, et qui rappelle tout-à-fait nos *Polydrosus* appartenant à la section du *Pterygomalis*. Voici le signalement sommaire de cette curieuse espèce :

Coloration et pubescence du *Phyllobius argentatus*; tête étroite allongée subétranglée à la base, renflée après les yeux latéralement et surmontée derrière ceux-ci d'une élévation tuberculeuse en angle obtus; yeux très-saillants, très-détachés; rostre plus long que large et étroit, marque d'une impression triangulaire qui remonte presque jusqu'aux yeux; scrobes assez courtes, sublatales; antennes grêles, même le scape; tous les articles du funicule beaucoup plus longs que larges; massue sublinéaire très-allongée; prothorax subhexagonal; écusson subponctiforme; élytres très-allongées et cylindriques, à stries obsoletes; cuisses assez fortement dentées, les antérieures très-claviformes.

les communiquer, aux quatre coins de l'Europe, aux entomologistes qui travaillent. Dans la plupart des Musées, les collections entomologiques sont renfermées avec plus ou moins d'ordre, dans des tiroirs qu'on ouvre rarement ou dans des vitrines, à l'intention des curieux, qui regardent sans voir. Que de trésors ainsi perdus pour la science, qui, s'ils étaient exhumés au profit des entomologistes, avec certaines garanties, viendraient enrichir nos Faunes et nos Monographies !

Comme par le passé, les collections particulières ne m'ont pas fait défaut ; parmi les principales, je signalerai celles de MM. Allard, Abeille de Perrin, Bellier de la Chavignerie, Ch. Brisout de Barneville, de Bonvouloir, Bonnaire, Chevrolat, Crotch, E. Deyrolle, Damry, Dieck, Emery, Gambey, V. Heyden, Javet, Jekel, V. Kiesenwetter, Kirsch, Kozirowicz, Lethierry, Martinez y Saez, de Marseul, Marquet, Perris, Raffray, Reiche, Røelofs, Stierlin, de Uhagon, etc., etc.

Ne pouvant citer, pour chaque espèce intéressante, toutes les collections qui la possèdent, je me bornerai à faire cette mention pour celles encore peu répandues ou pour les indications de localités ayant un intérêt géographique réel. En outre, un astérisque suivra le nom d'auteur de toutes celles dont j'aurai eu entre les mains des types authentiques.

Sans m'arrêter à des divisions en sous-genres auxquelles auraient pu donner lieu, peut-être, certaines sections assez bien limitées dans le genre *Phyllobius*, composé d'espèces à formes très-diverses, je partagerai les PHYLLOBIIDES de la manière suivante :

I. Prothorax à base subtronquée, nullement sinuée de chaque côté; ongles des tarsi soudés.

A Scrobes plus ou moins allongées, sublongitudinales ou arquées en dedans; massue des antennes oblongue ou oblongo-ovale, nullement ou peu sensiblement rétrécie vers la base, qui est le plus ordinairement étroitement arrondie; échancrure apicale du rostre médiocre, souvent peu distincte.

1. PHYLLOBIUS.

A' Scrobes courtes, presque en forme de fossette profonde, (comme celles des *Ptochus*); massue des antennes exactement fusiforme, longuement atténuée aux deux extrémités; échancrure du rostre très-forte, très-ouverte, triangulaire, et remontant, chez les ♂, jusqu'à l'origine des scrobes.

2. PSEUDOMYLLOCERUS.

II. Prothorax à base distinctement sinuée de chaque côté; ongles des tarsi libres.

A Pas d'excavation suivie d'une protubérance entre le front et la base du rostre.

3. MYLLOCERUS.

A' Une excavation large et très-forte suivie d'une élévation presque abrupte entre le front et la base du rostre.

4. CORIGETUS.

GENRE PHYLLOBIUS Germ. Ins. Spec. 1824. 447. — Sch. Curc. Disp. Method. 1826. 180, 9. — Lacord. Gen. vi 1863, 210, etc.

Corps oblong ou oblongo-ovale, squameux et pubescent, au moins inférieurement.

Tête variable de forme, ordinairement carrée; yeux arrondis, latéraux, saillants ou non, entiers.

Rostre peu allongé, épais, rarement plus long que large, subcylindrique ou subquadrangulaire, généralement courbé anguleusement, échancré au bout (mais cette échancrure est ordinairement restreinte et peu ouverte).

Scrobes profondes, plus ou moins allongées, obliquant ordinairement en dedans et très-visibles en dessus, rarement limitées, en dessus, au bord externe des yeux, jamais dirigées en-dessous.

Antennes généralement allongées ; scape atteignant, à de très-rares exceptions près, le bord antérieur du prothorax, épaissi vers le sommet, évidemment plus épais que la base du funicule, légèrement courbé, rarement tout-à-fait droit, traversant, lorsqu'il est replié en arrière, le milieu des yeux ; 2 ou 3 1^{ers} articles du funicule allongés, les autres de forme un peu variable, généralement subcylindriques ou sublinéaires, rarement subarrondis ; massue plus souvent oblongue, étroite et allongée, parfois assez courte et subovale, acuminée seulement vers le sommet.

Prothorax transversal ou subtransversal (subglobuleux souvent chez les ♂), tronqué ou très-faiblement arqué à la base.

Elytres modérément convexes (sauf chez 2 ou 3 espèces), toujours manifestement plus longues que larges, à stries ponctuées.

Pattes assez allongées ; cuisses généralement renflées, surtout les antérieures, dentées ou inermes ; tibias sublinéaires, un peu comprimés, presque droits ; tarses à articles déliés ; ongles très-rapprochés et soudés sur une plus ou moins grande étendue, presque jusqu'à l'extrémité chez les ♂.

Abdomen à suture intermédiaire aux 1^{er} et 2^e segments très-légèrement arquée en devant ou avancée en angle obtus dans son milieu ; les autres presque droites ; 1^{er} segment guère plus long que le 2^e ; celui-ci plus court que les 2 suivants réunis, souvent relevé chez le ♂, en un pli transversal très-rapproché du bord inférieur ; le dernier parfois impressionné à l'extrémité chez la ♀.

TABLEAU DES ESPÈCES.

I. Cuisses armées toutes d'une dent bien visible.

A Espèces sans système de pubescence relevée (pubescence très-courte, ordinairement peu visible, chez une seule espèce : *maculicornis*).

B Espèces oblongues (ou oblongo-ovales chez quelques ♀), plus ou moins allongées.

- C Vestiture piliforme : des poils ou des squamules allongées.
- D Scrobes subarrondies, restant latérales et limitées en dedans par la saillie longitudinale du rostre ; 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}, les derniers allongés. 5. CALCARATUS.
(Europe, Sibérie.)
- D' Scrobes arquées obliquement, subtransversales, mais ne dépassant guère la limite interne des yeux ; 2^e article du funicule plus court que le 1^{er} ; les derniers allongés. 6. FULVAGO.
(Crimée.)
- D'' Scrobes transversales, très-rapprochées sur la ligne médiane ; 2 1^{ers} articles du funicule subégaux, les derniers plus ou moins noueux.
- E Rostre aussi long ou un peu plus long que large ; une impression sur le 1^{er} segment abdominal (♂). 41. PYRI.
(Europe, Sibérie.)
- E' Rostre subtransversal ; pas d'impression sur le 1^{er} segment abdominal (♂). 42. ARTEMISIÆ.
(Suisse.)
- C' Vestiture formée d'écailles arrondies.
- D Squamules d'un gris uniforme.
- E Elytres nullement rebordées en marge canaliculée au sommet ; scrobes latérales. 33. INCANUS.
(Europe mérid.)
- E' Sommet des élytres relevé, largement rebordé-canaliculé et un peu avancé ; scrobes transverses. 43. SCUTELLARIS.
Typique. (Europe mérid.)
- D' Espèces variées de cendré, de brun et de roux.
- E Prothorax ♂ ♀ quadrangulaire, presque aussi long que large ; 7^e article du funicule obconique-allongé. 8. BRISOUTI.
(Syrie.)
- E' Prothorax ♂ ♀ évidemment transversal, arrondi latéralement.
- F Derniers articles du funicule obconiques-allongés. 7. FUMIGATUS.
(Sibérie.)

- F' Derniers articles du funicule assez courts, 7^e transversal.
- G Yeux assez fortement saillants latéralement. — Prothorax fortement arrondi sur les côtés. — Dent des cuisses assez forte. 32. MONTANUS. (Grèce.)
- G' Yeux très-peu saillants latéralement. — Prothorax à peine arrondi sur les côtés. — Cuisses faiblement dentées. 32. MACULIFER. (Eur. Ins.)
- D'' Espèces recouvertes, au moins en grande partie, de squamules vertes.
- E Tous les articles du funicule obconiques, visiblement plus longs que larges. — Une large dent triangulaire à toutes les cuisses. — Rostre très-distinct de la tête.
- F Parcimonieusement couvert de très-petites squamules un peu oblongues. — Forme très-convexe. — Funicule épais. 2. CRASSIPES. (Sibérie.)
- F' Entièrement recouvert de squamules arrondies plus larges. — Forme peu convexe. — Funicule mince ou médiocre.
- G Sans pubescence visible sur les élytres. 3. ACHARDI. (Turquie asiat.)
- G' Une série de petites soies rigides très-courtes sur les intervalles des élytres. 4. MACULICORNIS. (Europe.)
- E' Articles 3-7 du funicule plus ou moins noueux, formant une tige moniliforme. — Dent des cuisses fortes (♂), assez faible (♀). — Rostre non distinct de la tête, présentant avec elle une forme conique. 1. CYLINDRICOLLIS. (Russie, Caucase.)
- E'' Derniers articles du funicule plus ou moins courts. — Cuisses moins épaissies et munies d'une dent médiocre ou courte, subspinoforme. (Chez ces espèces, les élytres sont brièvement

rétrécies, souvent subsinuées extérieurement avant la pointe qui est un peu relevée et prolongée : ce qui donne à ces organes une apparence scutiforme ; le front est très-large.) — Rostre distinct de la tête.

F Rostre à côtés subparallèles, ou atténué vers le sommet.

G Squamosité laissant souvent apercevoir le fond. — Elytres très-convexes transversalement ; striées-ponctuées souvent assez profondément, d'où les intervalles subconvexes. — Cuisses foncées, squameuses, à dent assez forte.

H Rostre à côtés subparallèles. — Massue des antennes ovale, plus ou moins dilatée vers le milieu, assez courte. — ♂ trapu.

43. THALASSINUS.

(Sibérie.)

H' Rostre plus ou moins atténué. — Massue allongée cylindrique, son dernier article seul conique. — ♂ allongé.

44. MUTABILIS.

(Russie.)

G' Squamosité très-dense. — Elytres à stries peu profondes et intervalles plans. — Cuisses squameuses.

H Dent des cuisses assez forte. — Elytres paraissant subdéprimées. — Rostre conique ♂ ♀. — 7^e article du funicule brièvement conique, arrondi seulement au sommet.

45. SCUTELLARIS.

(Hongrie.)

(Var. verte.)

H' Dent des cuisses faible. — Elytres convexes. — Rostre assez allongé, non évidemment dilaté à la hauteur des scrobes (♀), subatténué ♂. — 7^e article du funicule transverse.

46. XANTHOCNEMUS.

(Espagne, Pyr.)

H'' Dent des cuisses faible. — Elytres convexes. — Rostre court ♂ ♀, à côtés parallèles (♂),

subatténué (♀). — 2 derniers articles du funicule très-courts, arrondis transversalement. — Scrobes médiocres transverses. — (Disque du prothorax dénudé.) 40. TERSUS. (Sicile.)

F' Rostre manifestement dilaté à la hauteur des scrobes.

G Tête rétrécie derrière les yeux. — 4-7 articles du funicule subtransverses. — Pattes ferrugineuses, cuisses à dent très-petite.

48. CHLORIS.
(Sibérie.)

G' Tête à côtés subparallèles. — 7^e article du funicule seul évidemment transversal. — Pattes foncées et squameuses; extrémité des tibias et tarses seuls rouge-ferrugineux.

47. ALPINUS.
(Silésie.)

B Espèces en ovale très-large. — Elytres fortement arquées latéralement et rétrécies aux deux extrémités.

C Antennes épaisses. 39. GYRATUS.
(Sibérie.)

C' Antennes très-grêles. 38. OBOVATUS.
(Sibérie.)

A' Espèces, indépendamment de la vestiture normale, couvertes d'une pubescence hérissée ou demi-dressée très-visible.

B Vestiture formée de poils ou de squamules allongées subpiliformes, ayant toujours un reflet métallique plus ou moins prononcé.

C Rostre transversal. — Dent des cuisses postérieures bien plus forte, très-grande. — Yeux non proéminents.

D Rostre atténué vers l'extrémité. 40. APOLLINIS.
(Grèce.)

D' Côtés du rostre restant parallèles jusqu'au bout. 9. PINICOLA.
(Grèce.)

C' Rostre plus ou moins allongé. — Dent forte à

toutes les cuisses. — Yeux saillants ou très-saillants.

D Prothorax uniformément recouvert par les squamules, ou du moins sans bande latérale distincte tranchant sur le fond.

E Tous les articles du funicule visiblement plus longs que larges.

F Scrobes sublatérales ou légèrement obliques en dedans, écartées. — Massue des antennes oblongue-subcylindrique, très-pubescente.

11. PILICORNIS.

(Europe mérid.)

F' Scrobes évidemment transverses, plus ou moins rapprochées. — Massue subfusiforme, moins longue, peu pubescente.

G Pubescence plus ou moins squamiforme. — Scape non cilié. — Lobe basilaire du 1^{er} segment abdominal non relevé en rebord.

12. CANUS.

(Europe mér., Asie min.)

G' Pubescence formée de poils fins. — Scape à cils fins dressés. — Lobe basilaire du 1^{er} segment abdominal évidemment rebordé.

13. CUPREO-AUREUS.

(Turquie.)

E' Articles 4-7 du funicule aussi larges ou plus larges que longs (selon les sexes).

29. PARVICEPS.

(Turquie asiat.)

D' Une bande latérale formée de poils cendrés de chaque côté du prothorax.

24. CONTEMPTUS.

(Crimée, Russie, Perse.)

B' Vestiture (ou au moins les taches chez les espèces qui ne sont pas totalement squameuses) formée d'écailles plus ou moins arrondies. — Tête rétrécie en arrière chez une seule espèce (*squarrosus*).

C Tête formant avec le rostre un cône allongé. — Yeux à peine saillants.

26. ARGENTATUS.

(Europe, Algérie, Sibérie.)

C' Rostre très-distinct de la tête, toujours plus étroit qu'elle.

D Poitrine et abdomen, au moins sur les côtés, recouverts d'écailles métalliques.

E Pubescence relevée rigide, brunâtre ou cendrée, systématiquement dirigée en arrière.

F Taille généralement supérieure (7-8 mill.). — Tous les segments de l'abdomen marqués dans leur milieu d'une tache dénudée.

14. PSITTACINUS.

(Suisse.)

F' Taille inférieure (3,5 à 6 mill.). — Abdomen densément squameux, à part le dernier segment. — Rostre plus court.

15. PELLITUS.

(Corse, Sardaigne.)

E' Pubescence jaunâtre ou blanchâtre, souple, verticalement dressée.

F Rostre parcouru par un sillon distinct qui atteint le front. — Pattes médiocrement pubescentes. — Abdomen largement dénudé.

25. FULVIPILIS.

(Italie.)

F' Rostre seulement avec une impression peu prolongée. — Pattes à très-longue pubescence très-touffue. — Abdomen à peine dénudé au bout.

16. PILIPES.

(Sardaigne.)

D' Poitrine couverte d'écailles métalliques. — Abdomen d'une pubescence squamiforme blanche et soyeuse.

17. SQUARROSUS.

(Espagne.)

D'' Milieu de la poitrine et tout l'abdomen dépourvus de squamules. — A fine pubescence très-clair-semée ne cachant pas la couleur foncière.

E Pas de carène sur le 2^e segment abdominal (♂). — Dent des cuisses postérieures très-médiocre.

19. TUBERCULIFER.

(Espagne.)

E' Une carène transversale sur le 2^e segment abdominal (♂). — Cuisses armées toutes d'une grande et large dent.

F Cuisses rouges entièrement.

- G 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e, celui-ci du double à peine plus long que large.
20. ETRUSCUS.
(Italie.)
- G' 2 1^{ers} articles du funicule égaux, du triple environ plus longs que larges.
- H Tibias postérieurs évidemment contournés en S. — Elytres hérissées de cils très-longs.
27. LONGIPILIS.
(Sicile.)
- H' Tibias postérieurs presque droits; pubescence médiocre semi-hérissée sur les élytres.
28. BREVIATUS.
(Autriche, Grèce, Asie min.)
- F' Cuisses toujours noires ou brunes, au moins dans leur milieu.
- G Poitrine, sommet des cuisses et bords latéraux du prothorax seuls squameux. — Tibias testacés ou jaunâtres.
21. Var. AURIFER.
(Europe mér.)
- G' Poitrine, sommet des cuisses, bords prothoraciques et quelques taches latérales sur les élytres plus ou moins squameux. — Tibias noirs.
22. LATERALIS.
(Grèce.)
- G'' Elytres ainsi que le prothorax plus ou moins densément squameux. — Tibias ferrugineux.
- II Antennes allongées; scape atteignant ou même dépassant le bord antérieur du prothorax.
21. BETULÆ.
(Europe, Algérie, Sibérie.)
- II' Antennes courtes; scape n'atteignant pas à beaucoup près le bord antérieur du prothorax.
23. BRACHICORNIS.
(Autriche.)
- B'' Vestiture réduite à quelques squamules subpiliformes mêlées à une pubescence peu abondante. — Tête rétrécie derrière les yeux.
48. REICHEIDIUS.
(Sicile.)

III. Cuisses postérieures seules dentées, mais à dent triangulaire très-distincte.

A Espèce brune ou ferrugineuse, à bandes ondées sur les élytres formées de squamules grisâtres ou dorées. 31. PICTUS.

(Europe mérid. et Ins.)

A' Espèce recouverte uniformément de squamules vertes. 30. SERRIPES.

(Grèce.)

IIII. Cuisses inermes ou munies toutes d'une dent très-obsolète.

A dent des cuisses petite mais visible.

B Dessus glabre avec quelques rares poils squamiformes blanchâtres sur les bords du prothorax et ceux des élytres. — Pas de pubescence relevée.

37. FEMORALIS.

Typique. (Sibérie.)

B' Densément recouvert en dessus d'une pubescence squamiforme grisâtre avec quelques petits poils très-courts dressés sur les intervalles.

54. Var. CINEREUS.

(Europe mér.)

B'' Pas de squamosité. — Une pubescence longue, relevée, en dessus.

C 1^{er} article du funicule du double à peine plus long que large; yeux peu saillants. 36. STIERLINENSIS.

(Autriche.)

C' 1^{er} article du funicule 3 ou 4 fois aussi long que large; yeux très-saillants. 35. OBLONGUS.

(Eur., Alg., Sibér.)

A' Dent des cuisses absolument nulle.

B Espèce glabre. — Quelques squamules verdâtres, seulement sur les bords du prothorax et sur la poitrine. 53. VIRIDICOLLIS.

B' Espèces densément couvertes de squamules piliformes ou arrondies.

C Vestiture subpiliforme sur les élytres, quelques squamules métalliques sur les bords latéraux du prothorax.

D Couleur d'un cendré uniforme; de petits poils ri-

gides très-courts plantés sur les intervalles des élytres, surtout visibles vers l'extrémité.

54. SULCIROSTRIS.

(Europe mér., Sibérie.)

D' Couleur brune variée de cendré. Pubescence relevée souple, plus longue, bien apparente, vue de côté.

55. BREVIS.

(Europe mér. et Ins.)

C² Dessus recouvert d'une couche très-dense de squamules arrondies, vertes (cendrées chez quelques variétés).

D Prothorax très-court, oblong transversal, très-arqué latéralement. — Une petite carène transversale sur le bord du 2^e segment abdominal du ♂; celui de la ♀ uni.

52. VIRIDIEREIS.

(Europe, Algérie, Sibérie.)

D' Prothorax subtransversal, subhexagonal ou peu fortement arqué latéralement. — 2^e segment abdominal uni chez le ♂, marqué d'une impression chez la ♀.

E Prothorax presque du double plus large que long, beaucoup plus large que la tête.

50. LATITHORAX.

(Sibérie.)

E' Prothorax de $\frac{1}{3}$ seulement plus large que long, à peine plus large que la tête.

F Yeux très-saillants en avant. — Tête subétranglée en arrière. — Parfois une dent très-obsolète aux cuisses.

49. CHLORIZANS.

(Sibérie.)

F' Yeux peu saillants en avant. — Tête à côtés parallèles, ou subélargie en arrière. — Cuisses constamment inermes.

51. POMONE.

(Europe, Algérie, Sibérie.)

A Dents à toutes les cuisses, très-grandes, très-larges (hebes ♀ excepté); — sans système de poils dressés, (parfois seulement quelques poils isolés le long de la suture des élytres ou du bord externe); — de petits poils rigides souvent obsolètes, chez une seule espèce (*maculicornis*). — Esp. 1-8.

- (a) *Insectes couverts, au moins partiellement, d'écaillettes vertes. 1-4.*
 (b) *Squamules ne cachant pas complètement la couleur foncière. 1-2.*

1. CYLINDRICOLLIS Gyll.* in Schœn. n 1834. p. 458, 31, vii p. 34, 48 (♀). — *hebes* Boh.* in Sch. vii 1843. p. 26, 29 (♂). *crassicornis* (Metch) Stierlin* Bull. Mosc. 1863. 496; Abeille Ent. iv. 1867. 490 (♀♂) (*).

Oblong, brun de poix, antennes et tarses plus ou moins roussâtres; couvert de petites squamules arrondies sur les élytres et l'abdomen, oblongues et transversalement imbriquées sur les bords du prothorax, d'un vert pâle, souvent blanchâtres; partie postérieure de la tête, disque du prothorax, et d'ordinaire les élytres, le long de la suture, dénudés et luisants.

Tête très-convexe en arrière, et présentant avec le rostre une forme conique; yeux petits non ou à peine proéminents. Rostre très-court et très-épais; dans son milieu une ligne creuse, profonde, remontant jusqu'au bord postérieur des yeux et terminée au sommet par une impression subtriangulaire. Antennes courtes, (surtout ♀), épaisses, à peine pubescentes; scape court, brusquement arqué au milieu, très-épaissi au sommet qui est noirâtre; 1^{er} article du funicule plus court que le 2^e, celui-ci sublinéaire, plus étroit; 3-7 plus ou moins arrondis, aussi larges que longs; massue subarrondie à la base, peu épaissie. Prothorax faiblement ponctué, parfois très-obsolètement caréné, de forme différente selon les sexes. Ecusson en triangle large et court. Elytres subovalaires, deux fois et demie environ plus longues que larges, rétrécies obliquement dès leur milieu, obtuses ou subtronquées ensemble au sommet qui est fortement relevé;

(*) N. B. Si j'ai commencé par cette espèce, ce n'est pas que je la propose comme le type le plus parfait, mais seulement parceque sa forme hétéroclite détruisait mon système de classification dans le corps du genre. Sans parler de la provenance, elle a, d'ailleurs, plus d'un rapport avec le *P. Crassipes* qui, de toutes les espèces connues, est assurément celle dont les cuisses sont le plus claviformes et le plus fortement armées.

stries voilées par la squamosité; intervalles plans, avec une série obsolète de petits poils couchés, extrêmement courts. Cuisses armées toutes d'une dent aiguë; tibias dilatés vers le sommet, surtout en dedans, (♀ ♂); ongles soudés presque jusqu'au bout. 4^e segment abdominal bien plus court que le 3^e. — Long. 4-5; — larg. 1,5-1,6 mill.

♂ Prothorax plus large que la tête et que les élytres, presque arrondi; élytres non ou à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis; dents et cuisses antérieures bien plus fortes.

♀ Prothorax de la largeur de la tête, un peu moins large que les élytres, peu ou point arqué latéralement, transversal; élytres évidemment plus longues que la tête et le prothorax réunis; cuisses peu renflées, à dents courtes.

Les caractères indiqués par M. Stierlin (Loc. cit.) pour le ♂ sont ceux de la ♀ et *vice versa*.

Russie méridionale, Sarepta; Caucase.

2. CRASSIPES Metch' Bull. Mosc. II 1859. 495, tir. 1860. 9.

Ovale-allongé, brun, parcimonieusement revêtu de squamules vertes très-étroites couvrant aussi l'abdomen chez l'insecte frais, antennes et pattes ferrugineuses, cuisses plus foncées; pubescence nulle.

Tête subtransverse; front peu déprimé, avec ou sans fossette. Yeux médiocres, à peine saillants. Rostre allongé, assez étroit, sinué latéralement, un peu dilaté au sommet qui est marqué d'une dépression arquée, obsolètement sillonné au milieu, ponctué. Antennes épaisses, allongées; scape n'atteignant pas le prothorax, presque droit; 2^e article du funicule au moins égal au 1^{er}; 3^e de moitié plus court; 4-7 obconiques, un peu noueux au sommet; tous visiblement plus longs que larges; massue oblongue, non épaissie, plus allongée (♀). Prothorax court, guère moins large que la base des élytres, fortement impressionné avant le sommet dont le bord paraît largement relevé, étroitement à la base, (au moins ♂), convexe au milieu, ponctué-rugueux. Ecusson oblong, déclive en avant. Elytres du double à peine aussi longues

que larges, convexes, plus ou moins élargies en arrière, obliquement rétrécies, subacuminées ensemble au sommet; stries d'ordinaire peu enfoncées, surtout postérieurement; intervalles larges, plans ou subconvexes. Tibias larges, fortement dilatés au sommet (♂ ♀), un peu contournés. — Long. 6-8; — larg. 2,5-3 mill.

♂ Tête et prothorax plus étroits, celui-ci assez fortement, mais régulièrement arqué; toutes les cuisses très-claviformes, les antérieures d'une grosseur remarquable, armées d'une dent extrêmement large.

♀ Tête et prothorax plus larges, ce dernier fortement dilaté latéralement dans son milieu, rétréci brusquement à la base et au sommet; cuisses des deux paires postérieures de pattes claviformes, les antérieures extrêmement dilatées modérément, à dent seulement un peu plus forte qu'aux autres paires.

Bords du fleuve Amour. (Coll. Jekel, de Marseul, Roëlofs).

(b') *Squamules formant une couche très-dense et cachant complètement la couleur foncière.* — Esp. 3-4.

3. ACHARDI Desbrochers des Loges nov. sp.

Oblong, allongé, densément recouvert de squamules vertes ou dorées, sans poils distincts en dessus; tibias et tarses et une partie des antennes souvent d'un ferrugineux obscur.

Tête aussi large à peu près que le prothorax, presque carrée, assez convexe; front marqué d'une petite fossette, parfois d'un sillon qui se prolonge sur toute la longueur du rostre. Yeux assez grands, saillants. Rostre épais, large, un peu moins cependant que la tête (surtout ♂), presque plan, sans impression marquée au-dessous des yeux, subanguleusement abaissé, profondément échancré au bout. Antennes presque glabres, allongées; scape médiocrement renflé; 1^{er} article du funicule plus court que le 2^e, 3^e de la moitié du précédent; 4-7 égaux, obconiques, plus longs que larges; massue subfusiforme, légèrement épaissie, trois fois plus longue que large. Prothorax un peu plus large que long, peu convexe, impressionné en avant et en arrière, souvent obsolètement

caréné, peu fortement dilaté latéralement; quelques points noirs au milieu de la squamosité. Ecusson suboblong. Elytres de plus d'un tiers plus larges que le prothorax, 4 ou 5 fois aussi longues, obliquement atténuées dans le dernier tiers, obtusément acuminées ensemble; bord apical étroitement relevé en gouttière; stries pointillées fines mais bien nettes jusqu'à l'extrémité; intervalles plans. Pattes grandes, cuisses antérieures bien plus renflées, toutes à très-grande dent triangulaire. — Long. 7-8; — larg. 2,5-2,3 mill.

♂ Tête et rostre plus étroits; yeux assez rapprochés; prothorax dilaté-arrondi latéralement dans son milieu, étranglé en avant et sinueusement rétréci en arrière; élytres étroites, subparallèles ou faiblement atténuées; une carène transversale sur le 2^e segment abdominal.

♀ Rostre et tête, et par suite front plus larges; yeux écartés; prothorax peu dilaté, sinueusement rétréci aux deux bouts; élytres plus larges, très-faiblement élargies en arrière; pas de carène sur le 2^e segment abdominal.

Facile à distinguer du *P. maculicornis* à pubescence peu distincte, par la dent des cuisses comparativement énorme, toutes les parties bien plus allongées, le prothorax guère plus large que la tête, et le rostre à peine plus étroit qu'elle (♀), les derniers articles des antennes évidemment plus longs que larges, etc.

Turquie, Constantinople. (Coll. de Bonvouloir, Chevrolat, v. Kiesenwetter, Kirsch, la mienne). Asie-mineure. (Lethierry).

4. MACULICORNIS. Germ. Ins. Spec. 1824. p. 449, 594; — Gyll. Ins. Suec. iv p. 617, 48; — Gyll. in Sch. n, p. 447, 16, — Boh. in Sch. vii, p. 20, 22.

Oblong, assez allongé, densément recouvert de squamules mates ou brillantes, vertes, bleues ou grisâtres s'étendant sur les pattes; tarses seuls et antennes (moins l'extrémité du scape et la massue qui sont noirâtres), ferrugineux, rarement noirs en totalité; pas de poils dressés sur le rostre, la tête et le prothorax; quelques poils très-courts, blanchâtres, soulevés sur les intervalles des élytres, souvent obsolètes.

Tête carrée, marquée d'un trait enfoncé sur le front,

parfois d'un autre sur le vertex ; yeux médiocres, assez saillants. Rostre évidemment plus étroit que la tête, à côtés subparallèles (♀), un peu élargi au sommet (♂), parcouru longitudinalement par un sillon limité de chaque côté par une crête élevée ; scrobes obliquement transversales et rapprochées. Antennes épaisses, allongées ; scape robuste ; 2 premiers articles du funicule subégaux, du double plus longs que larges, 3^e d'un tiers plus court, les autres presque aussi larges que longs, noueux au sommet ; massue subfusiforme, à peine épaissie, deux fois et demie ou trois fois aussi longue que large. Prothorax assez court, peu convexe, assez fortement arrondi latéralement (♂), faiblement (♀), plus rétréci en avant qu'à la base, souvent marqué antérieurement d'une double dépression faisant ressortir une courte carène. Ecusson très-arrondi au sommet. Elytres quatre fois aussi longues que le prothorax, subdéprimées, parallèles ou un peu atténuées (♂), faiblement élargies (♀), à stries pointillées, fines, mais bien marquées, à intervalles plans, clairsemés de très-petits points noirâtres piligères ; relevées en gouttière et séparément acuminées au sommet. Pattes fortes ; toutes les cuisses armées d'une grande dent avancée en pointe aiguë. — Long. 5-6,5 ; — larg. 2,3-2,5 mill.

♂ Un pli transversal sur le 2^e segment abdominal.

♀ Pas de pli sur le 2^e segment abdominal.

La pubescence nulle sur les parties antérieures, obso-
lète ou très-courte sur les élytres distingue aisément cette
espèce de ses congénères.

Toute l'Europe.

(a') *Insectes couverts de poils ou de squamules piliformes de
nuances variables.* — Esp. 5-6.

5. *CALCARATUS*. Fabr. Syst. Eleut. II 1801. p. 539, 138 ; — Gyll. Ins.
Succ. III p. 323, 46, in Sch. II p. 435, 1 (♂ ♀). — *alneti* Fab.
1801. p. 542, 211. — *atrovirens* Gyll. in Sch. II 1834. p. 436, 2 II
(♂). — *pyri* Sch. II 1834. 437, 3 (♂ ♀). — *pomaceus* Gyll. in
Sch. II 1834. p. 438, 4 (♀). — *fessus* Bohem. in Sch. VII 1843.
p. 14, 6 (♂). — *verecundus* Bohem. in Sch. VII 1843. p. 17, 16
(♀).

Oblong-allongé, subcylindrique (♂), ovale plus court

(♀), offrant toutes les nuances de coloration uniforme ou variée formée d'une pubescence couchée ou de poils subsquamiformes s'enlevant parfois tout-à-fait, sans poils dressés; longueur du rostre, forme et longueur du prothorax, celle de l'écusson et des élytres et profondeur des stries très-variables.

Tête allongée (♂), subtransverse (♀), obsolètement carénée; yeux grands et saillants. Rostre bien plus étroit que la tête, aussi long qu'elle, à peine ou non élargi au sommet, coudé, largement ou non impressionné en dessus selon les sexes, une forte impression au-dessous des yeux limitant une élévation médiane que ne franchissent pas les scrobes; celles-ci sublatérales, peu visibles en dessus. Antennes longues (♂), plus courtes (♀), à articles ferrugineux au moins partiellement; scape atteignant seulement (♀), dépassant (♂), le bord antérieur du prothorax, grêle à la base, notablement épaissi ensuite; 1^{er} article du funicule plus court que le 2^e, un peu plus long que le 3^e, celui-ci de la moitié du précédent; 5-7 obconiques, égaux, plus longs que larges (♂♀); massue oblongue, peu séparée du 7^e article, 3 ou 4 fois aussi longue que large. Prothorax plus ou moins nettement hexagonal, de longueur, du reste, et de dilatation latérale très-variables, souvent obsolètement caréné. Ecusson en triangle plus ou moins allongé, tantôt curviligne, tantôt rectiligne et subéquilatéral, rarement terminé en pointe aiguë ou tout-à-fait arrondie, déclive en devant. Elytres à côtés subparallèles ou arqués selon les sexes, à épaules élevées, presque du double plus larges, 4 ou 5 fois plus longues que le prothorax, légèrement acuminées et déhiscentes vers le sommet, où l'on remarque sur les bords externes et vers la suture quelques rares poils soulevés; intervalles plans. Pattes plus longuement pubescentes en dedans chez le ♂; cuisses extrêmement renflées, à dent très-large, terminée en pointe aiguë; tibias linéaires, un peu recourbés en dedans, à peine avancés anguleusement au sommet; ongles peu séparés. — Long. 6-9; — larg. (♂) 2-3, (♀) 3,2-3,6 mill.

♂ Dernier segment abdominal largement tronqué au sommet, parfois avec une faible sinuosité au milieu.

♀ Dernier segment abdominal en ogive arrondie au sommet.

N. B. Les pattes sont noires, brunes ou d'un rouge ferrugineux, d'autant plus dépouillées qu'elles sont moins foncées; les antennes rarement testacées en totalité.

Très-reconnaissable, malgré ses variations infinies, à la proportion relative des 3 premiers articles du funicule (*).

Toute l'Europe; Algérie; Sibérie.

6. FULVAGO. Stev. Mus. Mosc. n 1829, 95. — Gyll. Sch. n 1834. p. 442, 9; vii, p. 16, 12 ♂. — *fulvipes* Gyll. in Sch. n 1834. p. 441, 8; vii, p. 16, 11 (♀).

♀ Etroite, subcylindrique, à vestiture piliforme d'un vert pâle; antennes et pattes d'un ferrugineux clair; sans poils dressés.

Tête aussi longue que large, un peu plus étroite que le prothorax, avec une dépression transverse entre les yeux qui fait paraître le rostre gibbeux à la base. Yeux médiocres, peu proéminents. Rostre bien plus court que la tête, plus étroit, anguleux vu de profil, à scrobes courtes, peu avancées sur la ligne médiane. Antennes grêles, presque glabres; scape atteignant à peine le prothorax; 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux; 3^e de 1/3 plus court que le précédent, 4^e et 7^e égaux, 6^e plus court, tous sensiblement plus longs que larges, à peine épaissis au sommet; massue noirâtre, oblongue, fusiforme, moins de 3 fois plus longue que large, un tant soit peu plus épaisse que le reste du funicule. Prothorax subtransversal, arqué, peu dilaté latéralement, faiblement impressionné avant le sommet. Ecusson presque en demi-cercle. Elytres parallèles dans leurs deux premiers tiers, obliquement atténuées ensuite, non acuminées; stries ponctuées, étroites, mais bien nettes; intervalles un peu

(*) De toutes les variétés indiquées par les auteurs et fort difficiles à limiter, la var. ♂ *atrovirens* seule est assez reconnaissable à sa forme étroite très-allongée et un peu atténuée en arrière, à sa pubescence peu abondante, toujours bleuâtre ou verdâtre et à la massue de ses antennes peu séparée du 7^e article du funicule. La forme de l'écusson et la longueur du prothorax n'ont rien de constant.

convexes latéralement; aucune pubescence dressée sur les bords. Cuisses très-grosses, toutes armées d'une très-grande dent échancrée aux postérieures, presque rectangulaire aux antérieures; tibias linéaires, à peine courbés en dedans et subarrondis au sommet, les postérieurs à pubescence plus longue; ongles bien fendus mais peu écartés. — Long. 6-8; — larg. 2,5-3 mill.

♂ (*fulvago*). Le type un peu immature, entièrement fauve et à léger reflet doré est bien certainement une variété ♂, à en juger par la provenance, l'impression frontale et la gibbosité du rostre, les stries des élytres, etc., qui sont identiques. Les antennes sont grêles également et ici le 1^{er} article du funicule est un tant soit peu plus long que le 2^e, les autres diminuent successivement en longueur; la massue manque. Le rostre est un peu plus allongé mais plus court que la tête, les scrobes sont plus ouvertes, plus visibles en dessus, les yeux plus saillants. Toutes les dents des pattes sont sensiblement échancrées.

Je n'ai vu que les 2 types de la collection Schœnherr. Cette espèce doit présenter toutes les variations de couleurs de la précédente. Elle s'en distingue bien par sa taille moindre, étroite dans les deux sexes, ses antennes grêles et la proportion des articles, le rostre peu allongé et les stries des élytres très-nettes quoique fines.

Crimée. (Schœnherr.)

(a'') *Insectes à squamules oblongues formant, sur les élytres, des taches brunes ou fauves et cendrées.* — Esp. 7-8.

7. FUMIGATUS. Bohem.* in Sch. Curc. vii 1843. p. 18, 19. — *lugubris* Motsch.* in Schrenk Reis. Amur. Bul. Mosc. ii 1859. 2, 162.

Oblong-subovale, noir, recouvert d'une couche compacte de squamules très-petites, oblongues, formant des taches rousses et cendrées sur les élytres; antennes noires, base du scape et funicule moins foncés; complètement dépourvu de poils en dessus.

Tête large, front déprimé, à fossette très-obsolète. Yeux médiocres, assez saillants. Rostre plus étroit que la tête,

à côtés parallèles, plus long que large, plan ou vaguement impressionné; en dessus 2 carènes obsolètes, écartées; scrobes obliques, arquées, médiocres, ne dépassant guère la limite interne des yeux. Antennes assez minces, allongées; scape n'atteignant pas le prothorax, droit, épaissi graduellement; 1^{er} article du funicule d'un tiers au moins plus long que le 2^e, 3^e d'un tiers plus court que le précédent (ces trois articles linéaires très-allongés); 4-6 subégaux, le 7^e un peu plus long, obconique, tous visiblement plus longs que larges; massue étroite, allongée, oblongue, peu détachée du 7^e article dont elle a l'épaisseur, 3 fois au moins aussi longue que large. Prothorax transversal, obliquement rétréci en arrière, étroitement arrondi antérieurement et étranglé au sommet, peu convexe, très-obsolètement caréné et souvent dépouillé sur le disque. Ecusson triangulaire, ordinairement large à la base. Elytres assez allongées, presque du double plus larges que la base du prothorax, du double plus longues que larges, très-convexes, modérément élargies après la sinuosité infra-humérale, rétrécies en arc, un peu sinuées et comprimées avant le sommet qui n'est pas relevé; stries médiocres, sinueuses; intervalles un peu convexes à la base. Pattes allongées; cuisses médiocres, toutes munies d'une dent assez courte; ongles rapprochés. — Long. 6-7; — larg. 2,5-2,6 mill.

La ♀ me semble avoir la tête plus large, un peu boursoufflée derrière les yeux.

Reconnaissable à sa vestiture mate et compacte, ne paraissant formée de squamules qu'à un fort grossissement, sans aucun mélange de poils, la conformation des antennes, etc.

Sibérie, Daourie. (Coll. Schöenherr, Lethierry, la mienne.) MM. de Marseul et Jekel m'ont communiqué des types de M. de Motschulsky, provenant des bords du fleuve Amour.

8. BRISOUTI. Desbrochers des Loges nov. sp.

Oblong-allongé, brun, avec les antennes et les pattes plus claires, recouvert de squamules oblongues d'un brun mat, convergeant sur la ligne médiane du prothorax,

cendrées par places et formant de larges taches sur les élytres; pas de pubescence dressée.

Tête grande, notée d'une très-petite fossette, front marqué d'une ligne transversale arquée d'un œil à l'autre. Yeux grands, assez saillants. Rostre large et court, épais, plus étroit que la tête, marqué d'une impression longitudinale très-large limitée de chaque côté par une crête saillante, subatténué, déprimé en dessus au sommet; scrobes obliques, peu ouvertes, restant en dehors de l'élévation médiaire. Antennes très-longues et grêles; scape dépassant un peu le bord antérieur du prothorax, arqué seulement dans son premier tiers, brièvement renflé; 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e, ces 2 articles linéaires, près de cinq fois aussi longs que larges; 3^e plus long que le suivant; 4-7 presque égaux, peu dilatés, bien plus longs que larges; massue très-étroite et très-allongée. Prothorax sub-quadrangulaire, à angles postérieurs droits, faiblement subobliquement rétréci en arrière, à peine étranglé en avant: une forte dépression transversale rend le bord antérieur relevé; disque peu égal. Ecusson suboblong, gris-pubescent. Elytres bien plus larges, 5 fois environ plus longues que le prothorax, subdéprimées à la base, brusquement déclives en arrière, plus au moins arquées latéralement, presque arrondies ensemble au sommet; stries très-étroites, pointillées; intervalles assez larges, plans. Pattes allongées; cuisses antérieures très-fortement claviformes, toutes armées d'une dent triangulaire peu aiguë; tibiae linéaires; ongles brièvement séparés à l'extrémité. — Long. 5,5-6,5; — larg. 2,2-2,8 mill.

♂ Plus étroit, peu convexe; élytres parallèles dans leurs deux premiers tiers; cuisses et dents plus robustes.

♀ Plus large, surtout les élytres qui sont visiblement élargies de la base aux deux tiers, très-convexes en arrière; cuisses et dents moins fortes.

Bien reconnaissable à ses antennes très-grêles, à la forme du prothorax et à sa coloration.

Jérusalem. Recueilli, en mai, par feu Delarouzée. (Coll. Ch. Brisout de Barneville, Reiche.)

Je dédie cette espèce remarquable à M. Charles Brisout de Barneville, l'un de nos plus savants entomologistes contemporains.

A' Cuisses plus ou moins fortement, toutes très-distinctement dentées; un système de pubescence relevée ou tout-à-fait hérissée, indépendant de la vestiture normale. — Esp. 9-29.

(a) Rostre très-raccourci, presque aussi épais et aussi large que la tête, muni au bout d'un empâtement lisse entièrement dénudé. — Esp. 9-10.

9. PINICOLA Kiesenw*. Berl. Ent. 1864. 260. — *pineus* (Kiesenw*).

Oblong-allongé; dessus d'un brun de poix couvert assez densément de poils squamiformes verdâtres ou dorés longitudinalement condensés, ce qui fait paraître les élytres comme rayées; parfois une bande brune, étroite, sur la suture; en outre, une pubescence grisâtre assez courte, demi-relevée, et dirigée en arrière, même sur la tête et le prothorax; antennes et pattes testacées, cuisses quelquefois rembrunies.

Tête très-grosse, à peine moins large que le prothorax, convexe, marquée d'un point enfoncé. Yeux grands, paraissant oblongs vus de face, non proéminents. Rostre très-court, à peine plus étroit que la tête, déprimé obliquement vers le sommet qui est occupé par un empâtement lisse en forme de chevron, rougeâtre au bout; scrobes assez larges, très-rapprochées des yeux à leur extrémité interne. Antennes longues, médiocrement épaisses; scape très-courbé dans sa moitié basilaire, du double plus épais au sommet; 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux, 3^e un peu plus long que la moitié du 2^e, les autres plus courts, brièvement obconiques, à peine plus longs que larges, noueux (♂); massue à peine épaissie, allongée, oblongo-fusiforme. Prothorax un peu plus large que long, rétréci aux 2 extrémités, assez dilaté latéralement au milieu, parfois subanguleusement, peu convexe, à ponctuation peu serrée, peu densément squameux au milieu, où l'on remarque souvent une ligne

lisse, obsolète. Ecusson court, presque en demi-cercle, lisse. Élytres plus larges que le prothorax, quatre fois plus longues que lui, subdéprimées, à épaules élevées, rétrécies obliquement vers le dernier tiers, subacuminées ensemble au sommet qui est rebordé; stries assez fortes, plus enfoncées à la base, souvent confuses; intervalles à peu près plans. Cuisses fortement claviformes, postérieures armées d'une grande dent triangulaire, les autres d'une dent courte et obtuse; tibias larges, un peu recourbés et tronquément arrondis au sommet. Dessous noir, dénudé et luisant sur la ligne médiane. — Long. 7-8; -- larg. 2-2,5 mill.

♂ Forme étroite, rostre plus court; élytres parallèles ou un peu atténuées de la base au sommet; dent des cuisses postérieures plus grande.

♀ Moins étroite, surtout la tête; élytres légèrement élargies en arrière; cuisses moins épaisses et dents moins fortes.

Facilement reconnaissable à la forme du rostre, à la vestiture des élytres et aux dents bien plus fortes aux cuisses postérieures qu'aux autres paires.

Grèce.

10. APOLLINIS Miller Wien. Monats. 1862. 350.

Oblong-allongé, brun, recouvert en dessous d'une pubescence subsquamiforme d'un gris verdâtre, en dessus de poils d'un brun roussâtre presque mats avec une large bande longitudinale, nettement limitée sur chaque élytre, d'un vert pâle soyeux; souvent quelques poils de même couleur sur les bords du prothorax et l'écusson; en outre, une pubescence brunâtre peu relevée dirigée en arrière sur toutes les parties; antennes, tibias et tarses d'un rouge ferrugineux plus ou moins clair.

Tête grosse et courte, presque aussi large que le prothorax; front non déprimé, marqué d'un point ou d'une ligne enfoncés; yeux très-grands, non saillants, ce qui les fait paraître oblongs. Rostre extrêmement court, à peine plus étroit que la tête, épais, un peu atténué; scrobes transverses, avancées sur la ligne médiane, limitées pos-

térieurement par une dépression subverticale du rostre, offrant l'apparence d'un empâtement lisse, inégal. Antennes allongées, peu pubescentes; scape arqué dans sa 1^{re} moitié, non brusquement épaissi; 3 premiers articles du funicule allongés, décroissant successivement en longueur; 4-7 obconiques, un peu plus longs que larges (5^e et 6^e plus arrondis ♂); massue oblongue, étroite, 3 fois plus longue que large. Prothorax largement déprimé avant le bord antérieur, presque aussi long que large, pas beaucoup plus large que la tête, marqué de quelques points. Elytres 2 fois 1/2 à 3 fois plus longues que larges, acuminées ensemble au sommet; stries superficielles, pointillées; sur chaque intervalle, une série de points simulant d'autres stries. Pattes armées d'une grande dent triangulaire aux cuisses postérieures, beaucoup plus courte aux autres paires; ongles longuement soudés. — Long. 4,5-6,5; — larg. 1,5-2 mill.

♂ Antennes assez fortes; prothorax arqué sur toute sa largeur latérale et ainsi rétréci fortement et également aux deux bouts; élytres très-parallèles dans leur 3/4 antérieurs; cuisses fortement claviformes.

♀ Antennes minces; prothorax un peu plus large, moins rétréci aux deux bouts; élytres plus larges, élargies jusqu'au milieu, rétrécies en courbe à partir de ce point; cuisses moins fortes.

N. B. Parfois les bandes vertes des élytres deviennent grisâtres ou disparaissent totalement.

Grèce, îles Ioniennes.

a' *Rostre plus ou moins allongé, au moins aussi long que large, visiblement plus étroit que la tête, non complètement dénudé au bout, sans plaque lisse proprement dite.* — Esp. 11-29.

b *Pas de carène sur le 2^e segment abdominal du ♂; ou une carène très-obsolète.* — Esp. 11-19.

c. *Elytres entièrement recouvertes par une pubescence couchée ou par des poils subsquamiformes.* — Esp. 11-13.

11. PILICORNIS Desbrochers des Loges nov. sp. — *Wolffi* (Stentz')
ex. typ. mus. v. Heyden, Reiche.

Oblong-allongé, entièrement brunâtre (les antennes parfois moins foncées à la base de leurs articles), couvert en-dessus d'une pubescence squamiforme de nuance variable, le plus souvent grisâtre, peu métallique, médiocrement condensée, ce qui fait paraître les élytres tachetées; pubescence hérissée, brunâtre, assez longue, surtout sur les élytres; en dessous une pubescence cendrée peu abondante, rare sur l'abdomen.

Tête grande, avancée, déprimée sur le front, où l'on remarque une ligne creuse parfois prolongée en avant. Yeux très-proéminents, très-détachés de la tête à leur base. Rostre assez allongé, à peine plus large vers les scrobes, un peu élevé et obsolètement sillonné au milieu, marqué vers le sommet d'une impression en demi-cercle; scrobes grandes mais sublongitudinales et restant éloignées. Antennes très-allongées dans toutes leurs parties, densément pubescentes; scape assez mince dans ses 2 1^{ers} tiers, peu courbé; 2 1^{ers} articles du funicule subégaux, 5 ou 6 fois plus longs que larges, 3^e un peu plus long que la moitié du précédent, 3, 5 et 7 plus longs que les intermédiaires, 7^e semblant presque faire partie de la massue; tous beaucoup plus longs que larges; massue non épaissie, longue, subtriquée à la base, à côtés parallèles jusqu'aux trois quarts, à articles distincts, pointillée, rougeâtre au sommet. Prothorax subtransversal, arrondi, peu dilaté latéralement ♂ ♀, assez brusquement étranglé et impressionné en avant, obsolètement caréné. Ecusson subtriangulaire, émoussé au sommet. Elytres 5 fois au moins plus longues que le prothorax, peu convexes, plus ou moins longuement déhiscentes, à stries fines et intervalles plans. Pattes allongées, longuement villeuses en dedans; toutes les cuisses armées d'une très-grande dent triangulaire à pointe aiguë; tibias antérieurs un peu arqués en dedans au sommet; ongles assez dégagés. Abdomen à 2^e segment uni ♂ ♀. — Long. 7-9 — larg. 2,5-3,2 mill.

♂ Forme étroite; élytres longuement parallèles, ou un

peu atténuées dès la base ; tibias postérieurs munis sur leur face interne, avant le sommet, d'une échancrure profonde, sinueuse, que limite, à la partie supérieure, une petite touffe spongieuse de poils roussâtres.

♀ Plus large ; élytres obliquement élargies après les épaules, plus arrondies dans leur partie postérieure qui est atténuée ; tibias de forme normale.

La structure des antennes et celle des tibias postérieurs du ♂ distinguent aisément cette espèce.

Bannat, Hongrie (coll. Chevrolat, v. Heyden, Reiche). Troppau (coll. Kirsch). Constantinople (coll. Stierlin).

12. CANUS Gyll' Sch. II 1834 p. 439, 5, VII, p. 14, 5 (♀). — *feculentus* Gyll' Sch. II, 1834 p. 440, 6, VII, p. 14, 7 (♂). — *pilifer* Gyll' Sch. II, 1834 p. 443, 11, VII p. 17, 14 (♀).

Cette espèce est à peu près semblable à la précédente pour la coloration, la forme des squamules, la pubescence hérissée et la structure des pattes. La forme est visiblement plus courte ; le dessus est moins mat, les squamules ayant, le plus souvent, un éclat métallique assez prononcé.

Rostre plus étroit, paraissant subéchancré latéralement, d'où une dilatation sensible vers le sommet, plus long que large (♂ ♀) ; saillie médiane plus étroitement élevée, plus comprimée latéralement ; sommet marqué d'une grande impression triangulaire ; serobes transversales et rapprochées sur la ligne médiane. Antennes peu densément pubescentes, d'un ferrugineux uniforme ; scape bien plus épais chez le ♂ ; 1^{er} article du funicule un peu plus court que le 2^e ; 2^e et 3^e 2 ou 3 fois seulement plus longs que larges ; 3-7 à peu de chose près égaux, tous épais, une demi-fois seulement plus longs que larges ; massue un peu rétrécie et subarrondie à la base, atténuée dès le milieu, à articles soudés, bien moins longue que chez le précédent. Prothorax subobliquement rétréci du milieu aux 2 extrémités. Elytres d'un tiers plus courtes, plus brièvement acuminées ♂ ♀, plus brusquement élargies chez la ♀ ; parfois les intervalles un peu convexes. Pattes généralement ferrugineuses ; tibias de forme nor-

male (♂ ♀). Abdomen densément pubescent; lobe basilaire du 1^{er} segment non distinctement rebordé. — Long. 6-8,5; — larg. 2-2,6 mill.

♂ Antennes et rostre plus allongés; scape épais, même à la base; prothorax presque du double plus large que long, fortement arrondi latéralement; élytres parallèles dans leurs deux premiers tiers; une carène peu saillante, dissimulée par la pubescence, sur le 2^e segment abdominal.

♀ Rostre et antennes plus courts; scape mince à la base; prothorax d'un tiers seulement plus large que long, arrondi subanguleusement, peu fortement; élytres élargies de la base au milieu; 2^e segment abdominal uni.

Turquie, Caucase, Crimée, Grèce, Asie-Mineure (coll. Schöenherr, de Bonvouloir, Kirsch, V. Kiesenwetter, V. Heyden).

13. CUPREO-AUREUS Stierlin* Vien. Monats. 1861. 222. — Abeille Ent. 1864. iv. xviii.

Les 2 types que m'a confiés M. Stierlin sont couverts, en outre d'une pubescence dressée, brune, de poils fins d'un fauve à reflets dorés nullement squamiformes; l'un des deux a les pattes entièrement noires ainsi que la 2^e moitié du scape et la massue, l'autre est totalement ferrugineux, ce qui doit tenir, en grande partie, à son état un peu immature. Ils me paraissent, par la forme des élytres, appartenir au sexe ♂.

Le prothorax est bien moins arrondi, moins rétréci en arrière que chez le *canus* ♂ et rappelle plutôt celui de la ♀ de cette espèce. Tête et rostre assez courts, ce dernier à côtés parallèles, pas plus long que large; une large impression longitudinale au milieu, prolongée jusqu'aux yeux; dépression subterminale n'affectant pas une forme triangulaire, à cause du prolongement moindre des scrobes sur la ligne médiane; compression latérale beaucoup moins forte, d'où l'élévation médiaire bien moins étroite. Yeux un peu moins saillants que chez le *canus* ♂, bien plus que chez la ♀ de cette espèce. Antennes à 1^{er} article du funicule plus court que le 2^e; scape évidemment cilié de longs poils; pubescence également plus

dressée, plus roide sur les pattes; lobe basilaire du 1^{er} segment abdominal fortement relevé en rebord; une carène obsolète ou nulle sur le 2^e segment. Pubescence de l'abdomen ne cachant pas la couleur du fond. Le reste à peu près comme chez le *fucculentus* (canus ♂) auquel il ressemble beaucoup.

Le *pilicornis* a les antennes infiniment plus allongées dans toutes leurs parties, les pattes longuement villeuses en dedans, les tibias bien plus larges et les postérieurs du ♂ creusés fortement en dedans, vers le sommet, près de leur tranche interne.

Janina, Turquie. (Coll. Stierlin.)

c' *Elytres entièrement couvertes de squamules arrondies ou parcimonieusement de poils squamiformes chez une seule espèce (P. reicheldius). — Esp. 14-19.*

d *Pubescence assez roide systématiquement dirigée en arrière. — Esp. 14-15.*

14. PSITTACINUS Germ. Ins. Spec. 1824 I, p. 448, 593. — Schœnⁿ, p. 441, 7 (♂); VII, p. 15, 8 (♂ ♀). — *acuminatus* Bohem. in Sch. Curc. VII, 1843 p. 24, 26 (Var. ♀).

Oblong, allongé, densément recouvert de squamules vert brillant, bleues ou grisâtres; antennes, extrémité des cuisses, tibias et tarses testacés; une pubescence dressée, dirigée en arrière, peu souple, brunâtre, plus longue sur les élytres, devenant souvent roussâtre sur la tête et le prothorax.

Tête subtransversale, déprimée sur le front avec un fin sillon obsolète; yeux saillants. Rostre assez court, un peu plus étroit que la tête, au milieu 2 élévations longitudinales obsolètes, légèrement courbé anguleusement; scrobes ouvertes, subtransverses, dépassant un peu la limite interne des yeux. Antennes assez minces, sauf le scape; 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux (♂), le 1^{er} un peu plus court (♀), 3^e et 4^e égaux, 7^e un peu plus long que le précédent; tous évidemment plus longs que larges; massue très-allongée et acuminée, à peine épaissie, 3 ou 3 fois 1/2 plus longue que large. Prothorax plus

large que long (à peine ♂), rétréci aux deux bouts, bombé au milieu, clair-semé de points noirs peu apparents. Ecusson triangulaire, noir, très-finement pubescent. Elytres parallèles (♂), un peu élargies en arrière (♀), obliquement atténuées, un peu déhiscentes au bout, peu convexes; stries fines, voilées par la squamose et disparaissant même par places, surtout vers l'extrémité; intervalles paraissant plans. Cuisses très-grosses, surtout les antérieures du ♂, armées d'une très-grande dent terminée en pointe aiguë. Abdomen dénudé sur la ligne médiane. — Long. 7-8,5; — larg. 1,6-2,2 mill.

♂ Scape épais dès la base; prothorax globuleux; élytres à épaules carrées, à peine plus larges que la plus grande largeur du prothorax; pattes, surtout les antérieures, très-longuement et densément velues de poils blancs; tibias antérieurs recourbés en dent aiguë au sommet.

♀ Scape assez mince à la base; prothorax plus transversal, peu dilaté latéralement; élytres plus larges que le prothorax, à épaules subarrondies; pattes à pubescence médiocrement longue; dent interne des tibias très-peu avancée.

Var. *acuminatus*. — Il faut évidemment rapporter à cette espèce de Schœnherr (dont je n'ai pas vu le type), certains exemplaires ♀ de taille inférieure, à massue des antennes et quelquefois même toute l'antenne noirâtre, chez lesquels les points noirs du prothorax et des élytres sont plus nombreux et plus apparents, et dont les élytres elles-mêmes sont plus rétrécies, et plus séparément acuminées, plus nettement striées-ponctuées, un peu plus déprimées.

J'en ai vu plusieurs, tous de Suisse (Splungen principalement), dans les collections de MM. Brisout de Barneville, Lethierry, Reiche, Jekel, etc.

Les exemplaires de Saxe, d'Autriche, de France méridionale, appartiennent au type que j'ai décrit.

Enfin M. Chevrolat possède, comme venant du Piémont, sous le nom de *signaticornis* une variété sans nul doute un peu usée qui est d'un bleu blanchâtre et presque sans pubescence; l'extrémité du scape et la massue des antennes sont noirâtres.

15. PELLITUS. Bohem* in Sch. Curc. VII 1843, p. 16, 10.

Absolument semblable, sauf la taille, à l'espèce précédente, pour le faciès, la structure des diverses parties, la pubescence, les différences sexuelles, à part les caractères suivants : Entièrement recouvert, sauf le dernier segment abdominal en tout ou en partie dénudé, de squamules vertes, d'un fauve doré, bleues ou grisâtres; antennes et pattes d'un testacé clair, non ou à peine squameuses; pubescence dressée, souvent fauve ou blanchâtre à un certain jour; points noirs, dénudés, nombreux et très-apparents, analogues à ceux de la var. *acuminatus* de l'espèce précédente, presque en série unique sur les intervalles des élytres.

Tête presque carrée, front plus ou moins impressionné ce qui fait paraître le rostre un peu gibbeux; yeux grands et assez saillants. Rostre de même longueur à peu près dans les deux sexes, parfois très-court. Antennes à 2 premiers articles du funicule subégaux, 3^e un peu plus long que les suivants, les autres à peu près égaux, tous évidemment plus longs que larges; massue subfusiforme, assez allongée, 2 fois 1/2 ou 3 fois plus longue que large, à peine épaissie. Prothorax comme chez le précédent. Ecusson triangulaire, vert-squameux. Elytres à stries fines peu profondes, mais très-nettes, à ponctuation très-serrée, non déhiscentes, terminées en pointe obtuse au sommet. Cuisses à dents fortes très-aiguës. — Long. 3,5-6; — larg. 1,2-4,6 mill.

Var. B. Cuisses noirâtres; cette variation est rare. (Corse, de Bonvouloir.)

Cette espèce habite la Corse, la Sardaigne, où elle est commune.

Sa taille est extrêmement variable. On la distinguera (surtout de la var. *acuminatus*) à la coloration des pattes et des antennes, et à la squamosité très-dense sur l'abdomen.

d' *Pubescence souple, plus confuse, tout-à-fait hérissée.*
— Esp. 16-19.

e *Une forte dent à toutes les cuisses.* — Esp. 16.

16. PILIPES (♀) Desbrochers des Loges nov. sp.

Oblong, densément recouvert, même sur l'abdomen, de squamules d'un vert foncé brillant; dessous, pattes, rostre et prothorax longuement hérissés d'une pubescence très-fine blanchâtre; élytres à poils souples encore plus longs et tout-à-fait dressés. Antennes et pattes ferrugineuses.

Tête un peu atténuée en avant, convexe, non distinctement impressionnée sur le front. Yeux peu grands, peu saillants. Rostre plus étroit que la tête, plus court qu'elle, subtransversal, surmonté dans son milieu de deux petites crêtes longitudinales peu prolongées; scrobes médiocres, transversales mais peu rapprochées. Antennes atteignant à peine la base du prothorax, assez longuement ciliées au sommet des articles; scape peu robuste; 2 premiers articles du funicule égaux, 3^e et 7^e subégaux, les autres plus courts, obconiques, un peu plus longs que larges; massue un peu épaissie, subfusiforme, 2 fois $1\frac{1}{2}$ plus longue que large. Prothorax analogue à celui du *P. pellitus* ♀. Elytres 4 fois à peine plus longues que le prothorax, à stries peu accentuées; à peine un peu plus larges en arrière. Cuisses à dents assez grandes, mais prolongées en une pointe étroite et très-aiguë. — Long. 5,5; — larg. 2 mill.

Cette espèce diffère du *P. pellitus* ♀, dont elle est voisine, par les yeux peu proéminents, le scape bien moins renflé, la pubescence molle et verticalement dressée bien plus longue des élytres, les poils, du reste, bien plus longs sur toutes les parties du corps et notamment en dedans des pattes où ils sont même plus touffus que chez le *P. pellitus* ♂.

Le ♂ m'est inconnu.

Sardaigne. Ma collection.

e' *Dent des cuisses faible, au moins aux antérieures.*
— Esp. 17-19.

f *Tête rétrécie latéralement.* — Esp. 17-18.

17. SQUARROSUS Desbr. — *squamosus* Ch. Brisout de Barneville* Soc. Ent. Fr. (1866) p. 409. — *hirtus* Sedlitz* Berl. Ent. (1867) p. 187.

Oblong, médiocrement allongé, densément recouvert en dessus et sur les côtés de la poitrine de squamules brillantes d'un vert jaunâtre ou bleuâtre, entremêlées de points dénudés noirâtres; milieu de la poitrine et abdomen à pubescence subsquamiforme d'un blanc soyeux, avec quelques points noirâtres obsolètes; pubescence hérissée tout-à-fait dressée, longue, souple et touffue, grisâtre; antennes et pattes d'un rouge ferrugineux uniforme; cuisses à peine squameuses.

Tête grande, transversale, un peu boursouflée derrière les yeux et subétranglée ensuite; front large, déprimé, fovéolé; yeux médiocres, écartés, très-proéminents et notablement plus avancés latéralement que les côtés de la tête. Rostre plan, assez court, guère plus étroit que la portion rétrécie de la tête et très-épais, à côtés parallèles ou légèrement atténué, marqué à l'extrémité d'une impression formant avec les scrobes une sorte de chevron; scrobes assez larges, obliquant en dedans, sans être transversales, assez éloignées. Antennes épaisses et généralement courtes; scape très-renflé; 1^{er} article du funicule un peu plus court que le 2^e; 3-7 bien plus courts, serrés, subarrondis, les derniers d'ordinaire transversaux; massue épaisse, très-arrondie à la base, à peine du double plus longue que large. Prothorax transversal, assez convexe latéralement et plus ou moins arrondi, déprimé à la base et au sommet, plus atténué à celui-ci, souvent caréné longitudinalement. Ecusson en demi-cercle, squameux. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, 3 fois 1/2 à 4 fois plus longues, peu convexes, subacuminées ensemble et rebordées au sommet; stries fines, intervalles très-plans. Cuisses munies toutes d'une petite dent très-courte. — Long. 4,5-5; — larg. 1,6-2,2 mill.

♂ Plus étroit et un peu atténué; rostre un peu dilaté au sommet; tibias et tarses épais.

♀ Plus large, et peu élargi en arrière. Rostre sub-atténué; tibias et tarses bien plus grêles.

Cette espèce se reconnaît aisément à la saillie des yeux, à la sinuosité latérale de la tête, à l'épaisseur des antennes, (quoique un peu variables) et à la nature de la pubescence qui recouvre tout l'abdomen.

M. Ch. Brisout de Barneville m'a communiqué le type de son espèce, J'ai trouvé un type du *P. hirtus* dans la collection de M. V. Heyden. Andalousie (Coll. Ch. Brisout de Barneville, Lethierry, V. Kiesenwetter, Kirsch, Crotch, V. Heyden).

18. REICHEIDIUS Desbrochers des Loges nov. sp.

Oblong-allongé, d'un brun de poix; des poils squamiformes grisâtres à reflet métallique sur les flanes et le prothorax, plus rares et diffus sur les élytres; en outre une pubescence cendrée assez longue et hérissée; antennes, tibias et tarses ferrugineux, massue plus sombre.

Tête médiocre, subétranglée un peu après le bord postérieur des yeux, marquée sur le front d'une forte impression qui se continue sur le rostre; yeux grands et proéminents. Rostre presque carré, à courtes carènes figurant un X interrompu, à peine dilaté au sommet; scrobes assez larges, transversalement obliques, avancées sur la ligne médiane. Antennes épaisses; scape atteignant à peine le prothorax, arqué modérément au milieu, épaissi assez brusquement, pubescent; 2 premiers articles du funicule subégaux, (le 1^{er} peut-être un peu plus court), du double plus longs que larges, 3-4 subégaux, pas plus longs que larges, les autres plus larges que longs, tous de forme obconique, noueux au sommet; massue ovale-oblongue, un peu épaissie, du double plus longue que large, émoussée à la pointe. Prothorax un peu plus large que long, convexe au milieu, modérément arqué latéralement, un peu plus rétréci en avant, à bord antérieur déprimé; rugueusement ponctué. Elytres évidemment plus larges que le prothorax, du double plus longues que larges, subparallèles, curvilinéairement rétrécies vers

l'extrémité qui est brièvement acuminée, un peu sinuée en dehors et étroitement relevée; stries formées de gros points, plus larges et plus profonds en avant, d'où les intervalles plus convexes en cet endroit. Cuisses armées d'une très-petite dent presque obsolète. — Long, 4,5; — larg. 1,8 mill.

Cette espèce, voisine, pour la forme de la tête et la squamiosité, des exemplaires très-étroits du *P. vespertinus*, s'en distingue sans peine par ses poils hérissés.

Sicile : Messine. (Coll. Reiche.)

Je le dédie à notre savant collègue, dont les trésors entomologiques sont toujours si généreusement mis à la disposition de ceux qui veulent se livrer à l'étude de notre chère science.

f° *Tête non étranglée.* — Esp. 19.

49. TUBERCULIFER Chevrolat, Revue zool. Guer. 1865. 17.

Ovale-allongé (♀), oblong (♂), couvert de squamules arrondies, brillantes, vertes ou dorées avec toutes les nuances intermédiaires, un peu soulevées et laissant ainsi apercevoir le fond; une pubescence assez longue hérissée, brunâtre sur les élytres, plus claire, souvent blanchâtre, sur les parties antérieures, obsolète sur le milieu de la poitrine et l'abdomen; antennes et pattes testacées; cuisses souvent rembrunies.

Tête moyenne, un peu élargie en arrière; front plan, fovéolé; yeux grands et saillants. Rostre évidemment plus étroit que la tête, obsolètement bicaréné, subsillon-né; scrobes médiocres, obliquement subtransverses, assez éloignées. Antennes allongées, grêles; scape seul assez épaissi au sommet, mince à la base; 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux, 3 fois au moins plus longs que larges; 3^e guère plus long que la moitié du précédent; 4-7 plus brièvement obconiques, subégaux et un peu plus longs que larges, non arrondis au sommet, (7^e parfois plus grand); massue très-allongée, étroitement oblongue, rétrécie dans son dernier tiers. Prothorax un peu plus large que long, peu fortement, assez étroitement arrondi laté-

ralement, rétréci obliquement aux deux bouts; souvent une carène obsolète longitudinale. Ecusson subtriangulaire, à pointe émoussée, pubescent. Elytres évidemment plus larges que le prothorax, 2 fois et 1/2 plus longues que larges, plus souvent subovales, subacuminées ensemble au sommet; stries larges, peu nettes, (la ponctuation étant couverte par les squamules chez l'insecte frais); intervalles étroits et convexes. Cuisses antérieures seules notablement renflées, munies d'une dent courte, obtuse; postérieures à dent plus forte; tibiais sublinéaires, finement velus; ongles assez séparés, un peu divergents. Dessous d'un noir brillant profond, visiblement et d'ordinaire densément ponctué peu profondément, uni. — Long. 5-7; — larg. 4,8-2,2 mill.

♂ Plus étroit, à élytres subparallèles; antennes un peu plus longues; prothorax étroit, guère moins long que large; tibiais antérieurs anguleusement avancés à leur sommet interne.

♀ Plus large; antennes plus courtes, un peu plus épaisses; prothorax évidemment transversal; élytres rétrécies aux deux bouts; tibiais sans angle avancé.

Facile à distinguer des espèces voisines : *betulae*, *etruscus*, par la forme très-étroite de la massue des antennes et l'absence de carène sur le 2^e segment de l'abdomen du ♂.

Espagne (Escorial, Madrid), etc.

J'ai vu des types dans la collection de M. Chevrolat.

b' Une carène transversale très-visible sur le 2^e segment abdominal du ♂. -- Esp. 20-29.

c 2^e article du funicule du double à peine plus long que large; 6^e et 7^e aussi longs ou plus longs que larges. — Esp. 20-23.

20. ETRUSCUS Desbrochers des Loges nov. sp.

Espèce intermédiaire aux *P. betulae* et *tuberculifer*. Très-différente du premier par les élytres plus allongées, les cuisses bien moins renflées surtout chez la ♀ et à dents moins larges, la coloration des pattes, etc. Très-semblable

au second par la forme générale, les élytres de la ♀ un peu rétrécies en avant, et la coloration ; on l'en distinguera aux caractères suivants :

Dessus à pubescence souple, dressée, confuse, médiocrement longue, blanche, un peu plus longue vers le sommet des élytres où elle prend parfois une teinte rousâtre ; pattes et antennes d'un rouge ferrugineux uniforme.

Tête et rostre comme chez le *P. tuberculifer* ; yeux assez saillants. Antennes ciliées de poils blanchâtres ; scape assez épais ; 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e, celui-ci pas tout-à-fait du double plus long que large ; 4-7 arrondis, aussi larges que longs ; massue arrondie à la base, un peu épaisse, un peu plus de 2 fois plus longue que large. Prothorax assez court, impressionné en avant, et plus fortement rétréci (♂). Elytres subparallèles ♂ ♀ (faiblement atténuées vers la base (♀), presque planes sur le dos. Cuisses armées toutes d'une grande et large dent ; tibias assez longuement ciliés de poils blanchâtres. — Long. 5-6.5 ; — larg. 1,8-2 mill.

♂ Une large impression suivie d'une carène transversale subarquée en arrière, sur le 2^e segment abdominal.

♀ 2^e segment abdominal plan et uni.

Var. *Sinon*. Corps entièrement brun, complètement dépouillé de squamules ou n'offrant que quelques traces de poils squamiformes sur les flancs, mais à pubescence très-abondante.

Toscane, sur les chênes : (Coll. Danry, Gambey, Bellier de la Chavignerie, Ch. Brisout de Barneville, V. Kiesenweter, Perris, Reiche, Stierlin) ; Valachie, (coll. Kirsch) ; Antriche, (coll. Chevrolat) ; Naples, (coll. Emery).

21. *BETULÆ* Fabr. Syst. El. II 1801. p. 243, 216. — Gyll' in Sch. Cure. II p. 437, 29 ; VII, p. 32, 44. — *trivialis* Bohem. in Sch. Cure. 1843 VII p. 32. 43.

Oblong-subovale, large et assez court, noir ou brun, recouvert de squamules dorées, vertes, bleuâtres ou même grisâtres, plus petites sur les élytres, plus larges sur les bords du prothorax et les côtés de la poitrine, formant une tache sur les cuisses ; pubescence plus ou

moins longue, hérissée, confuse, grisâtre et souple, poils convergents parfois sur le milieu du prothorax qui, dans ce cas, est dénudé sur le disque : scape et pattes longuement, très-finement ciliés de poils blanchâtres ; antennes, base et extrémité des cuisses, tibias et tarses ferrugineux, souvent jaunâtres.

Tête élargie en arrière ; front déprimé, marqué d'une fossette. Yeux assez grands et saillants. Rostre évidemment plus étroit que la tête, subdéprimé, à peine dilaté au bout ; 2 carènes latérales en dessus ordinairement marquées, divergentes vers l'extrémité qui est déprimée ; un sillon au milieu ; scrobes obliquement transversales peu rapprochées. Antennes assez fortes, assez allongées, scape atteignant le bord antérieur du prothorax ; 3 premiers articles du funicule décroissant successivement en longueur ; 4-7 subégaux, plus brièvement obconiques, arrondis au sommet, au moins aussi longs que larges ; massue épaissie, oblongue-ovale, du double au moins plus longue que large. Prothorax court, convexe, très-arrondi latéralement, subdéprimé en avant et en arrière, plus rétréci au sommet. Ecusson suboblong, squameux. Elytres convexes, du double seulement plus longues que larges, subparallèles dans leurs 2 premiers tiers, arcuément rétrécies ensuite ou subatténuées dès la base, obtuses au bout, légèrement relevées ; stries presque superficielles chez le type, à ponctuation distincte ; intervalles plans. Cuisses munies d'une grande et large dent plus rectangulaire aux postérieures ; tarses et tibias larges, ceux-ci bisinueux intérieurement. Ongles un peu divergents. Dessous dépourvu de squamules sur le milieu de la poitrine et surtout l'abdomen, d'un noir profond, très-obsolètement rugueux sans points distincts. — Long. 3,5-6 ; — larg. 1,3-2,3 mill.

♂ Scape très-épais ; toutes les cuisses fortement renflées ; une carène subarquée sur le 2^e segment abdominal.

♀ Scape médiocre ; cuisses moins renflées, les antérieures seules d'une manière notable, pas de carène sur le 2^e segment abdominal.

Var. *aurifer*. Bohem. Sch. Cure. VII 1843, p. 29, 38. — *nobilis* (Dahl*), mus. V. Heyden.

Elytres dépourvues ou presque dépourvues de squamules, mais conservant toute leur pubescence, le plus souvent brunâtres; une tache latérale au prothorax, une autre avant le sommet des cuisses, et côtés de la poitrine seuls squameux; massue des antennes le plus souvent noire.

Beaucoup plus rare que le type, d'un habitat aussi étendu.

Le *P. trivialis* dont j'ai vu 2 types du Caucase dans la collection de M. Chevrolat n'est qu'une variation moins foncée dans toutes ses parties, à prothorax plus étroit et qu'on rencontre un peu partout.

Cette espèce est des plus variables; la largeur relative de la tête, des élytres, du prothorax, du rostre, la dilatation plus ou moins forte de celui-ci au sommet, la largeur des scrobes et même leur direction: (elles semblent parfois presque latérales), l'épaisseur de la massue des antennes, la longueur et la coloration de la pubescence, etc., n'ont rien de bien constant. Ces divers caractères se combinent de telle manière qu'il est impossible de s'en servir pour limiter 2 espèces distinctes. Le *P. betule* se reconnaîtra toujours à la conformation de ses antennes, à ses grosses cuisses armées d'une très-grande dent, toujours noires au milieu, à la largeur et à la coloration des tibias.

Toute l'Europe.

22. LATERALIS Reiche Soc. Ent. Fr. 1857. 682, 217 (♀). — *sma-ragdifer* Kiesenw. Berl. 1864. 272 (♂).

Je sépare, avec doute, de l'espèce précédente plusieurs exemplaires, tous de Grèce et qui semblent différer, au premier abord, de la var. *aurifer* par les caractères suivants:

Forme plus étroite et généralement plus allongée; d'un noir profond assez brillant; scape à l'extrémité et massue des antennes noirs ou noirâtres; pattes entièrement noires, les tarses parfois brunâtres. — Long. 3,5-4,5; — larg. 1,2-1,5 mill.

Var. A. Bords latéraux du prothorax, hanches anté-

rieures, flanes thoraciques, une tache avant le sommet des cuisses et une bande longitudinale interrompue formées de taches irrégulières près de la marge latérale des élytres à squamules métalliques bleues ou bleu-verdâtre. Cette coloration est celle des 2 types communiqués par MM. Reiche et V. Kiesenwetter; le 1^{er} a les dents des pattes assez obtuses, la forme un peu élargie en arrière; le 2^e a ces mêmes dents très-fortes, très-aiguës à la pointe, la taille très-petite et la forme plus étroite que chez les les petits exemplaires ♂ du *P. betule*.

Var. B. Pas de squamules sur les élytres; taches du prothorax et des cuisses très-réduites; flanes densément squameux.

23. BRACHICORNIS Desbrochers des Loges nov. sp.

Encore une espèce très-voisine du *P. betule*. Sans parler de la coloration très-différente des squamules, qui pourrait bien n'être qu'accidentelle, elle s'en distingue par les caractères suivants :

Beaucoup plus large chez la ♀ que chez le ♂. Noir, à l'exception des antennes, des tibias et des tarses qui sont d'un ferrugineux uniforme; pubescence dressée blanche, plus fine, assez abondante sur l'abdomen.

Tête et rostre plus courts, tout en étant plus étroits; front visiblement impressionné sans point enfoncé distinct. Antennes très-courtes, le scape restant à une distance notable du bord antérieur du prothorax et la massue n'atteignant pas tout-à-fait la base de ce segment; scape peu épaissi, assez mince à la base; 2 1^{ers} articles du funicule à peine du double plus longs que larges; 4-7 arrondis au sommet au moins aussi larges que longs; massue évidemment arrondie à la base, peu allongée. Prothorax largement dénudé au milieu; squamules d'un bleu clair, assez larges, formant une bande de chaque côté. Elytres parcimonieusement ornées de squamules de même couleur, mais très-petites. En-dessous, des squamules argentées couvrent les côtés du mésothorax et forment une tache sur les cuisses avant leur sommet. — Long. 3,5-5; larg. 1,3-2 mill.

Autriche. (Coll. Marquet.)

c' 2^e article du funicule du triple environ plus long que large; 6^e et 7^e aussi longs ou plus longs que larges. (Chez le *P. contemptus* à peine aussi longs que larges, mais non visiblement transversaux.) — Esp. 24-28.

24. CONTEMPTUS Steven*, Mus. Mosq. 1829. p. 95. — Gyll. in Sch. II, p. 447, 17; VII p. 26, 28 (♀). — *valgus* Gyll.* in Sch. Curc. 1834. II p. 442, 10. (♂) — *deitritus* Gyl. Sch. 1843. VII p. 17, 13.

♂ Oblong, convexe, noir ou brun avec les pattes et les antennes d'un rouge ferrugineux (parfois l'extrémité du scape, la massue et les cuisses noirâtres), à pubescence couchée squamiforme grisâtre ou verdâtre, parfois un peu brillante, entremêlée de quelques points noirâtres obsolètes sur les élytres, ne couvrant que les bords latéraux du prothorax, moins dense en dessous; en outre, sur tout le dessus, des cils assez nombreux, bruns, assez longs, dressés.

Tête carrée, fortement impressionnée sur le front qui est large et marqué d'une fossette variable; yeux petits, médiocrement saillants. Rostre à peine plus étroit que la tête, assez long, comprimé latéralement au-dessous des yeux, un peu gibbeux, obsolètement bicaréné, un tant soit peu atténué, obliquement aplati vers le sommet qui est rougeâtre; scrobes assez grandes, transverses, mais ne dépassant pas les crêtes latérales. Antennes épaisses, peu pubescentes; scape épaissi de la base au sommet, peu courbé; 1^{er} et 2^e articles du funicule subégaux, près de 3 fois aussi longs que larges; 3-7 à peu de chose près égaux, les derniers à peine plus longs que larges, un peu arrondis au sommet; massue à peine épaissie, subfusiforme, 3 fois environ aussi longue que large. Prothorax transversal, fortement arrondi latéralement, étroitement étranglé en avant; au milieu une ligne très-obsolète formée par la pubescence. Ecusson court, en demi-cercle. Elytres courtes, guère plus larges que le prothorax dans son milieu, parallèles jusqu'au milieu, curvilinéairement rétrécies ensuite, subarrondies ensemble au sommet; épaules élevées; stries paraissant larges et fortement ponctuées, cachées par la pubescence. Pattes épaisses, assez pubescentes,

cuissees très-grosses, surtout les antérieures, armées d'une forte et large dent; ongles à pointes un tant soit peu divergentes; une carène sur le 2^e segment abdominal. — Long. 5-7; — larg. 1,6-2 mill.

♀ Rostre plus court; antennes plus courtes dans toutes leurs parties; prothorax plus étroit que les élytres, étant moins fortement et moins largement arrondi latéralement; élytres plus longues, évidemment élargies en arrière, obliquement atténuées; pattes et dents moins fortes; pas de carène distincte sur le 2^e segment abdominal.

Bien reconnaissable à sa vestiture particulière.

Caucase, Crimée, (coll. Schœnherr); Russie méridionale, Perm, bords du fleuve Oural, (coll. V. Kiesenwetter, Kirsch).

25. FULVIPILIS Desbrochers des Loges. nov. sp. (♀).

Cette espèce est colorée comme les exemplaires à teinte un peu jaunâtre du *P. viridans*, var. sa pubescence dressée est celle du *P. squamosus*, même un peu plus longue; mais les yeux sont très-saillants et la tête n'est pas rétrécie en arrière. Par les grandes dents de ses cuisses, elle se rapproche davantage du *P. etruscus* ♀; elle s'en distinguera aux caractères suivants:

Densément recouvert de squamules d'un vert clair brillant, nullement mélangé, sur tout le dessus, et ne ménageant, en dessous, que les derniers segments abdominaux; pubescence hérissée beaucoup plus longue et jaunâtre, plus sérialement disposée.

Tête marquée en arrière des yeux d'une fossette allongée qui se prolonge en sillon jusqu'à l'extrémité du rostre. Yeux bien plus grands et plus proéminents. Scrobes plus avancées en dedans. Antennes plus longues, surtout le scape qui est pubescent mais non distinctement cilié; 2 premiers articles du funicule subgêaux, trois fois plus longs que larges, 3^e beaucoup plus court que le précédent, les autres à peu près comme chez le *P. etruscus*; massue oblongue, très-allongée. Prothorax caréné longitudinalement. Elytres visiblement plus longues, nullement élargies en arrière, sans rebord au sommet. Pattes plus larges (surtout les tibias qui sont très-briè-

vement ciliés), d'un testacé clair de même que les antennes ; cuisses parcimonieusement squameuses, armées toutes d'une forte dent à pointe plus aiguë, plus grande aux postérieures. — Long. 6 ; — larg. 2 mill.

Var. *Emeryi*. J'ai reçu tout récemment de MM. Emery un *Phyllobius* trouvé par eux dans les environs de Naples et qu'on pourrait prendre à première vue pour une espèce distincte de celle-ci ; mais les principaux caractères étant identiques, je crois devoir attribuer le manque de pubescence sur les antennes, les pattes et la tête, et la rareté des poils dressés ça et là sur les élytres à un défaut de fraîcheur ; le ♂, à prothorax plus arrondi, n'a pas de carène visible sur le deuxième segment abdominal.

Italie, ma collection.

26. ARGENTATUS Lin. Faun. Suec. 1735 n° 624. — Gyll. Ins. Suec. in, p. 324, 47. — in Sch. Curc. n, p. 446, 15. — VII, p. 20, 21.

Oblong, assez allongé, mat ou brillant, recouvert de squamules arrondies vertes, bleues ou grisâtres ; antennes et pattes brunes ou d'un ferrugineux foncé avec les tarses plus clairs ; cuisses squameuses, à pubescence blanchâtre, demi-dressée, très-courte sur la tête et le prothorax, un peu plus longue sur les élytres.

Tête avancée, convexe, un étroit sillon sur le front, parfois presque nul, d'autres fois prolongé ; yeux grands, à saillie presque nulle. Rostre long, très-épais, peu distinct de la tête et formant avec elle un cône allongé ; subcylindrique, à sillon médian variable ; scrobes arquées transversalement, se rejoignant presque sur la ligne médiane, ouvertes. Antennes allongées, très-finement velues ; 1^{er} article du funicule tantôt presque égal au 2^e, tantôt beaucoup plus court, 3^e de la moitié du précédent, environ ; 4-7 obconiques, un peu plus longs que larges ; massue concolore très-allongée, subfusiforme. Prothorax transversal, arrondi latéralement, convexe au milieu, déprimé transversalement et comme rebordé en avant et en arrière. Ecusson plus ou moins arrondi au sommet. Elytres quatre fois aussi longues que le prothorax, à épaules marquées ; brièvement rebordées et redressées, séparément acuminées au sommet ; stries fines, peu profondes, peu distinc-

tement ponctuées à cause de la densité des squamules; intervalles plans. Cuisses à dent aiguë assez étroite; ongles médiocrement écartés. — Long. 4,5-6,5; — larg. 1,5-2 mill.

♂ Scape épais sur une plus grande étendue; rostre à côtés subparallèles; prothorax bien plus large que la tête, plus largement dilaté latéralement; élytres parallèles jusqu'aux $2/3$; cuisses fortement renflées; un pli transversal sur le 2^e segment abdominal.

♀ Scape mince à la base, brusquement renflé; rostre atténué, plus court; prothorax un peu arrondi seulement dans son milieu, à peine plus large que la tête; élytres faiblement élargies en arrière, rétrécies un peu après la 1^{re} moitié; cuisses médiocrement claviformes; pas de pli sur le 2^e segment abdominal.

Var. ♀ *viridans* (Waltl*) Bohem. Sch. Curc. 1849. vii, p. 22, 24. Cette variété, dont j'ai vu 2 types de Waltl dans la collection de M. Von Heyden et un troisième dans celle de Schöenherr, diffère du type par la taille un peu plus petite, les élytres un peu plus courtes et surtout par les antennes et les pattes d'un testacé pâle, ces dernières à cuisses parcimonieusement squameuses et seulement à la base.

Var. *tereticollis* (♀) Gyll.* Sch. Curc. ii, 1834. p. 457, 30. Même coloration des pattes et des antennes que chez le *viridans*. L'exemplaire typique que j'ai sous les yeux n'en diffère que par sa taille encore plus petite et son prothorax étroit, non sensiblement arrondi latéralement.

Toute l'Europe. Daourie, (M. Lethierry); Algérie, (M. Jekel).

Se distingue de toutes les espèces vertes, à la forme de la tête et du rostre qui sont presque de même épaisseur, et au peu de saillie des yeux.

27. LONGIPILIS Bohem.* in Sch. Curc. vii, 1843. p. 15, 9.

Oblong, recouvert de squamules d'un vert brillant; antennes et pattes d'un rouge testacé luisant; pubescence tout-à-fait hérissée blanche ou cendrée, plus courte sur les parties antérieures, longue et généralement peu épaisse sur les élytres.

Tête au moins aussi longue que large; front déprimé et sillonné. Yeux médiocres, semi-globuleux. Rostre peu allongé, guère plus étroit que la tête, sillonné, non dilaté au sommet, (♂ ♀); scrobes médiocres, arquées transversalement, surmontées d'une crête à leur bord interne. Antennes longues, pubescentes, peu épaisses, à l'exception du scape qui est courbé dans son 1^{er} tiers, finement ciliées; 2 premiers articles du funicule égaux, du triple au moins plus longs que larges; 3^e un peu plus de la moitié du précédent, subégal au 4^e; les autres un peu plus longs que larges; massue oblongue, allongée, peu épaissie. Prothorax évidemment transversal, arqué latéralement, plus fortement (♂), souvent caréné brièvement en avant, comprimé et comme rebordé antérieurement à la base. Ecusson oblong. Elytres pas beaucoup plus larges que le prothorax chez le ♂, 4 fois environ plus longues que lui, subparallèles (♀), ou un peu atténuées dès la base (♂), à épaules élevées mais émoussées; stries marquées, à ponctuation assez régulière; intervalles subconvexes par place. Cuisses très-épaissies surtout inférieurement (celles des 2 paires postérieures beaucoup moins (♀)); armées toutes d'une forte dent terminée en pointe aiguë; tibias antérieurs larges, légèrement subanguleux dans leur milieu interne, dilatés au sommet; ceux des 2 autres paires assez notablement contournés en S. Ongles assez écartés. — Long. 3-6; — larg. 2 mill.

♂ Une carène transversale subarquée sur le 2^e segment abdominal.

♀ 2^e segment abdominal dépourvu de carène.

Sicile. (Coll. Chevrolat où figure un type de Boheman, Ch. Brisout, de Barneville, Reiche.)

28. BREVIATUS Desbrochers des Loges, nov. sp.

Extrêmement voisin du précédent, coloré de même, cuisses légèrement squameuses, pattes et antennes plus claires; d'un tiers plus courtes.

Tête à peine aussi longue que large, un peu élargie à la base; front impressionné, à fossette oblongue, courte ou peu visible; yeux grands, peu saillants, paraissant oblongs vus de face. Rostre moins épais, un peu dilaté

au bout (♂); non ou très-obsolètement sillonné et caréné; scrobes obliques plus rapprochées en dedans que chez le *P. longipilis*; très-larges ♀. Antennes d'un tiers plus courtes, assez fortes, mais d'épaisseur assez variable, visiblement pubescentes; 2 1^{ers} articles du funicule égaux, un peu moins de 3 fois aussi longs que larges; 3^e de moitié plus court que le 2^e, visiblement plus long que le 4^e (♂ ♀), les derniers à peu près aussi larges que longs, moins étroits que chez le précédent; massue subfusiforme. Prothorax fortement dilaté-arrondi et très-convexe latéralement, (♂) modérément ou faiblement, ce qui le fait paraître bien moins transversal et plus étroit comparativement aux élytres, (♀); largement et plus ou moins fortement impressionné en avant, étroitement rebordé en arrière de l'écusson. Elytres subparallèles dans leurs 2 1^{ers} tiers, brièvement atténuées ensuite, à pubescence blanche généralement pas très-longue (analogue à celle du *P. argentatus*) et visiblement abaissée. Cuisses du ♂ moins grosses que chez le *P. longipilis* ♂, celles de la ♀ peu épaissies et munies d'une dent assez courte; tibias élargis de la base au sommet sans sinuosités prononcées. — Long. 4-5; — larg. 1,5-1,8 mill.

♂ Une carène transversale sur le 2^e segment abdominal.

♀ Pas de carène sur le 2^e segment abdominal.

J'ai vu une dizaine d'exemplaires de cette espèce qui me paraît varier d'une manière sensible pour la largeur du corps, l'épaisseur des antennes et des tibias, la largeur et la dilatation du prothorax. On la distinguera toujours du *P. longipilis* à sa pubescence plus courte et couchée, à la grosseur des yeux, à la brièveté relative des divers articles du funicule dont le 3^e est, en outre, évidemment plus long que le 4^e, à la forme à peine atténuée du ♂, et à celle des tibias qui sont ici non ou à peine sinueux, tandis qu'ils sont tous visiblement contournés chez l'espèce précédente.

Grèce, Autriche, Turquie, Anatolie. (Coll. de Bonvouloir, Jekel, Kirsch, E. Deyrolle, la mienne.)

c" 2^e article du funicule du double environ plus long que large; 6 et 7 manifestement transversaux. — Esp. 29.

29. PARVICEPS Desbrochers des Loges, nov. sp.

Oblong, assez court, parsemé de squamules allongées dorées, mêlées à une pubescence subsquamiforme blanchâtre et diffuse; une pubescence hérissée confuse brunâtre, aussi longue sur la tête et le prothorax, souvent recourbée sur les élytres; pattes et antennes d'un rouge ferrugineux.

Tête étroite, convexe, inégalement ponctuée à la base, très-légèrement déprimée sur le front. Yeux médiocres assez saillants, surtout ♂. Rostre visiblement plus étroit que la tête, allongé, subconvexe en dessus, largement déprimé au devant des scrobes qui sont arquées transversalement et rapprochées. Antennes courtes, épaisses, à cils dressés même sur le scape qui est fortement épaissi; 2 1^{ers} articles du funicule subégaux, du double au moins plus longs que larges; 3^e de moitié plus court; 4-7 plus ou moins arrondis et transversaux; massue assez épaisse, oblongue, souvent noirâtre. Prothorax presque du double plus large que la tête, très-fortement arrondi latéralement, plus transversal ♂, bombé sur le disque, très-brièvement resserré au sommet, à ponctuation assez forte, serrée; une carène obsolète longitudinale. Ecusson oblong. Elytres convexes, parallèles dans leurs 2 1^{ers} tiers, brièvement atténuées ensuite, redressées au sommet, stries larges, très-profondes, formées de gros points carrés; intervalles étroits et très-convexes dans la première moitié basilaire, suture élevée. Pattes poilues; cuisses antérieures très-grosses, toutes armées d'une courte dent; tibias larges, dilatés au sommet, tarses épais. Ongles très-peu déliés. — Long. 3,6-3; larg. 1,5-1,6 mill.

♂ Une carène sur le 2^e segment abdominal.

♀ Pas de carène sur le 2^e segment abdominal.

La forme brièvement cylindrique de cette espèce, celle de son prothorax, les stries profondes de ses élytres et sa pubescence particulière la distinguent aisément.

Turquie, Asie mineure. (Coll. de Bonvouloir, Kirsch, de Marseul, v. Kiesenwetter.)

A" Une dent triangulaire bien visible aux cuisses postérieures, les autres inermes; pas de poils relevés. — Esp. 30-31.

30. SERRIPES Desbrochers des Loges nov. sp.

Oblong, peu allongé, densément recouvert d'une couche compacte de squamosité d'un vert blanchâtre mat, même sur l'abdomen; pattes (au moins une partie des tibias et tarses) et antennes ferrugineuses.

Tête courte, subconique, exactement de l'épaisseur du prothorax à la base; front largement impressionné, fovéolé. Yeux très-petits, un peu saillants, leur saillie moins avancée que les bords de la tête vers la base. Rostre large, extrêmement court, aussi épais que large, subatténué, anguleusement courbé, très-gibbeux, subsillonné; serobes grandes, très-avancées sur la ligne médiane, d'où les antennes très-rapprochées. Antennes médiocrement longues, très-pubescentes même sur le scape; scape assez épais, fortement courbé dans sa première moitié; 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e, 4^e au moins aussi long que le 3^e, tous obconiques, les derniers à peu près aussi longs que larges; massue peu épaissie, subovale, de moitié plus longue que large. Prothorax presque aussi long que large, non ou à peine plus rétréci en avant qu'en arrière et faiblement déprimé avant le sommet, un peu arrondi latéralement, subcaréné. Ecusson élargi à la base, arrondi au sommet. Elytres subparallèles dans leurs 2 1^{ers} tiers, obliquement atténuées de ce point à l'extrémité où elles sont visiblement acuminées, à peine sinuées en dehors, un peu relevées séparément et légèrement velues; suture élevée surtout en arrière; stries étroites mais nettes, assez profondes; intervalles subconvexes. Cuisses postérieures armées d'une assez grande dent subrectangulaire, les autres inermes; tibias des 2 paires antérieures munis d'une rangée régulière de petites dents plantées verticalement et très-distinctes le long de leur tranche interne. Ongles assez dégagés. — Long. 4; — larg. 1,6 mill.

Grèce. (M. V. Kiesenwetter.)

Resssemble de prime-abord au *P. pomonæ*. La dent des

cuisse postérieure et les dentelures des tibias suffisent pour le distinguer de toutes les autres espèces.

31. PICTUS Steven* Mus. Mosq. n 1829 p. 95. (*Phyllerastes*). — Gyll. in Sch. Curc. n 1834. p. 456, 28. — Bohem. in Sch. VII p. 31, 42. — *pallipes* Gyll*. in Sch. Curc. n 1834, p. 450, 19. — *varius* Brul. Exp. Morée 1832, p. 238.

Oblong, brun de poix, couvert en dessus de petits poils squamiformes de la couleur du fond, paré en outre, de chaque côté du prothorax, d'une large bande, sur les élytres de plusieurs bandes irrégulières ondulées, formées de squamules arrondies blanchâtres, à reflet argenté; dessous pubescent sur l'abdomen qui est d'un noir brillant, très-parcimonieusement squameux sur les autres parties; pas de poils dressés; antennes et pattes ferrugineuses, cuisses souvent brunes.

Tête courte, front largement impressionné et fovéolé. Yeux médiocres, très-peu proéminents. Rostre très-court, plus étroit que la tête, un peu gibbeux vu de profil, ordinairement sillonné, à côtés subparallèles, rougeâtre et muni de quelques poils au sommet; scrobes grandes, transverses, très-rapprochées, peu distantes des yeux. Antennes courtes; scape fortement arqué, le reste (y compris la massue), formant une tige d'égal diamètre; 2^{1ers} articles du funicule subégaux, obconiques, plus courts que le double de leur largeur; 3-4 aussi longs que larges, 5-7 arrondis subtransversalement; massue presque ovulaire, un peu arrondie à la base. Prothorax subtransversal, faiblement arrondi latéralement un peu en arrière, légèrement resserré au sommet, à peine convexe, plus pubescent sur la ligne médiane. Ecusson arrondi au sommet, ordinairement blanc-squameux. Elytres 2 fois 1/2 plus longues que larges, un peu échancrées à la base, subparallèles dans leurs 2 1^{ers} tiers, obliquement atténuées ensuite et terminées en pointe très-aiguë un peu avancée; stries profondes, intervalles assez larges, subconvexes; cuisses ordinairement tachées de gris avant leur sommet, les postérieures armées d'une dent assez forte triangulaire, les autres inermes; tibias sublinéaires; ongles écartés. — Long. 4,5; — larg. 1-6 mill.

♂ Plus étroit dans toutes ses parties; massue des antennes du double plus longue que large; prothorax subcylindrique.

♀ Plus large; massue allongée près de 3 fois aussi longue que large; prothorax évidemment arrondi dans ses $\frac{2}{3}$ postérieurs.

Var. B. Entièrement ferrugineux, taché comme chez le type (*pallipes* Gyll.*).

Grèce, Crimée, Turquie (Constantinople). Asie-Mineure.

A''' *Toutes les cuisses dentées, généralement peu renflées et munies d'une dent médiocre ou petite; pas de poils dressés.* — Esp. 32-47.

a *Scrobes latérales ou sublatérales, longitudinales; rostre assez large subdéprimé en dessus (abstraction faite des impressions), ce qui donne à ces organes une assez grande ressemblance avec ceux des METALLITES. Forme oblongue ou oblongue-ovale.* — Esp. 32-36. (Sous-genre *PLAGIUS* : πλάγιος; latéralement).

b *Dessus recouvert d'une pubescence grisâtre, sans poils dressés.* — Esp. 33-34.

32. MACULIFER Desbrochers des Loges, nov. sp.

Subovale, assez allongé, brun (au moins chez l'exemplaire que j'ai sous les yeux), couvert de squamules cendrées plus condensées sur les côtés du prothorax, sans pubescence visible en dessus; quelques taches brunâtres disposées longitudinalement le long des intervalles des élytres; antennes et pattes ferrugineuses.

Tête plus étroite que le prothorax, faiblement élargie en arrière, front à peine impressionné entre les yeux. Yeux légèrement saillants en dessus, moins avancés latéralement que les côtés de la tête à la base. Rostre carré, ses côtés à peine curvilignes, une large impression au milieu. Scrobes courtes, obliquant un peu en dedans, visibles en dessus, mais ne dépassant pas le bord interne des yeux. Antennes peu épaisses, parcimonieusement pubescentes, à sommet du scape et massue rembrunis; scape arqué, peu épaissi, dépassant le bord antérieur du prothorax; funicule à deux premiers articles allongés, du double

aussi longs que larges, subégaux, le premier un peu dilaté vers le sommet, 3-4 en carré à peine plus long que large, 5-7 faiblement arrondis, très-courts; massue oblongue, étroite. Prothorax court, peu convexe, peu arqué latéralement, subétranglé en avant, une carène obsolette longitudinale au milieu. Ecusson petit, subtriangulaire. Elytres une fois plus longues que larges, peu bombées, à peine arquées dans leurs deux tiers antérieurs, à épaules élevées, arrondies, obtusément acuminées, à bord apical un peu relevé; stries étroites, distinctement ponctuées, les externes plus distinctement sillonnées. Pattes à cuisses médiocres, toutes munies d'une dent très-courte, bien visible; tibias sublinéaires; tarses déliés. Abdomen à premier segment impressionné, avec une sorte de carène irrégulière, transverse au milieu. (Peut-être ce caractère est-il purement individuel, l'exemplaire que j'ai sous les yeux étant un peu jeune.)

Voisin du *P. incanus*, il en diffère par ses élytres marquetées, ses antennes relativement minces, à 2^e article du funicule aussi long que le 1^{er}, par ses yeux peu proéminents, son prothorax à peine dilaté latéralement, la dent très-faible des cuisses, etc.

Autriche. Un seul exemplaire que M. Chevrolat a bien voulu me céder.

33. MONTANUS Miller' Wien. Monats. 1862. 351. — Abeille 1 1833.
xvi. — *tesselatus* V. Heyden in museo

Oblong ou ovale selon les sexes, brun de poix, mat, revêtu en dessus de très-petites squamules cendrées, manquant souvent par places sur les élytres qui sont ainsi tachées de brun et de gris, une bordure latérale au prothorax et une tache à l'extrémité des cuisses de cette dernière couleur; antennes, tibias et tarses d'un rouge ferrugineux foncé.

Tête élargie à la base, front déprimé et marqué d'un petit trait. Yeux médiocres, saillants. Rostre bien plus étroit que la tête, aussi long que large, à côtés subparallèles, un peu gibbeux, non sillonné; scrobes peu larges, longitudinales. Antennes médiocres; scape à peine courbé, noirâtre au bout; 3^e article du funicule un peu plus

long que la moitié du précédent ; massue oblongue, deux fois et demie aussi longue que large, peu épaisse, souvent noirâtre. Prothorax presque aussi long que large, arrondi au milieu seulement, parfois subanguleusement, rétréci aux deux bouts, plus brièvement et sinueusement en avant, plus ou moins convexe, à bords antérieur et postérieur légèrement impressionnés, peu squameux sur le disque. Ecusson brièvement triangulaire, nullement saillant ce qui le rend peu visible. Elytres à épaules arrondies, à peine sinuées extérieurement, acuminées ensemble au sommet où l'on remarque (en examinant l'insecte en travers), le long de la suture, quelques poils extrêmement courts ; stries bien marquées, assez profondes ; intervalles légèrement convexes, surtout à la base, assez larges. Cuisses armées toutes d'une dent assez forte, aiguë, les antérieures fortement renflées ; tibias légèrement bisinués en dedans. — Long. 4-5,5 ; — larg. 2-2,5 mill.

♂ Forme plus étroite, élytres presque parallèles ; 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e, les derniers arrondis.

♀ Plus large, élytres assez fortement arquées latéralement dès la base ; 1^{er} article du funicule égal au 2^e, les derniers brièvement obconiques.

Grèce.

34. INCANUS Gyll. in Sch. Curc. 1834 II p. 455. 27. — *ruficornis* Redt. Fn. Austr. 1819, 432.

Oblong (♂), ovale (♀), brun, uniformément recouvert, (sauf l'abdomen qui est parcimonieusement pubescent), de très-petites squamules subarrondies, d'un gris souvent teinté de roussâtre ; sans poils dressés ; antennes et pattes ferrugineuses, cuisses souvent rembrunies.

Tête médiocre, presque carrée ; front subdéprimé, marqué d'une fossette. Yeux petits, assez saillants en avant. Rostre aussi large que long, bien plus étroit que la tête, gibbeux et brusquement abaissé, vu de profil, échancré en triangle ; scrobes peu larges, restant latérales, longitudinales. Antennes peu allongées, assez épaisses ; scape arqué dans sa première moitié basilaire, atteignant à peine le prothorax ; 2 1^{ers} articles seuls du

funicule allongés, celui-là plus long, du double environ plus long que large; 3^e aussi long que large, 4-7 serrés, un peu plus larges que longs, presque carrés; massue oblongue, un peu épaissie, du double plus longue que large. Prothorax subtransversal, peu convexe, modérément arqué latéralement, un peu plus rétréci en avant et déprimé sans rebord avant le sommet. Ecusson triangulaire ou suboblong, enfoncé. Elytres du double à peine plus longues que larges, presque du double plus larges que le prothorax à la base, à épaules arrondies, convexes sur le dos, obliquement acuminées ensemble, non visiblement relevées à la pointe extrême; stries plus larges mais bien nettes, intervalles assez plans, assez larges. Cuisses modérément renflées, à toutes une dent courte mais très-visible; tibias étroits; ongles très-peu séparés. — Long. 4-5; — larg. 1,5-2 mill.

♂ Etroit, à élytres parallèles; tibias antérieurs légèrement bisinueux en dedans, droits sur leur tranche externe.

♀ Ovale, à élytres notablement arquées latéralement et élargies en arrière; tibias antérieurs faiblement arqués en dedans.

Ressemble un peu à certaines variétés de petite taille du *Metallites atomarius*; la conformation des antennes et la squamosité uniforme du dessus le distinguent facilement du *P. montanus*.

Antriche; Grèce.

b' *Dessus à pubescence demi-couchée ou relevée ne cachant pas la couleur du fond.* — Esp. 33-36.

35. OBLONGUS Linné Faun. Suec. 1735. n° 625. — Gyll. Ins. Suec. m, p. 334. n° 53. — Gyll. in Sch. Curc. n° p. 448, 18, etc.

Oblong, allongé, luisant, ordinairement noir avec les élytres brunes, les pattes et les antennes testacées, mais passant par toutes les nuances du noir au testacé jaune-pâle; à pubescence du dessus grisâtre, peu touffue, demi-relevée.

Tête un peu élargie en arrière, marquée d'une fossette profonde en arrière des yeux; ponctuation assez grossière,

peu serrée s'étendant sur le rostre. Yeux grands, saillants, plus avancés latéralement que la plus grande largeur de la tête. Rostre bien plus étroit que la tête, largement sillonné, rougeâtre au bout; serres longitudinales remontant presque jusqu'aux yeux. Antennes longues, très-grêles; scape peu épaissi, coudé au milieu; 2^{1ers} articles du funicule subégaux, 3 ou 4 fois aussi longs que larges, 3-7 brièvement obconiques, à peine un peu plus longs que larges, plus courts que la moitié du 3^e; massue oblongue, peu distinctement séparée du funicule, très-peu épaissie, 4 fois au moins aussi longue que large. Prothorax sub-transversal à gros points profonds assez écartés, ménageant souvent une ligne lisse longitudinale. Ecusson triangulaire, pointillé. Elytres du double plus larges que le prothorax, 4 ou 5 fois plus longues, séparément arrondies au sommet; stries formées de gros points ronds, plus profondes à la base, d'où les intervalles convexes en cet endroit, ces intervalles un peu inégaux. Pattes allongées; cuisses peu claviformes, les antérieures un peu plus, les postérieures armées d'une dent sensiblement plus forte; tibias étroits; tarses allongés. Abdomen parcimonieusement pubescent. — Long. 4-5; — larg. 1,5-2,5 mill.

♂ Plus étroit, à élytres subparallèles; rostre au moins aussi long que large, un peu élargi au sommet; prothorax distinctement arqué latéralement; tibias antérieurs recourbés en dedans.

♀ Plus large, élytres un peu élargies en arrière; rostre subatténué, à peine aussi long que large, prothorax non sensiblement arrondi, presque conique; tibias antérieurs presque droits.

Toute l'Europe. Algérie.

36. STIERLINENSIS Desbrochers des Loges nov. sp. (*Stierlini* olim.

Subovale, d'un brun de poix, avec les pattes un peu moins foncées et les antennes jaunâtres. En dessus une fine pubescence rare, dressée, grisâtre.

Tête aussi large que le prothorax, finement ponctué; front obsolètement fovéolé, brusquement impressionné. Yeux un peu saillants à leur partie supérieure, leur sail-

lie latérale ne dépassant pas sensiblement le niveau de la plus grande largeur de la tête. Rostre court, épais, guère moins large que la tête, inégal à cause des impressions obliques du sommet et d'un sillon profond médian, un peu dilaté au bout; scrobes sublatérales. Antennes assez minces (sauf le scape qui est assez brusquement épaissi et arqué et n'atteint pas le prothorax); 1^{er} article du funicule un peu plus épais et un peu plus long que le 2^e, du double à peine plus long que large; 3-4 à peine plus longs que la moitié du 2^e, les derniers arrondis sub-transversalement; massue un peu épaissie, assez courte, légèrement arrondie à la base. Prothorax subcylindrique, aussi long que large, impressionné en avant, à ponctuation assez forte, assez serrée. Ecusson semi-ogival. Elytres obliquement élargies jusqu'au milieu, rétrécies en courbe de ce point au sommet; stries assez larges, régulières, formées de gros points assez rapprochés; intervalles sub-convexes. Pattes assez grêles; cuisses peu renflées à dent obsolète; tibias sublinéaires, les antérieurs un peu avancés à leur extrémité interne. — Long. 4; — larg. 1,5 mill. environ.

Autriche. Un seul exemplaire communiqué par M. Stierlin.

Cette espèce voisine des individus de petite taille et un peu courts du *P. oblongus*, s'en distingue bien par la largeur de la tête, les yeux peu avancés latéralement, la brièveté du rostre, la conformation et la brièveté relative des antennes.

b'' Dessus glabre ou à peu près; quelques squamules seulement sur les bords du prothorax et des élytres. —
Esp. 37.

37. FEMORALIS Bohem. in Sch. Curc. vii. 1843. p. 36, 55.

Ovale d'un brun foncé luisant, antennes, tibias et tarses d'un ferrugineux jaunâtre; quelques squamules linéaires piliformes d'un blanc argenté sur les bords du prothorax et en dessous, plus rarement sur les bords des élytres, plus larges sur les flancs; en outre, lorsque l'insecte est frais, une pubescence très-courte dressée en dessus.

Tête courte; front impressionné marqué d'une très-petite fossette. Yeux assez petits, saillants. Rostre court, fortement creusé au dessous des yeux, à large sillon médian, plus ou moins dilaté-arrondi vers le sommet, à peine comprimé au bout; scrobes sublongitudinales peu avancées sur la ligne médiane, remontant à peu de distance des yeux. Antennes minces à peine pubescentes; scape mince à la base n'atteignant pas le prothorax; 1^{er} article du funicule épaissi; obconique plus long que le 2^e; celui-ci aminci à la base; 3-7 visiblement plus courts, serrés, légèrement arrondis subtransversalement; massue oblongue, peu épaisse et peu allongée, rembrunie. Prothorax subtransversal, convexe et arrondi dans son milieu latéral, déprimé à la base et au sommet, légèrement étranglé à celui-ci, à ponctuation tantôt plus fine, tantôt plus forte, assez serrée, souvent subsillonné longitudinalement. Ecusson triangulaire ou arrondi au bout. Elytres du double à peine plus longues que larges, dilatées-arrondies latéralement, à épaules saillantes, subsinuées en dehors vers l'extrémité et séparément acuminées; séries ponctuées de gros points souvent écartés; intervalles inégaux plus ou moins convexes et imponctués. Pattes assez allongées; toutes les cuisses à dent très-faible, parfois nulle; tibias minces, avancés subanguleusement à leur sommet interne. — Long. 4,5; — larg. 1,5 mill.

Ressemble un peu au *P. viridicollis*; très-distinct par ses antennes peu épaisses, la direction des scrobes et la couleur des squamules.

Sibérie. (Coll. Schœnherr, V. Heyden, Lethierry, Reiche, la nienné).

a' *Scrobes longitudinales ou obliquant en avant vers la ligne médiane, mais conservant entr'elles une distance notable, et non véritablement transverses (plus rapprochées chez le crassior); forme largement ovale, très-épaisse.*
— Esp. 38-39.

38. OBOVATUS. Gebler in Sch n Cure. 1834. p. 445. 13. — VII p. 18. 17.

En ovale très-prononcé, large, assez court, brun, recouvert d'une pubescence squamiforme grisâtre (ou verte,

d'après Schœnherr), plus rare sur l'abdomen; glabre, à part une frange de poils très-courts le long de la marge des élytres vers l'extrémité; pattes et antennes ferrugineuses.

Tête large presque carrée; front déprimé, marqué d'une fossette. Yeux assez grands, peu saillants. Rostre plus étroit que la tête, presque carré, subsilloné, impressionné en demi-cercle vers le bout. Scrobes peu larges, non transversales, ne dépassant pas en dedans le niveau des yeux. Antennes remarquablement grêles; scrobe filiforme dans ses 2 1^{ers} tiers, un peu courbée ensuite; 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux, 3 ou 4 fois plus longs que larges; 3^e un peu plus long que la moitié du précédent; 4-7 successivement plus courts, obconiques, manifestement plus longs que larges; massue très-étroite, très-allongée, oblongue, un peu atténuée aux 2 bouts, 4 fois aussi longue que large, un peu rembrunie à la base. Prothorax subtransversal, peu arrondi latéralement, plus rétréci en avant, déprimé sur ses 2 marges antérieure et postérieure, très-peu convexe, très-obsolètement caréné. Ecusson oblong. Elytres en ovale allongé, du double au moins plus longues que larges, atténuées aux 2 bouts, évidemment arquées latéralement, échancrées en arc à la base, acuminées presque ensemble, très-convexes sur le dos. Stries profondes dans leur 1^{re} moitié, d'où les intervalles convexes, plus superficielles postérieurement. Pattes très-grêles; cuisses peu fortement claviformes, armées toutes d'une dent médiocre; tibias étroits, droits; ongles séparés, un peu écartés. — Long. 6,5; — larg. 3,2 mill. environ.

La ténuité des antennes suffit à elle seule pour faire reconnaître cette espèce.

Sibérie occidentale. (Coll. Schœnherr.)

39. GYRATUS. Gyll.* in Sch. Curc. II 1834. p. 444, 12.

Fortement ovale, très-large, assez court, noir, entièrement revêtu, à l'exception de l'abdomen, de squamules étroites d'un vert peu brillant (ou grises d'après Schœnherr); base du scape, seconde moitié des antennes et tarses d'un rouge ferrugineux; sans pubescence relevée.

Tête très-grande, front plan ou impressionné, fovéolé. Yeux assez grands, très-peu saillants. Rostre presque aussi large que la tête, peu allongé, anguleux, subatténué, arcuément impressionné au bout; scrobes médiocres suivies au-dessous des yeux d'une forte impression. Antennes courtes, assez épaisses, peu pubescentes; scape presque droit, renflé peu à peu assez fortement; 1^{er} article du funicule plus épais, peut-être un peu plus court que le 2^e; 3^e d'un tiers plus court que le précédent; 4-7 obconiques subarrondis au sommet, à peu près aussi longs que larges; massue un peu épaissie, subfusiforme, assez allongée. Prothorax de moitié plus large que long, brièvement arrondi au milieu, sinuusement rétréci aux 2 bouts, plus fortement en avant, déprimé avant chaque marge, assez convexe au milieu, très-obsolètement caréné. Ecusson triangulaire, squameux. Elytres pas tout-à-fait du double plus longues que larges, à épaules effacées, fortement arquées latéralement d'un bout à l'autre, subsinuées en dehors avant le sommet qui est acuminé, étroitement relevé et légèrement pubescent; stries fines, finement ponctuées; intervalles plans. Pattes assez grêles; cuisses peu fortement claviformes, armées toutes d'une dent courte, peu aiguë, éloignée du sommet, plus faible aux postérieures. — Long. 7; — larg. 3,5 mill. environ.

Je n'ai vu de cette espèce que 2 exemplaires, sans doute ♀, l'un de la collection Schöenherr, l'autre appartenant à M. Stierlin. Sa forme n'a d'analogue que chez l'espèce précédente, l'épaisseur des antennes suffit pour les distinguer.

Sibérie.

39^a CRASSIOR Desbr. nov. spec.

Forme de l'*Epiphanes malachiticus*, en ovale atténué en avant. L'exemplaire que j'ai sous les yeux et qui pourrait bien être en partie dépouillé, est orné de squamules d'un vert doré sur le prothorax et une partie de la tête, d'un noir bleuâtre sur le reste du corps avec des squamules subpiliformes, grisâtres sur les élytres.

Tête en carré transverse, à côtés subparallèles, plus étroite que le prothorax, déprimée au milieu entre les

yeux avec un petit point. Yeux presque aussi distants du bord antérieur du prothorax que de l'extrémité du rostre, latéraux, médiocres, assez saillants; rostre subquadrangulaire, un tant soit peu plus étroit au sommet, légèrement impressionné dans sa longueur, brusquement déprimé au bout, ce qui le fait paraître anguleux; scrobes entièrement visibles en dessus, arquées en dedans, peu larges, courtes, subterminales; mandibules saillantes dans cet exemplaire. Antennes médiocrement épaisses, allongées, atteignant la base du prothorax, très-légèrement pubescentes, brunes, avec les derniers articles du funicule et l'extrémité de la massue d'un ferrugineux sombre; scape épaissi graduellement, presque droit, dépassant les yeux; 2^{1ers} articles du funicule subégaux, 1^{er} un peu plus conique, 2 et 3 subfusiformes, très-peu épaissis au sommet, du double au moins aussi longs que larges, 4^e un peu plus long que large, 5-7 subarrondis (tous ces articles forment une tige assez déliée); massue en ovale allongé, légèrement épaissie, acuminée. Prothorax court, tronqué aux 2 bouts, dilaté-arrondi latéralement, transversalement convexe en arrière, à carénule médiane presque nulle, finement pointillé. Elytres subelliptiques, fortement convexes dès la base, épaules accusées bien que peu saillantes, à courbure latérale prononcée, sommet acuminé, un peu avancé en dessous, avant la pointe; stries superficielles finement ponctuées, laissant les interstries très-plans. Pattes médiocres, toutes les cuisses armées d'une dent très-visible. Tibias allongés, comprimés; ceux des 2 paires antérieures plus larges, subsinués, obliquement tronqués et sans dilatation au sommet. — Long. 7,5; — larg. 3,5 mill.

Distinct du *gyratus*, dont il a la forme épaisse, par les scrobes plus avancées en devant, la saillie des yeux et les épaules marquées.

Sibérie, 1 seul exemplaire envoyé par Bohemann à M. Jekel qui me l'avait communiqué sous le nom d'*Aprepes micans*, évidemment erroné.

a'' *Scrobes plus ou moins transverses, sensiblement rapprochées sur la ligne médiane. Forme oblongue ou oblongue-orale.* — Esp. 40-47.

40. TERSUS Sch. in musco — *subdentatus* Bohem.* in Sch. Curc. 1843. vii p. 30, 40.

♀ Oblongue, peu allongée, brun de poix, peu densément couverte sur le prosternum, le mésosternum et les flancs, les bords latéraux du prothorax et les élytres de très-petites squamules vertes ou verdâtres, parfois mêlées à de petits poils grisâtres non relevés plus abondants sur le disque du prothorax et la tête; antennes, base des cuisses, tibias et tarses jaunâtres, souvent rembrunis.

Tête assez courte, obsolètement étranglée derrière les yeux; front plan, fovéolé. Yeux médiocres, un peu sail-lants. Rostre court, plus étroit que la tête, subtransver-sal, à côtés parallèles ou à peine atténué, un peu inégal, déprimé au bout. Scrobes assez grandes, transversales, rapprochées. Antennes assez courtes, fortes; scape n'at-teignant pas le prothorax, courbé au milieu, épais; 1^{er} article du funicule plus dilaté, à peine plus court que le 2^e; 3-4 brièvement obconiques; 5-7 arrondis latérale-ment, transversaux; massue peu épaissie, du double plus longue que large, plus ou moins arrondie à la base, peu acuminée, rembrunie. Prothorax transversal, arqué laté-ralement, rétréci (et un peu déprimé aux 2 bouts), sinueu-sement en avant. Ecusson triangulaire. Elytres 4 fois en-viron aussi longues que le prothorax, de moitié seule-ment plus longues que larges, arquées sans élargisse-ment après le milieu, brièvement rétrécies, sinuées avant le sommet où elles sont acuminées ensemble et relevées; stries nettement accusées d'un bout à l'autre, à points serrés; intervalles de largeur et de convexité un peu variables; vers l'extrémité une série obsolète de petits poils rigides. Cuisses peu fortement claviformes munies toutes d'une très-petite dent; ongles bien séparés. — Long. 4-4,5; — larg. 1,5 mill.

♂ Forme plus étroite, plus parallèle; antennes plus pubescentes, à derniers articles du funicule peu arrondis transversalement, massue plus longue; cuisses antérieures

plus renflées ; tibias larges, les antérieurs un peu dilatés en dedans, avancés en pointe aiguë au sommet interne, les postérieurs un peu courbés en dehors.

Sicile. (Coll. Schœnherr, Stierlin, Ragusa, la mienne.)

41. PYRI Lin. Syst. nat. 1745. I, II, p. 615. n° 72. — *vespertinus* Gyll.* in Sch. Cure. II 1834. p. 453, 24. — *mutus* Gyll.* in Sch. Cure. 1834. II p. 454, 25 (♀). — *irroratus* Seidlitz. Berl. 1867. 187. (Var. ♀.)

Oblong, généralement large, tantôt plus, tantôt moins allongé, du reste très-variable, noir ou brun, couvert parfois parcimonieusement de squamules étroites ou de poils squamiformes dorés, verdâtres ou même gris, disposés transversalement sur le prothorax, sans pubescence ; antennes et pattes ferrugineuses, ces dernières rarement noirâtres.

Tête subtransversale, rétrécie ou subétranglée derrière les yeux, front subfovéolé. Yeux fortement saillants, assez grands. Rostre sensiblement plus étroit que la tête, vaguement impressionné, brièvement, obsolètement bicaréné en dedans des scrobes ; scrobes irrégulièrement arrondies, avancées sur la ligne médiane. Antennes assez fortes ; scape plus ou moins arqué ; 2^{1ers} articles du funicule subégaux, 3^e d'un quart plus court, 4-7 un peu plus longs que larges sauf le 7^e, plus arrondis (♀) ; massue noirâtre assez épaisse, subarrondie à la base. Prothorax plus ou moins arqué latéralement, plus brusquement rétréci et souvent subétranglé en avant, convexe au milieu, muni longitudinalement d'une crête médiane plus ou moins accusée. Ecusson suboblong, assez large. Elytres de longueur variable, toujours du double au moins aussi longues que larges, arquées en arrière sans dilatation, faiblement sinuées avant le sommet qui est peu acuminé, relevé en rebord très-marqué, brièvement pubescent ; à stries généralement bien marquées, à points serrés, légèrement sinucuses à la base ; intervalles plans, semblant parfois rayés à cause de la disposition longitudinale des squamules. Guisses armées toutes d'une dent courte peu aiguë. Dernier segment abdominal légèrement impressionné. — Long. 5,5-8 ; — larg. 2,5-3,6 mill.

♂ Plus étroit et plus parallèle; antennes d'un tiers plus longues, moins pubescentes; rostre un peu plus long que large, à scrobes très-grandes, très-légèrement dilaté vers celles-ci; 1^{er} segment abdominal impressionné assez largement, une carène peu élevée sur le 2^e.

♀ Large; antennes plus courtes, plus fortes, plus poilues; rostre subatténué, pas plus long que large; scrobes bien moins ouvertes; 1^{er} segment abdominal plan ou légèrement bombé.

Toute l'Europe, Sibérie.

42. ARTEMISLÆ Desbrochers des Loges, nov. sp.

J'avais d'abord confondu ce *Phyllobius* avec les variétés plus courtes, foncées en couleurs et parcimonieusement squameuses du précédent; l'examen d'un plus grand nombre d'échantillons des 2 sexes qu'a bien voulu me communiquer M. Stierlin, m'ont permis de reconnaître qu'il constitue une espèce très-distincte par les caractères suivants :

Trapu, noir, avec un léger reflet bronzé plus prononcé en dessous; antennes (sauf le funicule qui est d'un ferrugineux sombre), et pattes d'un brun de poix, avec les tibias et les tarses un peu moins foncés. Tête plus large, à côtés subparallèles, sans boursofflure apparente derrière les yeux; front nullement ou très-légèrement impressionné, sans fossette distincte. Yeux sensiblement plus écartés et moins proéminents. Rostre presque aussi large que la tête (abstraction faite des yeux), subtransversal, à côtés parallèles, ou très-légèrement atténué. Antennes plus épaisses et plus courtes dans toutes leurs parties, à cils plus fins, plus longs chez le ♂ que chez l'autre sexe; articles 4-7 du funicule aussi larges que longs, les derniers évidemment transversaux et arrondis (♀). Prothorax plus dilaté-arrondi transversalement et également dans les 2 sexes, sans crête longitudinale. Elytres guère plus de 1 fois 1/2 aussi longues que larges, plus courtes chez le ♂ que chez la ♀, à rebord apical faible (♂), nul (♀). Cuisses munies d'une dent courte mais aiguë. Abdomen à 1^{er} segment non impressionné, à

2^e caréné transversalement (♂). — Long. 4,5-5; — larg. 2-2,5 mill.

Alpes suisses.

D'après M. Stierlin, cette espèce se prend à une très-grande élévation, et constamment sur une sorte d'*Artemisia*.

43. THALASSINUS Gyll.* in Sch. Cure. 1834. II p. 445, 44. (♀). — *impressifrons* Bohem.* in Sch. Cure. VII 1843. p. 19, 20 (♂).

Large et assez court, épais, noir ou d'un brun de poix, non pubescent, recouvert de squamules d'un vert peu brillant (ou grises d'après Schønherr); antennes et pattes, au moins en partie, ferrugineuses. Tête grande et large; front aplani ainsi que le rostre, marqué d'un petit trait; yeux très-écartés, petits, peu saillants. Rostre peu allongé, un peu moins large, bien moins épais que la tête, à côtés subparallèles; au-dessus de l'impression anté-oculaire, une carène oblique partant des yeux pour rejoindre le bord interne des scrobes en avant; sillon médian très-obsolète; scrobes assez grandes obliquement subtransverses. Antennes courtes, épaisses; 2^{1ers} articles du funicule égaux, du double à peine plus longs que larges. Prothorax court, convexe au milieu. Ecusson brièvement triangulaire. Elytres 1 fois 1/2 aussi longues que larges, très-convexes transversalement, obliquement atténuées; stries généralement profondes et intervalles subconvexes. Cuisses antérieures plus fortement claviformes, toutes également armées d'une dent courte; ongles très-peu divergents. — Long. 7; — larg. 3 mill.

♂ Tête un peu moins large que le prothorax à la saillie des yeux; yeux médiocrement saillants; scape peu mince à la base, très-épais au sommet. Rostre à côtés parallèles, ou un tant soit peu élargi au sommet; articles 3-7 du funicule épais, subobconiques, un peu plus longs que larges à l'exception du 5^e qui est le plus court, presque carré; 7^e plus long que le 6^e; massue compacte à articles très-peu distincts, un peu épaissie au milieu, rétrécie aux 2 bouts, plus atténuée vers le sommet, 2 fois 1/2 environ aussi longue que large. Prothorax étroitement impressionné le long du bord postérieur, plus largement et for-

tement en avant, au moins de chaque côté de la ligne médiane; écusson aussi large que long, arrondi au sommet. Elytres 4 fois $1\frac{1}{2}$ aussi longues que larges, à stries assez étroites et intervalles plans.

♀ Articles 3-7 du funicule brièvement obconiques, cependant un peu noueux au sommet, à peu près aussi larges que longs, le 5^e le plus petit de tous; massue visiblement épaissie au milieu (subpyriforme), 2 fois $1\frac{1}{2}$ à peine aussi longue que large; rostre un tant soit peu épaissi au-dessous des yeux, ou subéchancré latéralement au-devant de ceux-ci, mais sans paraître conique. Elytres élargies en arrière; prothorax moins arqué sur les côtés. Le reste comme chez le ♂.

Sibérie orientale. (Coll. Schœnherr, Chevrolat, Jekel.)

44. MUTABILIS (Hoch. ex. typis in museo v. Heyden), Desbrochers des Loges nov. sp.

Extrêmement semblable au précédent, à part les différences indiquées pour chaque sexe :

♂ Tête plus large que chez le *thalassinus*; yeux, par suite, plus écartés, à saillie plus prononcée. Scape plus épais surtout à la base; 3^e article du funicule de la moitié à peu près du 2^e; 4-7 visiblement arrondis latéralement, à peu près aussi larges que longs, excepté le 7^e qui est plus allongé que le précédent; massue étroitement arrondie à la base, à côtés parallèles sur l'étendue des 2 1^{ers} articles, à dernier article en cône allongé, 3 fois $1\frac{1}{2}$ aussi longue que large. Rostre un tant soit peu atténué. Prothorax plus large que chez le ♂ du précédent. Elytres plus allongées, plus longuement parallèles, à courbure postérieure arquée et à déclivité moins brusque.

♀ Articles 3-7 du funicule plus ou moins arrondis, les derniers transversaux, le 7^e au moins aussi court, souvent même plus court et plus large que le précédent; massue largement arrondie ou en quelque sorte tronquée à la base; rostre atténué, subconique. Yeux plus saillants en avant que chez le *thalassinus* ♀. Elytres subparallèles à intervalles plans. — Long. 6-7; — larg. 2,8-3 mill.

Russie. (Coll. v. Heyden, Javet, de Bonvouloir, Jekel.)

45. SCUTELLARIS. Redt. Fn. Aust. 1849. 432. — *griseus* (Schœnh. in museo).

Subovale, large et court, densément recouvert de squamules grises ou vertes, mates.

Tête très-large et convexe, un petit point seulement sur le front; rostre évidemment plus court, à peine moins large que la tête, subconique (♂ ♀), modérément impressionné au devant des yeux, à peu près plan (à peine la marque obsolète d'une impression longitudinale). Antennes courtes, d'un brun noir dans leur 1^{re} moitié et au-delà, plus ferrugineuses vers le sommet; scape très-visiblement arqué, robuste surtout au sommet; 1^{er} article du funicule paraissant un peu plus court que le suivant, dilaté en dedans; 3^e de $\frac{1}{3}$ plus court que le précédent, les autres presque de même forme, brièvement subobconiques, peu arrondis, un peu plus longs que larges, même le 7^e; massue subpyriforme, assez épaisse, du double seulement plus longue que large, arrondie à la base, acuminée au sommet. Prothorax convexe, subdéprimé en avant, sans rebord limité, visiblement arrondi latéralement. Ecuillon suboblong. Elytres de $\frac{1}{3}$ plus larges que le prothorax, 3 fois $\frac{1}{2}$ environ aussi longues que lui, très-convexes dans les 2 sens, subparallèles dans les 2 1^{ers} tiers, subarrondies ensuite en se rétrécissant, sinuées extérieurement avant le sommet qui est relevé, à peine séparées à la suture; stries peu enfoncées, assez peu nettes; pattes fortes; cuisses, au moins les antérieures, renflées, munies toutes d'une dent peu allongée mais bien marquée. — Long. 5,5-6; — larg. 2 mill.

♂ Très-peu différent de l'autre sexe, un peu plus étroit; tête un peu rétrécie à la base et tibias plus épais; élytres plus parallèles.

Hongrie. (Coll. Schœnherr, Kirsch, v. Kiesenwetter).

46. XANTHOCNEMUS Kiesenw* Soc. ent. Fr. 1851. 634. — *meridionalis* Desbrochers des Loges (Olin).

Oblong-ovale, court, gris ou vert métallique; antennes d'un ferrugineux sombre, souvent plus foncé à l'extrémité du scape et sur la massue; tibias et tarses d'un testacé

clair. Intermédiaire pour la forme aux *P. scutellaris* et *alpinius*.

♂ D'un tiers moins allongé que le ♂ de *Palpinus*; yeux paraissant plus saillants; front foyéolé; rostre presque plan, très-obsolètement sillonné, à carènes indistinctes et à impressions infra-oculaires mal accusées, un peu élargi en s'arrondissant vers le sommet; scape moins épais à la base, non cilié; 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux et de même forme, c'est-à-dire légèrement obconiques, peu élargis au sommet; 3^e guère plus de la moitié du précédent, 4-7 successivement un peu plus courts et un peu plus larges, mais à peu près aussi longs que larges et conservant une forme brièvement obconique, sauf peut-être le dernier; massue pyriforme, arrondie à la base, assez épaisse, du double plus longue que large. Prothorax arrondi et conformé comme chez *Palpinus* ♂, à impressions plus obsolètes. Ecusson presque carré. Elytres d'un tiers plus courtes que chez *Palpinus*, sans être plus larges, stries bien marquées, un peu moins profondes. Cuisses peu claviformes à l'exception des antérieures dont la grosseur n'a cependant rien d'exagéré: à toutes une très-petite dent, parfois presque obsolète. — Long. 4,5-5; — larg. 2-2,2 mill.

♀ Tête et rostre bien plus courts que chez *Palpinus*, se rapprochant davantage de ceux du *P. scutellaris*; scrobes peu ouvertes; rostre un peu atténué; antennes à 1^{er} article du funicule paraissant un peu plus court que le 2^e et d'une forme plus triangulaire, cependant guère plus élargi au sommet que celui-ci; 3^e de moitié plus court; 4-7 subégaux formant une tige submoniliforme, le 7^e évidemment transversal; massue comme chez le ♂. Prothorax analogue à celui de *Palpinus* ♀; élytres d'un tiers plus courtes ainsi que l'écusson. Cuisses des 2 paires postérieures à peine, les antérieures médiocrement claviformes, à toutes une dent obsolète.

Espagne; Pyrénées.

Distinct du *P. scutellaris* par la forme sensiblement moins large, moins courte, la brièveté du 7^e article du funicule, la forme du prothorax, les cuisses faiblement dentées, etc.

47. ALPINUS Stierl. Berl. 1859. 269. — *xanthocnemus* Desbr. Olim. (*)

Oblong, peu large, très-densément recouvert de squamules d'un beau vert mat; sommet des tibia, tarses et antennes (moins une partie du scape et la massue qui sont noirs), d'un rouge ferrugineux.

Tête médiocre, suballongée, une fossette, parfois un sillon prolongé sur le front. Rostre plus étroit que la tête, aussi long ou plus long que large, fortement sinué latéralement et sensiblement dilaté en s'arrondissant à la hauteur des scrobes, marqué d'un large sillon limité, de chaque côté, par une crête naissant à l'extrémité du front et suivant plus bas, en s'écartant, les contours internes des scrobes; celles-ci très-larges subtransversales. Antennes à scape finement cilié; 1^{er} et 2^e articles du funicule subégaux, celui-là élargi en triangle, 2^e et 3^e sublinéaires, 4-7 successivement plus courts, plus arrondis, le 7^e en oblong transversal, évidemment plus court que le précédent; massue épaisse, arrondie à la base et bien détachée du dernier article du funicule, moins du double plus longue que large (♂), un peu moins courte (♀). Prothorax un peu inégal, impressionné parfois assez vaguement en avant, marqué d'un point au-dessus de l'écusson et souvent d'une courte carène obsolète dans son milieu. Elytres subscutiformes prolongées séparément en pointe aiguë un peu relevée et rebordée au sommet; stries subsillonées-punctuées; cuisses antérieures plus renflées, toutes munies d'une dent assez courte. — Long. (♂) 5, (♀) 6,5; — larg. (♂) 4,5, (♀) 2-2,2 mill.

♂ Rostre plus fortement dilaté au sommet; scape plus épais, surtout au sommet; prothorax de moitié plus large que long, visiblement arrondi latéralement, submarginé à la base et au sommet; élytres assez courtes, un peu plus larges que la plus grande largeur du prothorax, parallèles dans leurs 2 1^{ers} tiers; tibia assez larges.

(*) M. V. Kiesenwetter m'avait envoyé par erreur le *P. alpinus*, sous le nom de *xanthocnemus*, ce qui m'avait fait considérer le véritable *xanthocnemus* comme étant une espèce nouvelle que j'ai répandue dans les collections sous le nom de *meridionalis* (*pyrenaeus* olim). Tous les insectes nommés par moi *xanthocnemus* se rapportent à l'*alpinus*.

♀ Rostre moins dilaté; scape moins épais; prothorax d'un tiers plus large que long, à marges obsolètes ou nulles, légèrement arqué en se rétrécissant vers le sommet; élytres allongées, un peu élargies en s'arrondissant dès la seconde moitié; tibias allongés, linéaires.

Silésie méridionale; Alpes, mont Rose.

Confondu à tort avec le *P. scutellaris*, dont la forme est bien plus courte et plus large, le rostre court et subconique avec les scrobes bien moins larges, les stries peu profondes, le 7^e article des antennes non transversal, etc. Ces mêmes caractères (à l'exception du dernier), le distinguent aussi du *P. xanthœnemus*.

A^{mm} Toutes les cuisses inermes (par exception une dent très-obsolète chez certains exemplaires des *P. chloris*, *chlorizans* et *cinereus*). — Pas de poils relevés (sauf chez le *P. cinereus*, où l'on remarque des petites soies dressées extrêmement courtes). — Esp. 48-53.

a Dessus entièrement recouvert de squamules arrondies vertes (grises chez certaines variations). — Esp. 48-52.

b Pas de carène sur le 2^e segment abdominal (♂); une impression sur le dernier segment (♀). — Esp. 48-51.

48. CHLORIS Bohem.* in Sch. Curc. vii, 1843. p. 21, 23. (♂).

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire ♂ de cette espèce faisant partie de la collection Schœnherr. Son faciès est celui du *P. thalassinus* ♂, mais il est bien plus allongé.

Tête d'un tiers plus étroite, rétrécie en arrière. Rostre allongé, élargi au sommet, profondément impressionné au-dessous des yeux, cette impression non limitée par des crêtes obliques convergeant en avant; scrobes très-larges et très-profondes, légèrement obliques. Antennes d'un testacé clair; 3^e article du funicule de un quart seulement plus court que le précédent, les autres très-brièvement obconiques, à peine aussi longs que larges. Prothorax étroitement marginé aux deux bouts sur toute sa largeur, sans impressions. Elytres du double plus longues que larges, plus longuement parallèles, obliquement et

non brusquement atténuées. Pattes d'un testacé clair uniforme, très-parcimonieusement squameuses; cuisses médiocrement claviformes, toutes munies d'une très-petite dent obsolète. — Long. 5-6; larg. 2-2,3 mill.

Kamschatka (Sibérie). (Coll. Schöenherr).

49. CHLORIZANS Bohem.* in Sch. Curc. vii, 1843, p. 33, 46 (♀).

La forme générale de cette espèce rappelle celle des grands exemplaires du *P. pomonæ*; mais les yeux plus grands, plus saillants, le rostre allongé, dilaté, à scrobes très-larges, la tête rétrécie en arrière après la petite bour-soufflure postéro-oculaire, la rapprochent davantage du *P. chloris*.

Oblong, généralement d'un beau vert mat, pattes concolores, squameuses, avec le sommet des tibias et les tarses rougeâtres; antennes entièrement ferrugineuses ou rem-brunies à l'extrémité du scape et sur la massue.

Tête légèrement déprimée et obsolètement fovéolée en arrière des yeux. Yeux assez saillants. Rostre un peu étranglé latéralement au devant des yeux, plus ou moins dilaté au sommet; scrobes très-larges, obliquement transversales: sillon et crêtes latérales peu marqués. Antennes épaisses, assez courtes; scape n'atteignant pas tout-à-fait le prothorax, presque droit, fortement, non brusquement épaissi; 1^{er} article du funicule généralement un peu plus court que le 2^e et à peine plus long que large, 2^e plus régulièrement obconique, les autres plus ou moins noueux, un peu moins longs que larges, les derniers plus fortement transversaux. Prothorax d'un tiers environ plus large que long, guère plus large que la tête, impressionné sur les deux marges antérieure et postérieure, moins largement à celle-ci, faiblement arrondi dans son milieu latéral. Ecusson oblong, subtronqué au sommet. Elytres à épaules carrées, du double plus longues que larges, convexes, plus ou moins élargies selon les sexes, subacuminées presque ensemble et étroitement relevées-rebordées au sommet; stries fines, nettement ponctuées, intervalles plans. Pattes ferrugineuses, plus ou moins squameuses; cuisses peu fortement renflées, munies d'une dent très-

obsolète, parfois tout-à-fait nulle. Abdomen densément squameux. — Long. 4-5,5; — larg. 2-2,2 mill.

♂ Plus étroit, élytres subparallèles presque dans leurs deux premiers tiers; dernier segment abdominal plan.

♀ Assez large, élytres plus bombées, évidemment élargies en arrière; dernier segment abdominal peu profondément impressionné.

Sibérie. (Coll. Schöenherr, Chevrolat, Jekel, Lethierry.)

50. *LATITHORAX* Desbrochers des Loges, nov. sp.

♂ Extrêmement voisin du *P. chlorizans* ♂, coloré de même, tête, rostre, élytres d'un tiers plus larges. Rostre exactement de l'épaisseur de la tête. Antennes entièrement ferrugineuses, à 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e, presque du double plus long que large. Prothorax très-court, du double plus large que long, notablement plus large que la tête, visiblement plus rétréci en avant et étroitement étranglé avant le sommet, largement et fortement arqué latéralement. Elytres un peu moins larges que le prothorax, à épaules élevées bien que émoussées, très-légèrement atténuées au lieu d'être un peu élargies en arrière. Pattes inermes. Le reste comme chez le *P. chlorizans* ♂. — Long. 4-5,5; — larg. 2-2,2 mill.

♀ Inconnue.

Sibérie. (Ma collection.)

51. *POMOMÆ* Oliv. Ent. 1808, v. 83, p. 380, n° 453. — Schöenh. Curc. II, p. 459, 33. — *uniformis*? Sch. Curc. 1843, VII, p. 35. 51. — *cinereipennis* Gyll. in Sch. Curc. II, 1834, p. 459, 34; VII, p. 35, 52. — *impressirostris* Sch. Curc. VII, 1843, p. 35, 53. — *ulmi* Beck, Bul. Mosc. 1864, 477. — Ab. Ent. IV. 1867, 199.

Oblong, recouvert de squamules compactes d'un vert pâle et mat, parfois cendrées; antennes d'un ferrugineux sombre, ainsi que les pattes, qui sont plus ou moins densément squameuses.

Tête subtransversale, à côtés subparallèles, plus ou moins impressionnée, rarement avec une fossette sur le front; yeux médiocres, assez saillants. Rostre plus étroit que la tête, assez gibbeux par suite des crêtes intrà-

scrobaires au milieu desquelles on remarque un sillon de profondeur variable; scrobes assez fortes, sensiblement avancées obliquement sur la ligne médiane. Antennes assez fortes; scape un peu coudé au milieu; 1^{er} et 2^e articles du funicule du double plus longs que larges, subégaux; 3^e un peu plus long que la moitié du précédent, 4-7 aussi larges que longs, plus rarement transversaux, brièvement obconiques; massue arrondie à la base, du double au moins plus longue que large. Prothorax subtransversal, un peu élargi en arrière, plus rétréci au sommet qu'à la base, beaucoup plus large que la tête, faiblement arrondi (♀), plus sensiblement (♂), impressionné avant le bord antérieur. Ecusson oblong. Elytres du double environ plus longues que larges, faiblement élargies en arrière, non sinuées ni relevées au sommet; stries fines, à ponctuation souvent voilée par la squamosité, intervalles plans avec une série de poils excessivement courts, blanchâtres qu'on ne distingue guère qu'à l'extrémité. Cuisses toutes inermes. Ongles séparés. Abdomen densément squameux, à 2^e segment uni (♂ ♀). — Long. 3,5-5,5; — larg. 1,5-2 mill.

♂ Rostre un peu dilaté au sommet; tibias antérieurs avancés anguleusement au sommet; abdomen à dernier segment plan.

♀ Rostre non dilaté ou légèrement atténué; tibias antérieurs à peine dilatés au sommet; abdomen à dernier segment occupé par une large fossette.

Europe; Algérie; Sibérie.

b' Une carène transversale sur le 2^e segment abdominal (♂),
— pas d'impression sur le dernier segment (♀). —
Esp. 52.

52. VIRIDIAEREIS Laich. Tyr. Ins. 1, 1781. p. 211, n° 7, — *uniformis* Marsh. Ent. Brit. 1802. p. 311, n° 210. — Gyll. in Sch. Cure. II, p. 458, 32.

Oblong, court, coloré comme le précédent, souvent plus brillant, pattes plus dénudées.

Tête presque carrée; front marqué d'un petit point enfoncé; yeux assez petits, médiocrement saillants. Rostre

à côtés parallèles, peu gibbeux et sans sillon marqué ; scrobes subarrondies, peu étendues, assez rapprochées. Antennes courtes et épaisses ; scape n'atteignant pas tout-à-fait le prothorax ; 1^{er} article du funicule à peine plus court que le 2^e, (ces 2 articles guère plus d'une demi fois plus longs que larges), 3-4 de la moitié du 2^e, brièvement obconiques, les autres courts, le plus souvent oblong transversal ; massue évidemment arrondie à la base, assez épaisse, du double à peine plus longue que large. Prothorax court, oblong transversal, arrondi de chaque côté, impressionné et parfois très-brièvement étranglé en avant, presque également rétréci aux deux bouts. Ecusson subarrondi ou oblong. Elytres de moitié plus longues que larges, faiblement élargies en arrière, très-brièvement rétrécies ensuite ; stries assez étroites, très-nettes, à ponctuation bien visible ; intervalles presque plans ; parfois une rangée très-obsolète de petits poils couchés extrêmement courts. Cuisses inermes ; tibias assez larges et courts, pubescents ; ongles peu longuement fendus. Abdomen presque dénudé, seulement avec quelques poils non squamiformes, blanchâtres. — Long. 2,5-5 ; — larg. 1,2-1,3 mill.

♂ 2^e segment abdominal marqué d'une impression qui se termine en avant par un pli transversal.

♀ 2^e segment abdominal sans impression ni carène sensibles.

Toute l'Europe. Algérie ; Sibérie.

Souvent confondu avec le précédent, dont il se distingue très-bien par la forme des derniers articles des antennes, celle du prothorax et surtout par son abdomen non squameux, à 2^e segment caréné chez le ♂ et à dernier segment plan dans les deux sexes.

a' *Dessus non recouvert de squamules ni de poils squamiformes, à l'exception des bords latéraux du prothorax.*
— Esp. 52.

53. VIRIDICOLLIS Fabr. Syst. El. II, 1801, p. 528, n° 120. — Gyll. Ins. Succ. III, p. 273, 10. — Gyll. in Schœn. Curc. II, p. 461, 36.

Cette espèce est tout-à-fait conformée comme le *P. pyri*

Lin. et j'ai regretté d'être forcé de l'en éloigner à cause de ses cuisses inermes.

Subovale, court, d'un brun de poix luisant, plus clair sur les élytres et l'abdomen, antennes et pattes ferrugineuses, le reste couvert (moins densément sur le disque du prothorax) de squamules d'un vert pâle argenté, entremêlées de quelques petits poils blanchâtres couchés.

Tête large, front largement impressionné; yeux petits, peu saillants surtout latéralement. Rostre court, à peine plus étroit que la tête, non dilaté, sans sillon médian, mais impressionné latéralement au-dessous de chaque œil; scrobes peu avancées sur la ligne médiane. Antennes peu allongées, pubescentes; scape n'atteignant pas le prothorax, notablement épaissi au sommet, très-arqué; 1^{er} article du funicule irrégulièrement triangulaire, guère plus long que large, plus large et un peu plus court que le 2^e; 3-7 beaucoup plus courts, les derniers arrondis transversalement; massue épaissie, peu allongée, un peu arrondie à la base. Prothorax transversal, convexe, modérément arqué sur toute sa largeur latérale, déprimé avant le sommet, à ponctuation assez profonde, assez serrée. Ecusson triangulaire, densément vert-squameux. Elytres du double plus longues que larges, obliquement acuminées ensemble vers le sommet; stries larges, régulières, formées de gros points peu rapprochés, plus profondes en avant; intervalles, par suite, plus étroits et plus convexes en cet endroit. Pattes assez fortes; cuisses inermes, souvent tachées de squamules vertes avant le sommet; ongles très-peu divergents. — Long. 3-4,5; — larg. 1-1,5 mill.

♂ Antennes plus épaisses; élytres plus courtes, pas beaucoup plus larges que le prothorax, subparallèles, à épaules moins développées; tibias notablement avancés anguleusement en dedans au sommet.

♀ Antennes à derniers articles surtout un peu moins larges; élytres bien plus larges que le prothorax, plus développées aux épaules, obliquement élargies jusqu'aux 2/3, plus acuminées ensuite; tibias peu anguleux en dedans.

Europe, surtout montagnaise.

a'' Dessus densément recouvert d'une pubescence subquamiforme, avec des squamules plus larges seulement sur les bords latéraux du prothorax. — Esp. 53-54.

54. SULCIROSTRIS Bohem.* in Sch. Curc. II, 1834, p. 462, 38. — *planirostris* Gyll. Sch. Curc. II, 1834, p. 462, 39; — *suratus* Gyll.* Sch. Curc. II, 1834, 40 (♀ minor); — *seriehispidus* Gyll. Sch. Curc. II, 1834, p. 464, 41 (♂). — *irroratus* Bohem. Sch. Curc. VII, 1843, p. 37, 57 (♂).

Var. *cinereus* Gyll.* Sch. II, 1834, p. 455. — Cuisses obsolètement dentées.

Ovale, large, court et épais, noir ou brun, couvert d'une pubescence squamiforme cendrée, entremêlée parfois sur les élytres de taches brunâtres (*irroratus*); bords latéraux du prothorax et flancs parés de squamules d'un blanc argenté; antennes, tibias et tarses plus ou moins ferrugineux.

Tête large et courte, d'ordinaire largement impressionnée et obsolètement fovéolée, sans poils relevés; yeux assez petits, assez saillants. Rostre court et épais, plus large que long, subatténué, à sillon peu profond; scrobes arquées transversalement, de largeur variable, assez rapprochées. Antennes médiocres; scape visiblement arqué, atteignant à peine le prothorax; 4^{er} article du funicule un peu plus long que large, un peu plus court que le 2^e, 3-7 subégaux, plus ou moins arrondis, les derniers transversaux; massue épaissie, arrondie à la base. Prothorax transversal, arrondi latéralement, sans poils relevés. Ecusson en demi-cercle. Elytres à peine plus longues que larges, très-arrondies latéralement, brusquement rétrécies au sommet qui est obtus; stries assez profondes, intervalles larges, ordinairement plans, munis de poils rigides très-courts, dressés. Cuisses inermes, peu claviformes; tibias postérieurs un peu amincis avant leur sommet; ongles très-rapprochés, longuement soudés. — Long. 2,5-3; larg. 1,2-1,3 mill.

♂ Tibias antérieurs légèrement dilatés en dehors vers la base; une petite carène bien visible le long du bord postérieur du 2^e segment abdominal.

♀ Dilatation des tibias et carène nulles.

Autriche, Russie, Sibérie, etc.

55. BREVIS Gyll.* in Sch. Curc. ii, 1834, p. 461, 37. — Bohem. in Sch. Curc. vii, p. 35, 50. — *dispar* Redt. Fn. Aust. 1849, p. 433.

Brièvement ovale, large, brun plus ou moins foncé; antennes et pattes ferrugineuses; cuisses rembrunies, avec une tache squameuse blanchâtre; côtés du prothorax à bordure d'un gris-argenté ou doré formée de poils squamiformes dirigés en travers; élytres tachetées de poils analogues dirigés longitudinalement et souvent mêlés à une pubescence plus fine; pubescence relevée, nulle sur la tête et sur le prothorax, touffue, assez fine, évidemment soulevée sur les élytres; dessous peu pubescent.

Tête transversale, marquée ordinairement d'un gros point enfoncé; yeux assez petits, saillants en avant. Rostre subquadrangulaire, bien plus étroit que la tête; crêtes intrà-scrobiaires peu tranchantes, peu arquées en X, sillon médian parfois prolongé jusqu'au front; scrobes médiocres, obliquement transverses, assez rapprochées. Antennes peu allongées, épaisses; scape du double plus épais au sommet, atteignant à peine le prothorax; 1^{er} et 2^e articles du funicule égaux, du double plus longs que larges, 3-7 progressivement plus courts, plus ou moins arrondis, les derniers transversaux; massue épaisse, largement arrondie à la base. Prothorax très-court, évidemment arrondi latéralement, un peu en arrière, brièvement étranglé au sommet qui est plus rétréci, ponctué-granulé très-serré. Ecusson presque en demi-cercle. Elytres de moitié au moins plus longues que larges, beaucoup plus larges que le prothorax, plus ou moins arrondies latéralement, milieu de leur bord basilaire plus élevé que le niveau du prothorax; extrémité obtusément acuminée; stries larges, assez profondes, intervalles un peu plus larges que les stries, subconvexes. Cuisses épaisses chez le ♂, inermes; tibias comprimés, sinueux. — Long. 3,5-4; — larg. 2,6 mill.

♂ Tibias subanguleusement dilatés à leur base externe; une carène le long du bord postérieur du 2^e segment abdominal.

♀ Tibias à dilatation très-faible ou nulle; pas de carène sur le 2^e segment abdominal.

Crimée, Grèce, Autriche.

Espèces que l'auteur n'a pas vues (*).**56. PHYLLOBIUS OMIOIDES Hochh. Bul. Mosc. 1851. I 50.**

Cette espèce est très-voisine du *suratus* Sch.; cependant on l'en distingue, comme du *brevis* et du *sulcirostris*, avec lesquels il a de la ressemblance, par sa forme plus courte, plus étroite, le prothorax plus convexe, et surtout par le scape des antennes beaucoup plus arqué n'atteignant pas tout-à-fait le prothorax.

Si les épaules n'étaient pas si saillantes, on pourrait le placer parmi les *Omius*; il ressemble d'une manière frappante à l'*O. grandicornis* Dej., ainsi qu'au *Ptochus bisignatus* Sch. sans les épaules saillantes et le prothorax dilaté sur les côtés.

Dessus noir, luisant, dessous plus brun de poix, les cuisses en massue, inermes, sont aussi de cette dernière couleur, mais les jambes, les tarses et les antennes sont jaune-rougeâtre; de petites squamules en rond allongé couvrent assez densément tout l'insecte, et on remarque, en outre, une couche de soies courtes blanchâtres. Antennes exactement comme dans *suratus* et *sulcirostris*, seulement le scape est un peu plus court, plus épais et plus fortement courbé en dehors. Front convexe, rostre presque aussi long que la tête, longé d'un sillon distinct qui cependant devient moins profond sur le front. Prothorax près de moitié plus large que long, fort convexe en dessus, plus fortement arrondi sur les côtés; au-dessous des squamules la surface paraît granulée. Ecusson petit, mais distinct, carré et densément squamuleux de gris-blanc. Elytres peu plus larges que le prothorax, mais 3 fois aussi longues que lui, à peine distinctement élargies par derrière, brusquement rabattues au bout, elles paraissent arrondies ensemble, mais chaque élytre finit en pointe; médiocrement convexes en dessus, distinctement striées-

(*) M. Hochhuth ne donnant aucun détail sur la forme du rostre, des scrobes et des antennes, je ne puis leur assigner une place quelconque ni même affirmer que ces espèces appartiennent au genre *Phyllobius*.

ponctuées, avec les interstries un peu convexes. — Long. 2,3 à 2,8 mill.

Sibérie, Nertschinsk.

Cette espèce pourrait bien être une des nombreuses variétés du *P. sulcirostris*.

57. MIXTUS Hochhuth in Kolenati. Bull. Mosc. 1847. Pétersb. 1856, 403.

Étroit, allongé, noir, couvert parcimonieusement de squamules arrondies vertes et cendrées et parsemé de poils blancs dressés; bouche, antennes, extrémité des jambes et tarses d'un roux ferrugineux; rostre largement sillonné; prothorax inégal; élytres ponctuées-striées, acuminées au sommet. — Voisin du *P. argentatus* dont il a la taille, mais plus étroit et autrement coloré.

Russie méridionale.

Cette description très-insuffisante doit être tenue pour nulle.

58. PINETI Redt. Ins. Aust. 1858, p. 432. 2^e édit. p. 710.

Noir, avec des squamules d'un vert-bleuâtre, peu denses; dessous à pubescence grise, peu densément squameux vers les côtés. Antennes et pattes ferrugineuses. Front plan, rugueusement ponctué. Prothorax de moitié plus large que long, peu étranglé antérieurement, à côtés très-peu dilatés-arrondis (plus fortement ♂). Elytres profondément ponctuées-striées, à interstries peu convexes.

Autriche, quelquefois nuisible aux pins par sa quantité.

M. Redtenbacher, dans son tableau (2^e éd., loc. cit.), le place à côté du *P. argentatus*, ayant avec cette espèce, pour caractère commun, une pubescence très-courte, à peine élevée. Sans la couleur des pattes et des antennes on pourrait croire à une variété du *maculicornis*, qui varie du vert au bleu, mais je n'ai pas vu d'exemplaires de cette espèce à pattes testacées, bien que cette variété existe chez l'*argentatus*. C'est à tort que je l'avais d'abord identifiée au *pinicola* Kiesenw.

59. PALLIDIPENNIS Hochhuth in Kolenati Melet. Bul. Mosc. 1847, 406.

Oblong-ovale, noir, à peine pubescent; antennes, pattes et élytres d'un testacé pâle, ces dernières rembrunies à la base, couvertes peu densément de squamules filiformes dorées; poitrine, tête, dessous et côtés du thorax plus densément vert-doré, squameux, l'un et l'autre (*sic*) (*) ruguleusement et densément ponctués; front convexe, aplati entre les yeux; rostre court, sillonné en dessus; thorax plus court que long, transversalement convexe au milieu, peu fortement dilaté-arrondi latéralement; élytres ponctuées-striées, subsillonnées à la base, acuminées au sommet; cuisses munies d'une dent aiguë. — De la taille d'un petit *P. argentatus*.

Russie.

60. CERVINUS Hochhuth in Kolenati. Melet. Bul. Mosc. 1847, 410.

Oblong-subovale, noir, à peine pubescent, couvert de squamules rondes, fauves et subopaques, plus denses en dessus, plus petites en dessous; antennes et pattes d'un testacé-roussâtre; front impressionné entre les yeux ainsi que le rostre qui est plan (*sic*); une carène obsolète au milieu de cette impression; thorax transversal, convexe, étranglé avant le sommet; élytres ponctuées-striées, acuminées au sommet. — De la taille du *P. pallidipennis*.

Russie méridionale.

Espèces n'appartenant pas au genre *Phyllobius*.

PHYLLOBIUS LIGURINUS Gyll.* in Sch. Curc. vii, 1843, 28. Le type que j'ai sous les yeux est un *Polydrosus corruscus* très-reconnaissable malgré son mauvais état.

PHYLLOBIUS VIRENS Bohem.* in Sch. Curc. vii, 1843, 25 n'est autre qu'une ♀ d'un vert foncé du *polydrosus cervinus* Lin. (Variation qu'on retrouve en Corse).

PHYLLOBIUS CANDIDATUS Perris* Soc. Ent. Fr. 1865, 509. Cet insecte est un *Metallites* décrit par Gyllenhal (in Sch. Curc. vi, 459), sous le nom de *tibialis**; le *Polydrosus senex*

(*) Sans doute la tête et le prothorax ?

Chevrolat, Rev. zool. 1865, p. 14, est aussi la même espèce.

PHYLLOBIUS GLYCYRRHIZÆ (Beck.) Stierlin*, Bull. Mosc. t. xxxvi, p. 493. Cet insecte est un *Chlæbius*, comme M. Stierlin l'a reconnu lui-même.

GENRE PSEUDOMYLLOCERUS.

Scrobes presque en forme de fossettes subarrondies, à la manière des *Ptochus*, très-légèrement prolongées en dehors, leur majeure partie visible en dessus, prolongées presque jusqu'aux yeux.

Yeux latéraux, saillants en dehors.

Antennes longues, dépassant le milieu du corps (♀), minces ou très-minces; scape dépassant le bord antérieur du prothorax en traversant le milieu de l'œil; massue exactement fusiforme, effilée peu à peu vers la base et au moins autant que vers le sommet.

Rostre fortement entaillé au bout triangulairement; à sommet de cette échancrure rarement émoussé; chez les ♀ surtout, cette échancrure est très-développée, s'avancant jusqu'à la naissance des scrobes, de sorte qu'il ne reste entre les deux cavités qu'une lame étroite.

Pattes inermes; ongles courts, soudés à la base et à peine séparés au sommet.

Abdomen à 2^e suture un peu avancée antérieurement au milieu, les autres droites; 2^e segment aussi grand que les 2 suivants réunis; ongles des tarses soudés.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- I. Espèce densément recouverte de squamules vertes, en dessus, avec une bande rousse qui se prolonge de la tête au milieu de la suture des élytres. 2. DORSALIS.
(Sibérie.)
- II. Espèce à squamosité d'un gris cendré uniforme, parfois avec des taches ou bandes longitudinales plus claires sur les élytres. — Saillie des yeux subanguleuse. 3. MUS.
(Europe; Anatolie.)

- III.** Espèce brune ou d'un brun ferrugineux, avec des bandes transversales ondulées sur les élytres formées de squamules grisâtres occupant rarement toute leur surface. — Saillie des yeux moins prononcée et arrondie.

2. SINUATUS.

(Europe.)

1. DORSALIS Mannerh. in Hum. Es. Ent. iv, 1825, p. 34, n° 18 ; in Sch. Curc. n° 1834, p. 451, 21. (*Phyllobius*.)

Oblong, non pubescent, densément et entièrement recouvert de squamules arrondies d'un vert pâle, sauf une large bande rousse occupant la tête jusqu'aux yeux, prolongée sur le prothorax et ensuite sur la suture des élytres où elle s'efface insensiblement aux $\frac{2}{3}$; antennes et pattes d'un testacé clair, cuisses un peu rembrunies et plus ou moins squameuses.

Tête courte, marquée d'un trait raccourci, enfoncé, sur le front ; yeux médiocres, leur saillie plus avancée que les côtés de la tête. Rostre guère moins large que la tête, moins épais qu'elle, en carré subtransversal, élevé de chaque côté en dedans des scrobes, largement sillonné au milieu, à peine dilaté, profondément échancré en demi-cercle au sommet ; scrobes sublongitudinales, plus larges en arrière. Antennes assez grêles et allongées ; scape un peu arqué, dépassant le bord antérieur du prothorax ; 1^{er} et 2^e articles du funicule subégaux (le 1^{er} peut-être un peu plus long), du double plus longs que larges, 3-7 presque égaux, assez étroits, tous plus longs que larges ; massue exactement fusiforme, sensiblement renflée au milieu, très-amincie vers la base. Prothorax subcylindrique, un peu plus large que la tête, à peine plus large que long, largement impressionné en travers avant le sommet et avant la base, ce qui le rend inégal et le fait paraître traversé dans son milieu par un large pli ; une carène obsolète au milieu. Ecusson subtriangulaire. Elytres plus larges que le prothorax, du double plus longues que larges, subparallèles dans leurs 2 1^{ers} tiers, peu acuminées, non relevées au sommet ; stries bien nettes quoique fines, à ponctuation peu apparente, intervalles presque lins. Pattes grêles ; cuisses inermes, les antérieures

seules modérément claviformes; ongles très-rapprochés. — Long. 5; — larg. 4,6 mill. environ.

Je n'ai vu que le type de la collection Schœnherr provenant de Gebler.

Sibérie (Irtysch.).

2. SINUATUS Fabr. Syst. El. 1801, II, p. 528, n° 126. — Gyll. in Sch. Curc. n° 1834, p. 452, n° 23. (*Phyllobius*.)

En ovale court, d'un brun foncé, souvent roux sur les élytres et le prothorax; antennes et pattes ferrugineuses; des squamules arrondies, d'un cendré verdâtre, couvrant le dessous, la tête au moins en partie, les bords latéraux du prothorax, tantôt formant sur les élytres des bandes obliques et dentées, tantôt couvrant toutes les parties antérieures jusqu'au milieu des élytres, (plus rarement tout le dessus d'une manière uniforme).

Tête aussi large que le prothorax, à la saillie des yeux; front plan; yeux très-grands, très-peu saillants. Rostre court ou très-court, plus large que long, plus étroit que la tête, faiblement dilaté au sommet qui est profondément échancré triangulairement; scrobes assez larges, à peine obliques. Antennes très-grêles, atteignant le milieu du corps; scape dépassant notablement le prothorax, visiblement arqué, peu épaissi; 2^{1ers} articles du funicule égaux; 3-7 bien plus courts mais étroits et visiblement plus longs que larges; massue étroite, fusiforme, longuement amincie aux deux bouts, très-allongée. Prothorax subcylindrique, un peu plus large que long, largement impressionné en travers vers le tiers antérieur et postérieur, ce qui fait ressortir au milieu un large pli plus ou moins marqué. Ecusson oblong, squameux. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, d'un tiers plus longues que larges, très-convexes, à épaules carrées, élargies en s'arrondissant en arrière, obtusément atténuées au sommet; stries assez profondes, intervalles larges, subconvexes, munis de poils extrêmement courts, épais, recourbés, peu visibles. Pattes grêles, inermes. — Long. 2,3-3,5; — larg. 0,8-1,2 mill.

♂ Plus étroit, moins élargi en arrière; yeux et scrobes

plus grands ; échancrure du rostre prolongée presque jusqu'au niveau supérieur des scrobes.

♀ Plus obèse ; yeux, scrobes, échancrure du rostre moins grands.

Toute l'Europe. Batoum, en Imérie. (Coll. Reiche.)

3. MUS Fabr. Syst. Eleut. 1801, n, p. 524, n° 103. — Boliem. in Sch. Curc. n, p. 451, n° 22. (*Phyllobius*.)

Oblong, médiocrement allongé, mat, très-densément recouvert en dessous de squamules arrondies, blanchâtres, remontant sur les bords latéraux, parfois une tache de même couleur au-dessous de l'écusson, le reste brun-cendré ; antennes et pattes ferrugineuses.

Tête subétranglée derrière les yeux, front convexe, marqué d'une petite fossette qui se prolonge parfois en une ligne creuse jusqu'à l'extrémité du rostre ; yeux sail-lants latéralement. Rostre subquadrangulaire, un peu plus étroit que la tête, fortement échancré anguleusement au sommet ; scrobes un peu obliques, médiocrement rapprochées. Antennes pubescentes, assez minces, à part le scape qui est brusquement épaissi dans son dernier tiers, sensiblement arqué ; 2 1^{ers} articles du funicule subégaux, 3-7 visiblement plus courts, mais visiblement plus longs que larges, étroits, nullement noueux ; massue fusiforme, longuement et plus fortement amincie à la base. Prothorax en carré subtransversal, un peu sinueux latéralement, plus rétréci, subétranglé en avant, non ou à peine plus large que la tête à la saillie des yeux, inégal par suite de 4 impressions, 2 avant le sommet et 2 avant la base. Ecusson subsemicirculaire. Elytres du double plus longues que larges, subparallèles, à peine élargies, brusquement déclives, obtusément subacuminées, non relevées au sommet ; stries assez fines, bien marquées, sinueuses à la base ; intervalles larges, sériés de quelques points noirs et de quelques poils rigides à peine visibles, les externes convexes. Pattes inermes, peu épaisses. — Long. 3,5-4,5 ; — larg. 1,3-1,5 mill.

♂ Rostre élargi au sommet ; échancrure apicale profonde, prolongée jusqu'à l'extrémité supérieure des scro-

bes et ne ménageant ainsi, entre les deux cavités, qu'une lame étroite.

♀ Rostre à côtés parallèles ou un peu atténués; scrobes et échancrure apicale moins larges et moins prolongées, découpant très-peu l'espace médiaire.

Toute l'Europe.

GENRE MYLLOCERUS Schœnh. Curcul. Disp. 1826. p. 178.

Gen. 96. — Gen. Curcul. II p. 424. Gen. VI 213.

Yeux latéraux médiocrement saillants, leur saillie ne dépassant pas les bords de la tête.

Rostre subdéprimé moins épais que large, droit, aussi large que la tête et non distinct de celle-ci, à échancrure apicale profonde et ouverte. Mandibules falciformes non dentées en dedans chez la seule espèce européenne qui me soit connue.

Scrobes profondes, subarrondies, entièrement visibles en dessus et restant très-éloignées des yeux.

Antennes à scape graduellement peu fortement épaissi, conformées d'ailleurs comme chez le genre précédent, ainsi que le prothorax et les élytres.

Abdomen à 1^{er} segment plus long que le 2^e; celui-ci égal dans son milieu (qui est un peu avancé en angle obtus), aux 2 suivants réunis.

Ongles des tarses libres jusqu'à la base.

1. **DAMASCENUS** Hamp. Wien. Monats. 1861. 208. — Abeille IV 1867. 16'.

Oblong, médiocrement allongé, noir, entièrement recouvert d'une couche épaisse d'un gris blanchâtre mat, formée de squamules arrondies s'étendant sur les pattes et même sur les antennes qui sont d'un ferrugineux obscur; tarses plus clairs; parsemé de très-petites soies blanches à peine visibles, sérialelement disposées sur les intervalles des élytres; tête non distincte du rostre, exactement de même largeur, et formant avec lui un carré à peine plus long que large. Yeux assez grands, un peu saillants, mais leur saillie à peine aussi avancée que les bords latéraux

de la tête. Rostre marqué à l'extrémité d'une excavation large et profonde terminée en arrière par une ligne enfoncée qui atteint le front. Antennes minces, allongées; scape courbé dans sa 2^e moitié; 2 1^{ers} articles du funicule subégaux, 3 fois au moins aussi longs que larges, les autres plus courts, à peu de chose près égaux, subconiques plus longs que larges; massue médiocrement épaissie dans son milieu, également atténuée aux 2 extrémités. Prothorax de la largeur de la tête, en carré transversal, très-distinctement lobé au milieu de la base, sinué latéralement avant les angles postérieurs qui sont ainsi aigus, faiblement impressionné transversalement en avant et en arrière. Ecusson suboblong. Elytres échancrées au-devant de l'écusson, à épaules élevées, parallèles dans leurs 2 1^{ers} tiers, très-obtusément rétrécies ensuite, presque ensemble, à sommet non relevé; stries régulières à points serrés, intervalles plans. Pattes peu épaisses; dent des cuisses nulle ou presque nulle. Quelques gros points sur le prosternum et sur la poitrine. — Long. 5,5-6; — larg. 1,6-2 mill.

Chypre (coll. de Bonvouloir); Syrie (coll. Kirsch, Reiche, Javet).

2. ARABICUS Boheman in Sch. Curc. 1843. VII p. 7, n° 8.

Tête courte, épaisse, un peu convexe, d'un brun rousâtre, à pointillé serré, recouverte d'une squamosité cendrée. Yeux situés latéralement, subarrondis, non saillants, et noirs. Rostre de la longueur et presque de la largeur de la tête, épais, droit, longitudinalement creusé, avec les bords du sillon élevés et carénés, d'un noir de poix, revêtu densément d'une squamosité cendrée. Antennes plus courtes que la moitié du corps, épaisses, d'un ferrugineux obscur, à squamosité et pubescence cendrées; articles 2-8 du funicule courts, arrondis; massue oblongue, acuminée, plus claire. Prothorax à peine plus long que la largeur de la base, tronqué au sommet, un tant soit peu rétréci de la base vers celui-ci, à bord postérieur profondément bisinué, médiocrement convexe, très-finement pointillé, d'un noir de poix, à squamosité cendrée. Ecusson petit, triangulaire, d'un noir de poix recouvert d'une squa-

mosité cendrée. Elytres oblongues-ovales, séparément arrondies et un peu proéminentes à la base, un peu plus larges antérieurement que le prothorax, 3 fois au moins plus longues que lui, à épaules arrondies, non élevées; un tant soit peu élargies de la base au-delà du milieu, obtusément arrondies ensemble au sommet, convexes, à déclivité postérieure médiocre, à stries fines, faiblement ponctuées, à intervalles à peu près plans, d'un noir de poix, densément recouvertes de squamules cendrées et parsemées de petites soies courtes, blanchâtres. Dessous d'un noir de poix, densément cendré-squameux. Pattes médiocres, d'un ferrugineux obscur, à squamoseité cendrée et à pubescence blanchâtre; cuisses médiocrement renflées, toutes armées d'une petite dent obtuse; tibias arrondis presque droits, recourbés en dedans au sommet; tarses d'un ferrugineux plus clair, spongieux et gris inférieurement.

Arabie.

Je n'ai pas vu cette espèce et n'ai fait que reproduire la description de Schœnherr.

Le *subcostatus* Kolenati m'est également inconnu et je suis persuadé qu'il n'appartient pas à ce genre; en voici la description :

3. M. SUBCOSTATUS Kolen. Bull. Mosc. 1858. p. 86. pl. 2. f. 13.

Oblong, noir, recouvert en dessus d'une pubescence relevée d'un blanc jaune, squameux de gris en dessous; extrémité du rostre, antennes et pattes roux; rostre irrégulièrement rugueux-strié, densément velu à la base, atténué vers le sommet. Tête et prothorax densément profondément ponctués, celui-ci dilaté-arrondi latéralement, tronqué à la base. Elytres striées à intervalles élevés avec une double série de rides transverses, couvertes de poils couchés. Cuisses mutiques. — Long. 3,2; — larg. 1,4 mill.

Caucase.

GENRE CORIGETUS (*χορίτζ, punaise; γείτων, voisin*).

Tête transversale beaucoup plus courte que le rostre; front largement excavé; yeux subarrondis, latéraux. Rostre quadrangulaire, moins épais que large, élevé à la base après la cavité du front en une protubérance ordinairement divisée au milieu, entaillé triangulairement au sommet; cette échancrure n'atteignant pas, à beaucoup près, la naissance des scrobes, même chez le ♂. Scrobes très-courtes, presque droites et latérales, restant à une grande distance des yeux. Antennes minces; scape atteignant ou dépassant un peu le bord antérieur du prothorax, arqué graduellement, médiocrement épaissi; articles du funicule sublinéaires, les 2 1^{ers} très-longs, tous sensiblement plus longs que larges; massue fusiforme, très-amincie aux deux bouts. Prothorax, élytres, pattes, comme dans le genre précédent; tarses très-allongés; ongles libres dès la base et écartés. Abdomen à 2^e segment un peu plus court que les deux suivants réunis.

1. MARMORATUS (Mannerh.) Desbrochers des Loges n. sp.

Oblong, assez court, noir, glabre, densément recouvert de squamules arrondies d'un vert pâle, rarement teinté de jaunâtre uniforme, avec quelques points noirs dénudés en dessous, plus ou moins varié de noir en dessus; parfois cette dernière couleur domine (♂) et la couleur verte n'occupe plus que les marges latérales, une étroite ligne longitudinale au milieu du prothorax et quelques petites taches sur les élytres.

Tête un peu élargie à la base, moins large que le prothorax, étranglée en dessous à la naissance du rostre. Yeux non saillants, pas très-écartés surtout en avant. Rostre un peu dilaté rectilinéairement vers le sommet, marqué avant l'échancrure d'une impression que parcourt une très-fine carène longitudinale. Antennes brunes, le scape seul squameux, 2 1^{ers} articles du funicule trois ou quatre fois aussi longs que larges, le 1^{er} peut-être un peu plus long, 3-7 de la moitié à peine de la longueur des précédents, 7^e un peu plus allongé; massue étroite. Pro-

thorax court, sinueusement rétréci aux deux extrémités, plus fortement en avant, à angles postérieurs aigus, à base fortement sinuée de chaque côté et lobée au milieu, à peine impressionné avant les 2 marges. Ecusson oblong ou subtriangulaire, peu allongé. Elytres pas tout-à-fait du double aussi longues que larges, subdéprimées, arcuément déclives en arrière, parallèles (♂), un tant soit peu élargies (♀), obtuses au bout; stries étroites, à points très-serrés, intervalles presque plans; extrémité des tibias et des tarses seuls dépouillés de squamules et d'un ferrugineux obscur. Cuisses à dent très-obsolète ou nulle. — Long. 3,5; — larg. 1,5 mill.

Le ♂ a les antennes plus grêles, plus allongées : le scape dépasse le bord antérieur du prothorax et les derniers articles du funicule sont au moins du double aussi longs que larges.

Sibérie. (Coll. von Heyden, Reiche, Roëlofs).

J'ai trouvé dans la collection de M. von Heyden plusieurs exemplaires provenant de Mannerheim.

N. B. — Pour me conformer au plan adopté par M. de Marseul dans la révision générale des OTIORHYNCHIDES, j'ai cru devoir, sur son observation (et bien que je n'approuve pas sa manière de voir, pour des raisons que je n'ai pas à développer ici), changer quelques-uns de mes noms qui se trouvaient employés déjà dans la même tribu. En voici la liste :

| NOMS ANCIENS. | NOMS NOUVEAUX. |
|--------------------|----------------|
| Bonvouloirii | Achardi. |
| fulvipes | fulvago. |
| squamosus..... | squarrosus. |
| Reichei..... | Reicheidius. |
| v. fallax..... | v. Sinon. |
| brevicornis | brachicornis. |
| breviusculus..... | breviatus. |
| Kiesenwetteri..... | serripes. |
| maculosus..... | maculifer. |
| Stierlini..... | stierlinensis. |
| subdentatus..... | tersus. |

Par le même motif, il conviendra de changer les noms de deux *Peritelus* décrits par moi dans le *Bulletin de la Société suisse*, en 1870 : *musciicola* au lieu de *muscorum*, et *minutissimus* au lieu de *corsicus*.

N. B. — Je viens de recevoir, par l'entremise de M. von Kiesenwetter, un exemplaire du *Phyllobius pineti* communiqué par M. Redtenbacher, mentionné ci-dessus page 737. Ce n'est qu'une des nombreuses variétés du *P. argentatus*.



ESPÈCES

DE LA

TRIBU DES OTIORHYNCHIDES

DÉCRITES PENDANT L'IMPRESSION DE LA MONOGRAPHIE

1. OT. (31^a) CAUNICUS Stierl. Berl. 1872, 336.

Très-voisin, pour la taille et la forme, du *stricticollis* et n'en différant que par les caractères suivants : Prothorax plus étroit, largement étranglé à la partie postérieure, avec les granules plus élevés, plus luisants ; élytres beaucoup plus grossièrement rugueuses-granuleuses.

Allongé, noir avec les cuisses rouges, peu luisant, finement pubescent de gris. Tête parsemée de points fins ; yeux peu saillants ; front avec une petite fossette ; rostre plus long que la tête, robuste, avec une carène assez forte, limitée par deux sillons longitudinaux. Antennes grêles, pas plus longues cependant que la moitié du corps, tous les articles du funicule plus longs que larges, 2^e d'un tiers plus long que le 1^{er}. Prothorax cylindrique, plus long que large, un peu dilaté-arrondi avant le milieu, puis rétréci et un peu élargi de nouveau à la base même, de sorte que, vu en dessus, il paraît largement et légèrement étranglé au-devant de la base, ce qui rend les angles postérieurs pointus et saillants un peu en dehors ; très-densément couvert de granules brillants, assez saillants. Elytres tronquées droit à la base, puis médiocrement arrondies, chacune formant une pointe courte par derrière ; pas très-convexes, striées-ponctuées de points un peu anguleux ; interstries assez convexes, et couverts de granules assez gros, rugueux. Dessous finement granulé-ridé ; segment anal ♂ finement strié vers le bout. Pattes assez fortes, cuisses rouges, inermes ; jambes antérieures fortement courbées en dedans vers le bout. — Long. 11 — larg. ♂ 4, ♀ 5 mill.

Espagne.

2. OT. (67^b) ASTURIENSIS Chevrol. Har. Col. Heft v, 1869, 74, 8.

Très-noir, assez luisant, glabre, très-finement alutacé. Rostre allongé, plan au bout, tricaréné, finement ponctué, avec une fovéole frontale ; scape long, droit, un peu en massue, 1^{er} article du funicule presque de la longueur du 2^e, tous deux allongés, 3-7 noduleux presque égaux, massue ovale acuminée de 3 articles. Prothorax droit devant et derrière, presque plan, dilaté-arrondi après le milieu. Elytres ovales, obtusément avancées ensemble, alutacées. Cuisses en massue ; jambes très-arquées, antérieures terminées par un crochet, postérieures poilues de blanc en dedans et armées d'une forte dent vers le bout. Abdomen densément rugueux, 1^{er} segment largement déprimé ♂. — Long. 10 — larg. 4 mill.

Espagne, Asturies.

L'auteur le place près du *dentipes* Graëlls.

3. OT (79^b) VALACHIÆ Fuss. Sieb. Ver. 1868, 171. — Stierl. Berl. 1872, 361. = *crinipes* Mil. var.

Ovale, convexe, noir, tacheté de squamules cendrées, par ci par là, d'une teinte bronzée. Rostre plan, finement ponctué. Prothorax densément couvert de fins granules, plus densément pubescent en dessus. Elytres striées-ponctuées, atténuées par derrière, terminées chacune en pointe arrondie ; interstries un peu convexes, rugueux-granulés ; jambes ciliées en dedans. — Long. 12 — larg. 4,6 mill.

♂ Abdomen marqué d'une impression à la base, segment anal creusé au bout d'une profonde impression transverse, réfléchi et cilié de brun à son bord postérieur, jambes antérieures arquées au bout, intermédiaires et postérieures profondément échancrées en dedans, postérieures ciliées de longs poils en dedans.

Très-voisin du *cribrosus* ; un peu plus petit, il en diffère par une autre coloration des pattes, le prothorax plus petit, plus convexe, plus densément pubescent, tronqué droit par devant, et la profonde échancrure des jambes postérieures.

Il est bien plus voisin du *crinipes*, dont la description lui va parfaitement, seulement l'auteur mentionne une carène souvent indistincte sur le rostre, de sorte qu'ils pourraient être identiques.

Valachie.

4. OT. (91^a) CAUCASICUS Stierl. Berl. 1872, 321.

Oblong, noir, pattes brun-rouge, dessus assez densément couvert de squamules piliformes, d'un brillant doré, formant des taches sur les élytres. Rostre un peu plus long que la tête, densément, finement, un peu rugueusement ponctué, avec 3 légères et fines côtes, et des sillons longitudinaux néanmoins distincts, non étranglé à la base, Front assez large, densément ponctué comme le rostre; yeux assez grands, peu saillants. Antennes assez grêles; 2^e article du funicule 2 fois aussi long que le 1^{er}, les suivants obconiques, moins longs que larges, massue assez étroite. Prothorax bien plus étroit que les élytres, à peine plus large que long, assez arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu, étranglé ni en devant ni en arrière, densément garni de granules assez forts, pas arrondis, un peu irréguliers, disposés çà et là en rides; ni carène, ni sillon au milieu. Elytres assez brusquement élargies à la base, légèrement arrondies sur les côtés, subparallèles par derrière; la suture s'avance un peu comme dans le *chrysopterus*, et les élytres tombent perpendiculairement, assez convexes sur le dos, avec des rangées d'assez gros points, un peu anguleux; interstries peu convexes, assez densément garnis de granules un peu pointus. Pattes assez fortes, cuisses antérieures pas plus épaisses que les postérieures, inermes; jambes antérieures un peu arquées vers le bout, dépourvues de dents en dedans. — Long. 8 à 9 mill.

♂ Impressionné en dessous, segment anal pointillé, obsolètement fovéolé au bout. Ressemble beaucoup au *scapularis* Hoch. (*chrysopterus* Stierl.) pour la taille, le faciès, la sculpture, la squamosité, la forme des élytres, qui s'abaissent perpendiculairement par derrière par suite de la saillie de la suture, mais les cuisses sont iner-

mes et le prothorax beaucoup plus petit. Il appartient non au sous-genre *Tournieria*, mais au 8^e groupe.

Caucase.

5. OT. (97^a) SPOLIATUS Stierl. Berl. 1872, 322.

Très-voisin du *chalcus*, en particulier par la structure du rostre, la forme du prothorax et la sculpture des élytres, mais considérablement plus grand, plus allongé, et prothorax autrement sculpté; il ressemble, à première vue, à un *pupillatus*, plus déprimé, il en diffère par son rostre large, plan. Brun-rouge, assez densément garni de poils gris, fins et courts, qui en quelques places se changent en petites squamules d'un brillant métallique, réunies en forme de taches. Rostre à peine plus long que la tête, aussi large que le front, et aussi large que long, plan, avec une fine carène, densément ponctué-ridé longitudinalement, le front large, densément ridé. Antennes assez épaisses et à peine plus longues que le rostre, la tête et le prothorax ensemble; 2^e article du funicule un peu plus long que le 1^{er}, les autres globuleux, massue en ovale assez étroit, acuminé. Prothorax plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, un peu plus étroit devant que derrière, sans étranglement, légèrement convexe, densément garni de granules très-aplaties et peu saillants, émettant chacun un poil au milieu. Elytres en ovale oblong, planes, abruptement déclives par derrière, la suture s'élevant un peu par derrière, médiocrement striées-ponctuées, interstries légèrement convexes, très-finement ridées-alutacées, et obsolètement strigieuses transversalement. Dessous ridé-alutacé; pattes un peu courtes et peu épaisses, cuisses antérieures légèrement renflées en massue, toutes inermes, jambes droites. — Long. 7 — larg. 3 mill.

Silésie.

6. OT. (119^a) DEPRESSIOR. — *subdepressus* Stierl. Berl. 1872, 323.

Oblong, subdéprimé, luisant, brun de poix, antennes et pattes plus claires, parsemé de poils gris. Rostre pas plus long que la tête, large, plan, rugueusement ponctué, avec

une faible carène; yeux assez grands, peu saillants; antennes assez grêles, 2^e article du funicule un peu plus long que le 1^{er}, les suivants subglobuleux; massue assez étroite, acuminée. Prothorax à peine plus court que large, modérément arrondi sur les côtés, rudement ponctué sur le disque, granulé sur les côtés. Elytres ovales, terminées ensemble en pointe arrondie, rudement striées-ponctuées; interstries rugueusement granulés, avec des séries de soies. Pattes assez grêles; cuisses inermes, jambes droites, non dilatées au bout. Dessous ponctué. — Long. 7 — larg. 2 mill.

Ressemble d'une manière frappante au *marmota* pour le faciès, la taille et la forme, il s'en distingue tout d'un coup par ses cuisses inermes; en outre, le prothorax est ponctué sur le dos, les élytres sont plus lisses et plus luisantes, les interstries plus plans, moins distinctement granulés, plutôt avec les rides transverses du *Schleefini*.

Patrie inconnue.

7. OT. (150^a) CORONATUS Stierl. Berl. 1872, 324.

Diffère de l'*hypocrita* et de l'*uncinatus* par son prothorax ponctué, du *setifer* par sa forme beaucoup plus étroite, en particulier par ses antennes plus grêles, de l'*echinatus* par son prothorax plus large grossièrement ponctué, de l'*hispidus* par la structure des antennes, dont les 2 1^{ers} articles du funicule sont presque d'égale longueur. A peine plus long que le *lutosus*, il est plus large et surtout son prothorax est plus large. Noir de poix, antennes et pattes un peu plus claires, densément vêtu de squamules grises et tacheté, garni de soies blanchâtres, qui sont peu épaissies en dehors. Rostre à peine aussi long que la tête, plan, indistinctement caréné. Antennes grêles, scape arqué, les 2 1^{ers} articles du funicule presque d'égale longueur, le 2^e à peine plus long, les suivants aussi longs que larges; massue ovale, en pointe. Prothorax un peu plus large que long, modérément dilaté-arrondi sur les côtés, légèrement convexe en dessus, assez densément couvert de points ronds, assez grands, sétifères, bord postérieur garni d'un cercle de soies blanchâtres. Elytres aussi larges que le

prothorax à la base, puis un peu élargies, subparallèles, légèrement convexes, avec des stries de grands points ronds, indistinctement aciculés; interstries convexes, avec une rangée de soies plus longues. Pattes assez fortes, cuisses médiocrement épaissies, inermes, garnies de soies — Long. 4 mill.

Grèce.

8. OT. (151^a) GOBANZI Gredl. Har. Col. Hefte III, 1868, 74.

Ovale, noir, assez luisant, couvert d'une très-rare pubescence cendrée, antennes et pattes rousses; rostre faiblement caréné au milieu; prothorax court, dilaté-arrondi, onduleusement ponctué, granulé sur les côtés; élytres ovales, striées-ponctuées; interstries plans, pointillés; sa forme ainsi que ses cuisses inermes. — Long. 5,6 mill. (rostre exclus).

Se rapproche beaucoup de la forme des individus plus petits et plus glabres du *maurus* Gyll., mais la convexité régulière du prothorax et des élytres, et surtout son poli et son éclat, rappellent à première vue un *alpicola*; sa sculpture se rapproche aussi davantage de celle de ce dernier. Son prothorax n'est pas granulé sur le dos, mais muni d'un enfoncement semi-circulaire; les interstries des élytres sont plus plans, plus lisses et plus larges que dans le *maurus*, mais plus convexes et plus étroits que dans l'*alpicola*, marqués de quelques petits points fins; les antennes sont encore d'un jaune brunâtre plus clair que dans le *maurus*, mais la couleur et la structure des pattes sont comme dans ce dernier.

Tyrol, sous les pierres.

9. OT. (154^a) SERIEHIRTUS — *seriehispidus* Stierl. Berl. 1872, 325.

Bien plus petit que *trichographus*, semblable au *fulvipes* et au *monticola* pour le prothorax, au dernier en particulier pour la forme et la ponctuation, cependant les points sont un peu moins serrés que dans le *monticola*, il diffère de toutes les espèces voisines par la pubescence des élytres. Noir assez luisant, pattes jaune-rouge, jambes un peu plus foncées à la base, interstries des élytres garnis

de séries régulières de poils sétiformes, dressés, d'un gris-jaunâtre pâle. Rostre pas plus long que la tête, large, déprimé, grossièrement ponctué-ridé, avec la carène médiane légère; tête parsemée de petits points assez forts, tous d'égale grandeur et un peu plus serrés que sur le prothorax, celui-ci à peine plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu, de même largeur devant et derrière, un peu échancré au devant des angles postérieurs, qui sont droits, légèrement convexe, assez fortement et pas très-densément ponctué. Elytres ovales, assez convexes, avec des rangées de points régulières, interstries plans avec une rangée de points presque aussi grands et aussi serrés que ceux des rangées principales; sur les extérieurs, ils sont remplacés par des granules écrasés et indistincts; chaque interstrie est hérissée d'une rangée de poils sétiformes d'un gris jaunâtre. Pattes assez fortes, jambes un peu plus foncées à la base; antérieures un peu courbées au bout sans échancrure. Dessous ponctué-ridé.

— Long. 5 à 6 mill.

♂ Abdomen impressionné, segment anal avec une légère fossette.

Suisse, Neuchâtel.

10. OT. (165^a) **CRIBRATOSTRIATUS** Stierl. Berl. 1872, 326.

Très-voisin du *cribripennis*, auquel il ressemble pour la taille, la forme du prothorax, les antennes, les pattes; rostre plus étroit et plus long, moins rugueux, élytres de sculpture fort différente, par suite des stries étroites et de leurs points carrés, serrés. Noir, luisant, sans poils, faciès d'un *lamuginosus* et d'un *neglectus*; rostre plus long que la tête, largement impressionné, densément ponctué, points se réunissant par places pour former des strigosités longitudinales, sans carène médiane distincte; tête assez densément ponctué, sans fovéole frontale, convexe; antennes peu déliées, 2^e article du funicule un peu plus long que le 1^{er}, les autres plus larges que longs. Prothorax un peu plus large que long, assez arrondi sur les côtés, un peu plus rétréci devant que derrière, vaguement

punctué sur le dos, et densément granulé sur les côtés. Elytres en ovale oblong, presque parallèles, un peu déprimées, densément sillonnées de points carrés, profonds, serrés ; la sculpture des élytres se rapproche fort du *navaricus*, les interstries sont d'ordinaire plus étroites que les points, presque plans, les internes avec de fines rangées de points, les externes ridés. Dessous glabre ; pattes courtes, cuisses épaisses, sans dents ; jambes droites, ♂ segment anal légèrement impressionné, densément et assez finement punctué, garni de chaque côté de pinceaux de poils épars grisâtres. — Long. 15 — larg. 10 mill.

Grèce.

11. OT. (189^a) DIECKIDIUS — *Diecki* Stierl. Berl. 1872, 327.

Très-semblable à l'*impressipennis*, encore plus étroit surtout au prothorax ; se distingue du *picipes* et de toutes les espèces voisines par les 2 1^{ers} articles du funicule de même largeur, et par les dents fortes et pointues de toutes les cuisses. Noir de poix, élytres un peu plus claires, squamuleuses comme dans le *pupillatus* et le *subdentatus*, tantôt plus richement, tantôt moins. Rostre absolument pour la forme et la longueur comme dans le *pupillatus*, aussi finement ridé et peu squamuleux ; plus court, moins atténué au milieu que dans le *cancellatus*. Antennes comme celles du *picipes* pour la longueur, un peu plus grêles, cependant un peu moins que dans le *pupillatus*, les 2 1^{ers} articles du funicule de même longueur, les autres plus courts que larges ; massue en ovale court. Prothorax bien plus long que large, étroit, légèrement arrondi sur les côtés, également rétréci et aussi large devant que derrière, assez fortement granulé, sans sillon ni carène au milieu. Elytres sillonnées de points ocellés ; interstries étroits et fort élevés avec des rangées de soies. Pattes d'un brun de poix, jambes un peu plus claires, toutes les cuisses munies d'une dent pointue assez forte. — Long. 6 — larg. 2 mill.

Ce n'est probablement qu'une variété du *vernalis*.

Italie supérieure.

12. OT. (220^a) FUSCIVENTRIS Fuss. Sieb. Ver. 1868, 173. — Stierl. Berl. 1872, 362.

Noir, luisant, ovale, convexe; rostre marqué en dessus d'une impression longitudinale, finement caréné; prothorax densément et grossièrement granulé; élytres avec une pubescence nébuleuse grise ou bronzée, obsolètement striées; interstries subgranuleux; pattes et ventre bruns, cuisses dentées en dessous, postérieures plus visiblement. — Long. 9,6 à 11,2 — larg. 3,3 à 4,6 mill.

♂ Plus grêle, abdomen impressionné à la base; ♀ plus robuste, abdomen simple.

Appartient au groupe du *sulcatus*, et est voisin du *nigrita*, dont il se distingue par la couleur des pattes et du ventre, par les stries des élytres presque effacées, et n'étant reconnaissables que par les granules obtus des interstries qui vont en alternant.

Mont Butetsch, près de Kronstadt, dans les Carpathes.

12^a OT. (224^a) BRUCKENSIS — *Brucki* Stierl.

Ovale-oblong, noir, tête et prothorax pubescents de noir, élytres glabres; parsemé de taches peu nombreuses de squamules piliformes ou lancéolées. Rostre de moitié plus long que la tête, impressionné, finement caréné; tête distinctement ponctuée; antennes fortes, scape robuste, 2^e article du funicule de moitié plus long que le 1^{er}, externes subglobuleux; prothorax à peine plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés, densément et visiblement granulé; élytres ovales-oblongues, arrondies par derrière, profondément striées-ponctuées, interstries étroits, rugueusement granulés; toutes les cuisses armées d'une forte dent. — Long. 9 — larg. 4 mill.

Voisin du *funicularis*, plus robuste, il en diffère surtout par le scape des antennes plus fort, le rostre caréné, le prothorax plus large, bien plus distinctement granulé, les élytres moins rétrécies par derrière, les fovéoles des stries plus profondes, presque carrées.

Grèce.

13 OT. (239^a) RIESSI Fuss. Sieb. Ver. 1868, 362, 175.

Ovale-oblong, convexe, noir, luisant; rostre ponctué, canaliculé; prothorax pas plus long que large, médiocrement arrondi sur les côtés, couvert de gros granules serrés. Elytres ovales, à 10 stries ponctuées; interstries subconvexes, vaguement rugueux, distinctement granulé ♂; cuisses échancrées en arc en dessous avant l'extrémité, postérieures armées d'une dent aiguë. — Long. 10,3 à 11,6 — larg. 3,8 à 5,3 mill.

♂ Plus étroit, abdomen impressionné à la base, segment anal fovéolé au bout, interstries des élytres granulés, cuisses postérieures munies à l'angle interne de l'échancrure d'une grande dent aiguë, et à l'angle externe d'une plus petite; jambes postérieures avec une entaille dentée à la base et au même point d'une impression transversale sur le côté. ♀ Plus robuste, élytres un peu plus larges, stries plus obsolètes, interstries seulement rugueux, base de l'abdomen et jambes postérieures simples.

Se reconnaît de toutes les espèces connues jusqu'ici par la structure particulière des pattes postérieures. Il vient après le *granicollis*.

Mont Butetsch, près Kronstadt.

14. OT. (263^a) IRREGULARIS Stierl. Berl. 1872, 327.

Oblong, brun de poix, pubescent de gris; rostre un peu plus court que la tête, rugueusement ponctué, avec une fine carène; antennes assez grêles, 2^e article du funicule un peu plus court que le 1^{er}. Prothorax ponctué-rugueux de points serrés et profonds, un peu plus long que large, médiocrement arrondi sur les côtés. Elytres profondément striées-ponctuées, interstries étroits convexes, avec des granules rugueux obsolètes. Cuisses antérieures un peu plus épaisses, toutes armées d'un petit denticule; jambes antérieures un peu courbées en dedans vers le bout. — Long. 5 à 6 mill.

Forme intermédiaire entre le 29^e groupe et le 3^e du sous-genre *Tournieria*, se rapprochant de celui-ci par le prothorax séparé du corps, ses cuisses plus renflées et la brièveté du 2^e article du funicule des antennes; mais il

ressemble tellement au *gracilis* pour la forme et le faciès, qu'il doit se placer près de lui.

Ressemble beaucoup pour la taille et le faciès au *gracilis* et au *provincialis*, mais il s'en distingue tout de suite par le prothorax densément et profondément ponctué, le dessous densément et grossièrement ponctué, les pattes brun-rouge, la pubescence simple et la structure des antennes, dont les articles externes sont à peine plus longs que larges.

Grèce ?

14^a OT. (267^a) LEDERERI Stierl.

Ovale, noir, assez luisant, pas très-densément garni de squamules grises; rostre 1 fois 1/2 plus long que la tête, densément ponctué; yeux médiocrement saillants; prothorax transverse, densément et finement granulé; élytres en ovale court, convexe, obsolètement striées, finement granulées; cuisses dentées. — Long. 10 — larg. 5 mill.

Taille et forme de l'O. *ligustici*, il en diffère par son rostre plus long, les yeux moins saillants, son prothorax plus densément et finement granulé, et tout son corps couvert de squamules grises peu serrées.

Asie mineure.

15. OT. (287^a) ROTUNDUS — *rotundatus* Siebold, Prus. Prov. Blat. 1837, 431. — Bach. Kæf. Fn. 279. — Stierl. Berl. 1872, 328.

Ovale-court, mat, brun de poix, antennes et pattes plus claires, rougeâtres, parsemé de squamules très-petites, grisâtres, d'un éclat métallique dans les individus frais, en forme de taches sur les élytres. Rostre aussi long que la tête, assez large, plan, avec une très-fine carène, très-finement ridé-ponctué; yeux assez saillants. Antennes plus longues que la tête et le prothorax ensemble, assez déliées, 2^e article du funicule 2 fois aussi long que le 1^{er}, les autres globuleux, massue en pointe. Prothorax presque globuleux, cependant médiocrement convexe en dessus, fortement arrondi sur les côtés, plus large que long, très-densément garni de fins granules. Elytres en ovale court, subglobuleuses, assez convexes, assez arrondies ensemble par derrière; des sillons assez profonds, pas

très-distinctement ponctués, interstries un peu convexes et finement granulés-ridés. Pattes assez robustes, cuisses antérieures claviformes et armées d'une forte dent qui est échancrée au bout et presque fendue; cuisses intermédiaires et postérieures bien moins épaissies et très-légèrement dentées. Jambes antérieures peu arquées au bout. — Long. 3,7 — larg. 2 à 2,3 mill.

Semblable à *l'ovatus* et à ses voisins par la dent bifide des jambes antérieures, s'en distingue par sa forme courte, ses élytres globuleuses et son prothorax finement et densément granuleux.

Prusse, Danzig.

16. OT. (297^a) *VILLOSUS* Stierl. Berl. 1872, 329.

Diffère de toutes les espèces du sous-genre par la double pubescence du corps, l'une à longs poils, l'autre dense et assez longue, et semblable en cela au *maxillosus*; il ressemble, pour la taille et la forme, au *tomentosus* et à l'*humilis*, un peu plus petit que le 1^{er}, bien plus large aux élytres et au prothorax, plus fortement arrondi sur les côtés et un peu plus densément ponctué; le 2^e article du funicule des antennes est aussi plus long. Il s'éloigne de l'*humilis* par son prothorax plus court, plus fortement arrondi sur les côtés.

Ovale-allongé, noir de poix, antennes et pattes rougeâtres, assez densément couvert d'un duvet gris couché, et en outre d'assez longs poils dressés. Rostre semblable à celui du *tomentosus* sous tous les rapports, légèrement impressionné et indistinctement ridé-ponctué. Antennes aussi longues que la moitié du corps, assez déliées, 2^e article du funicule presque de moitié plus long que le 1^{er}, les autres un peu plus larges que longs. Prothorax distinctement plus large que longs, assez arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu après le milieu, assez convexe, sans carène, assez densément et finement ponctué. Elytres conformées comme dans le *maxillosus*, avec des stries ponctuées assez fortes, et des interstries plans, indistinctement et finement ridés. Dessous et pattes du *tomentosus*. — Long. 6 — larg. 2,3 mill.

Grèce.

17. OT. (300^a) HELLENICUS Stierl. Berl. 1872, 330.

Tête et prothorax comme dans le *neapolitanus*, élytres comme dans le *pulchellus*, seulement un peu plus larges, prothorax encore plus finement ponctué. Noir de poix, avec les pattes plus claires, finement pubescentes de gris. élytres tachetées de squamules piliformes métalliques, rostre légèrement impressionné et rugueusement ponctué; front luisant, pas densément ponctué. Antennes déliées, 2^e article du funicule un peu plus long que le 1^{er}. Prothorax plus large que long, assez fortement arrondi sur les côtés, très-finement caréné dans sa longueur, très-densément et finement ponctué. Elytres profondément sillonnées-ponctuées, interstries convexes et très-finement ponctués-rugueux. Dessous lisse, luisant, avec de gros points. Cuisses inermes; jambes antérieures légèrement arquées vers l'extrémité. — Long. 5 mill.

♂ Ventre à peine impressionné, segment anal très-finement strigueux.

Grèce, Acarnanie.

18. OT. (301^a) GRAVIDUS Stierl. Berl. 1872, 330.

Forme courte et large de l'*unctuosus* et du *hebraeus*; élytres encore plus courtes, plus larges et plus convexes, rostre plus long, distinctement canaliculé.

Brun, peu luisant; antennes et pattes rougeâtres, parsemé de courtes et fines soies. Rostre un peu plus court que la tête, avec un fort sillon, s'avancant un peu sur le front, au fond duquel on aperçoit une courte carène très-légère. Antennes peu plus longues que la tête et le prothorax ensemble, déliées, les 2 1^{ers} articles du funicule d'égale longueur, les autres un peu plus courts que larges. Prothorax grand, assez convexe, fort arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au dernier tiers, par conséquent plus large à la base qu'au bout, densément et assez finement ponctué avec une carène indistincte. Elytres un peu plus longues que larges, fortement ventrues et assez convexes, avec d'assez fortes stries et ponctuées; interstries peu convexes, marqués de rides transverses, qui portent une rangée de fines et courtes soies. Pattes

courtes ; cuisses antérieures médiocrement épaissies, sans dents ; jambes droites. Dessous luisant, assez grossièrement ponctué. — Long. 4 — larg. 2 mill.

Grèce.

19. OT. (301^a) ANNIBALI Stierl. Berl. 1872, 331.

Ovale-oblong, opaque, brun de poix, antennes et pattes rousses ; rostre pas plus long que la tête, obsolètement ponctué et caréné ; antennes médiocres, 2 1^{ers} articles du funicule d'égale longueur ; prothorax presque plus long que large, arrondi sur les côtés, densément couvert en dessus de grands points subocellés et sétifères. Elytres ovales-oblongues, subconvexes, sillonnées-ponctuées ; interstries subcarénés, rugueux transversalement et avec des séries visibles de granules sétifères. Pattes médiocres ; cuisses mutiques ; jambes antérieures droites, dilatées au bout. — Long. 3,6 mill.

Ressemble extrêmement au *planithorax*, prothorax sculpté de même, structure du rostre, des antennes et des pattes semblable, mais plus allongée, prothorax presque plus long que large, élytres plus étroites, moins déprimées, avec des interstries plus convexes, marqués de séries distinctes de granules.

Syrie.

20. OT. (302^a) PONTICUS Stierl. Berl. 1872, 333.

Ressemble beaucoup au *poricollis* et au *foveicollis*, particulièrement au dernier pour la taille et la forme, il s'en distingue par le prothorax bien plus finement et plus vaguement ponctué. Noir, assez luisant, glabre, antennes, bord externe des jambes et tarses d'un noir de poix ; rostre aussi long que la tête, plan, parsemé seulement sur les côtés de petits points, légèrement caréné ; front finement, vaguement ponctué ; yeux presque pas saillants. Antennes courtes, les 2 1^{ers} articles du funicule d'égale longueur, les autres plus larges que longs. Prothorax subglobuleux, plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, un peu plus étroit en devant qu'à la base, mais parsemé de points assez fins, et sur les côtés de gros gra-

nules ruguleux. Elytres en ovale court, subglobuleuses, terminées en pointe très-courte, très-finement ponctuées, les petits points forment des rangées dont les intervalles sont vaguement pointillés; de légères lignes longitudinales élevées se laissent à peine reconnaître, comme dans l'*atreoupterus*. Pattes assez fortes, noires, jambes vers le bout et tarses un peu d'un noir brunâtre; cuisses assez épaissies, jambes droites, sans échancrure; antérieures à peine arquées vers le bout; sans doute plus distinctement dans ♂. — Long. 5 — larg. 3 mill.

Alpes-Pontiques.

20a. OT. (302a) SEMITUBERCULATUS Stierl.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre; antennes et pattes d'un brun de poix; tête couverte de points distincts assez écartés; rostre pas plus long que la tête, distinctement ponctué, caréné; antennes assez grêles, 2^e article du funicule un peu plus long que le 1^{er}, externes obconiques, un peu plus larges que longs; massue allongée, étroite; prothorax beaucoup plus large que long, très-dilaté-arrondi sur les côtés, à points fins et écartés; élytres en ovale court, polies, sérialement ponctuées, interstries avec une série de points en avant, granulés par derrière; cuisses antérieures en massue, à dent aiguë; postérieures moins épaisses, à dent obsolète. — Long. 6 à 7 — larg. 3 mill.

Taille et forme de l'O. *semigramulatus*, il en diffère par ses antennes un peu plus grêles, sa massue beaucoup plus étroite et plus longue, son prothorax finement et peu densément ponctué.

Syrie, Antioche.

21. OT. (302g) MESSENICUS Stierl. Berl. 1872, 332.

Très-voisin du *cribrosicollis*, il paraît en différer par l'absence de pubescence, le rostre sans carène et les pattes noires. Entièrement noir, tarses d'un brun de poix, luisant, sans poils. Rostre court, plan, ponctué avec des rides longitudinales, sillon médian léger, peu distinct. Prothorax à peine plus large que long, assez fortement

arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au-delà du milieu, de même largeur devant et derrière, couvert de points gros et profonds, pas très-denses sur le dos, très-denses sur les côtés. Elytres en ovale allongé, légèrement arrondies sur les côtés, ayant leur plus grande largeur au milieu, légèrement convexes, avec des rangées de points assez grands, assez rapprochés, cependant beaucoup plus fins que ceux du prothorax; interstries plus larges que les stries, plans, très-finement et indistinctement ridés, avec une rangée de points très-fins et réguliers. Dessous indistinctement granulé-ridé; pattes noires, cuisses assez épaisses, inermes; jambes droites.

♂ Dessous fortement impressionné, segment anal avec une impression longitudinale au milieu, qui devient plus profonde par derrière ou se termine en une fossette.

Var. Rostre sans canal, points du prothorax un peu plus serrés et un peu plus fins. Se distingue du *poricollis* par son prothorax bien plus grossièrement ponctué, sa forme plus élancée, sa couleur foncée, ses élytres non granulés par derrière; — du *foveicollis*, par son prothorax plus long et plus étroit; — du *glabratus*, par son prothorax plus grossièrement ponctué; — du *rutilipes*, par sa taille moindre, ses pattes foncées, son rostre sans carène, son prothorax ponctué sur les côtés; — du *pseudomias* et du *pullus*, par son prothorax ponctué; — du *politus*, par son prothorax ponctué sur les côtés, son rostre plus court, sans carène; — de l'*obscurus*, par son prothorax plus long; — du *perplexus*, par son prothorax glabre, plus étroit, par les interstries finement et sérialement ponctués; — du *bardus*, par son rostre sans carène, ses pattes obscures et son prothorax non rugueusement ponctué.

Grèce.

22. OT. (324^a). LONGIPES Stierl. Berl. 1872, 335.

Ne ressemble pas trop mal à un petit *armadillo* ♂, avec le prothorax plus étroit; son prothorax écarté du corps et ses pattes antérieures fort développées, le placent dans le sous-genre *Tournieria*. Très-rapproché du *brachialis* Sch. à cause de la sculpture du dessus et de la structure des

pattes, il s'en distingue par son prothorax visiblement plus long que large, à peine arrondi sur les côtés. Noir, presque mat, finement pubescent de gris; rostre à peine plus long que la tête, avec une légère carène, sans sillon, légèrement étranglé à la base, finement rugueux-punctué. Front légèrement convexe, punctué comme le rostre; yeux grands, peu saillants. Antennes déliées, tous les articles du funicule plus longs que larges, 2^e de moitié, plus long que le 1^{er}; massue ovale-oblongue en pointe. Prothorax plus long que large, très-peu arrondi sur les côtés, graduellement rétréci par devant, séparé des élytres par derrière, plus large que par devant, densément granulé, avec un léger sillon médian. Elytres en ovale assez court, un peu ventruës, rétrécies par derrière, sillonnées-punctuées, avec les interstries assez grossièrement punctuées. Pattes longues et grêles, cuisses antérieures renflées en massue, avec une dent forte, pointue, dont le bord externe est finement denticulé; les intermédiaires avec une petite dent pointue; les postérieures inermes; jambes presque droites, les antérieures indistinctement dentelées en dehors.

La ♀ seule est connue; probablement le ♂ a les jambes de devant arquées et distinctement dentelées en dedans. — Long. 7,5 — larg. 4 mill.

Curie.

23. OT. (89^c) PHASMA Rottenb. Berl. 1871, 225, pl. viii f. 1 et 1^a.

Allongé, subdéprimé, brun ferrugineux, garni d'une courte pubescence jaune épars. Antennes pas très-longues et assez fortes; 2^e article du funiculé un peu plus long que le 1^{er}, les 5 suivants moniliformes; massue petite, ovale-oblongue, acuminée. Tête finement punctuée. Rostre assez grossièrement rugueux avec de fortes ptéryges, marqué d'une large impression au-devant des antennes, d'une fovéole entre les yeux et d'un sillon longitudinal large et superficiel, limité de chaque côté par une légère carène. Yeux petits, déprimés, assez rapprochés en dessus. Prothorax aussi large que long, subdéprimé, plus rétréci devant que derrière, arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au-delà du milieu, à gros points ombiliqués, serrés, plus petits vers les bords. Elytres plus d'une demi-fois aussi larges que le prothorax, déprimées, allongées, très-peu élargies sur les côtés, avec 10 stries de gros points ocellés, serrés, peu profonds, 3^e se réunissant avec la 6^e; interstries très-peu convexes, gar-

nis par derrière de rangées de poils jaunâtres courts ; il y a en outre quelques légères taches jaunâtres de soies squamuliformes. Abdomen grossièrement ponctué, surtout au segment anal. Cuisses grêles et inermes. Jambes droites. — Long. 7 mill.

Sicile ; au pied d'un vieux chêne, près de l'Etna.

24. OT. (120^b) PLANOPHTHALMUS Heyd. Ent. Reise Span. 1870, 151.

Etroit, allongé, noir de poix, sans squamules, mais garni de poils dorés peu serrés. Antennes grêles dépassant le milieu du corps, 2^e article du funicule plus long que le 1^{er}. Rostre deux fois plus long que la tête, canaliculé au milieu, creusé d'une forte fovéole entre les yeux, qui sont déprimés, petits, n'ayant des facettes qu'au milieu. Prothorax oblong, convexe, arrondi sur les côtés, à grands points enfoncés. Elytres allongées, subdéprimées, fortement déclives par derrière, à rugosités transversales, légèrement striées-ponctuées ; interstries avec des séries de granules qui portent une soie flave. Cuisses en mas-sue, inermes.

♀ 1^{er} segment ventral marqué d'une impression ; 2^e d'une large fossette transverse ; 3, 4, 5 étroits avec un profond sillon transverse ; dernier fortement ponctué, impressionné au bout. Long. 8 mill. — ♂ 1-2 segments creusés plus fortement que 3 et 4, dernier avec un point apical ; 1^{er} article du funicule de la longueur du 2^e. Long. 7 mill.

Voisin de l'*affuber*, mais bien plus grand ; il a le rostre et les antennes plus longs, les élytres déclives par derrière ; ses yeux petits et déprimés le rapprochent des *Trogloorhynchus*.

Espagne, Sierra-Nevada.

25. OT. (198^a) HETEROMORPHUS Rottenb. Berl. 1871, 226.

Noir de poix, allongé, subdéprimé, garni de courtes soies jaunâtres, peu serrées. Rostre court, à peine impressionné, ptéryges saillantes. Antennes courtes et robustes, garnies de soies, scape un peu arqué, 2^e article du funicule un peu plus long que le 1^{er}, massue assez forte en ovale oblong. Yeux petits et peu convexes. Tête assez finement ponctué-ridée. Prothorax presque aussi long que large, aussi large devant que derrière, arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur après le mi-

lieu, couvert de gros points ombiliqués, serrés. Elytres allongées, 2 fois $1/2$ aussi longues que le prothorax, et 1 fois $1/2$ aussi larges que lui, déprimées, avec de fortes stries d'assez gros points ocellés, interstries étroits, un peu convexes, à rangées de soies jaunes, inclinées par derrière, qui, condensées par places, forment de légères taches. Cuisses robustes, postérieures distinctement dentées, antérieures échancrées en angle; toutes les jambes un peu arquées; segments de l'abdomen fortement ponctués, dernier plus densément. — Long. 6,5 mill.

Ressemble beaucoup, pour la forme, à l'*affaber*, dont il diffère par ses points ombiliqués et son pronotum sans granules.

Sicile.

26. OT. (232^a) EGREGIUS Mill. Zool. Bot. Ver. Wien. 1870, xx, 220.

Ovale-oblong, très-noir et luisant. Rostre à points écartés, avec une impression médiane et une carène longitudinale. Prothorax alutacé, médiocrement arrondi sur les côtés, squamuleux en dessous. Elytres marquées de rugosités transverses, striées-ponctuées; squamuleuses vers le bout. Jambes droites. — Long. 9 à 10 mill.

♂ Plus petit, rétréci; élytres à stries ponctuées plus profondes; segment anal sans fovéole. — ♀ Plus grande, à élytres plus larges, obsolètement striées-ponctuées.

Très-voisin et sans doute une simple variété du *Kratteri*, il ne s'en distingue que par sa forme, les élytres ♂ plus fortement striées-ponctuées, sa taille moindre dans les deux sexes, et l'absence de taches squamuleuses.

Carpathes de la Gallicie, sur les pins, avec le *Kratteri*.

27. OT. *Trogloorhynchus* (346) LATIROSTRIS Bargagli, Soc. ent. Ital. 1871, p. 37, f. 1.

Ferrugineux, luisant, allongé, convexe; rostre dilaté antérieurement, bicaréné, pointillé, pubescent. Prothorax ovale, tronqué droit devant et derrière, rudement ponctué-ocellé, ligne médiane luisante, un peu élevée raccourcie. Elytres subparallèles, régulièrement et profondément striées-ponctuées. Cuisses inermes, jambes épineuses en dedans. — Long. 5,5 à 6 mill.

Entre les grandes espèces du genre, se distingue du *camaldulensis*, de l'*anophthalmus* et du *Martini*, par le funicule des antennes plus gros, le prothorax plus globuleux, plus fortement ponctué, la ligne médiane moins

large, les cuisses non dentées, et les jambes armées d'épine en dedans.

La stature, le rostre bicaréné et le prothorax moins allongé l'éloignent du *terricola* et du *Grenieri*; il a la tête obconique jusque vers les deux tiers de sa longueur, où elle s'élargit en arc antérieurement pour former deux dilatations latérales creuses, où prend son origine la scrobe qui va en s'atténuant en marchant parallèlement à la plus grande dimension du rostre; celui-ci est bicaréné sur le devant, ponctué, pubescent, tandis que la partie postérieure de la tête est quasi glabre. Aucun indice d'yeux. Antennes assez longues pour dépasser la base des élytres, le scape qui en fait la moitié dépasse le bord antérieur du prothorax. Prothorax très-convexe, court, ovale, droit et de même largeur devant et derrière, couvert de gros points ombiliqués, laissant dans son milieu un espace longitudinal lisse, linéaire, un peu plus élevé en forme de carénule, sinueux par suite des gros points alternes qui le côtoient, raccourci et n'atteignant pas les bords, dont le basal est seul légèrement rebordé. Elytres plus larges et 4 fois environ plus longues que le prothorax, ovales, très-déprimées, subparallèles, convexes supérieurement, un peu déprimées vers la base, avec de gros points sérialement disposés. Poils fauves épars et rares, sur tout le corps, plus distincts sur le scape et les jambes, et plus fins. Pattes fortes, peu longues, cuisses renflées, sans épines; jambes courbées et épineuses en dedans.

Montagnes dans le voisinage de Sienne, sous des blocs de marbre; assez abondant.

28. STOMODES (4) ANGUSTATUS Stierl. Berl. 1872, 335.

Allongé, brun de poix, luisant; élytres avec des séries de poils gris; rostre très-court, rugueusement ponctué; antennes médiocres, 1^{er} article du funicule plus long que le 2^e, les autres un peu plus larges que longs; prothorax plus long que large, peu arrondi sur les côtés, distinctement ponctué de points assez écartés sur le disque, plus serrés sur les côtés. Elytres oblongues, distinctement striées-ponctuées; interstries presque plans, avec des séries de points assez peu nombreux et de poils; pattes plus courtes; cuisses claviformes, armées d'une dent aiguë; antérieures à peine plus épaisses. — Long. 4 — larg. 1 mill.

Grèce, Attique.

TABLEAU ANALYTIQUE

DES ESPÈCES DU GENRE OTIORHYNCHUS

PAR LE Dr G. STIERLIN

Président de la Société entomologique suisse.

Pour faciliter la détermination si difficile des nombreuses espèces du genre *Otiorhynchus*, j'ai entrepris de donner une série de tableaux synoptiques des espèces de chacun des groupes que je m'étais borné à établir dans mes travaux précédents. Il y a bien peu d'espèces que je n'aie pas vues; cependant j'en ai admis quelques-unes de cette catégorie, mais j'ai dû rejeter toutes celles dont la description n'est pas assez précise pour y être placées avec sûreté.

La *synopse* des groupes n'a presque pas subi de changements.

G. STIERLIN.

SYNOPSIS COHORTUM GENERIS OTIORHYNCHUS

SUBGENUS I. — **DODECASTICHUS**. Elytris 12-13-striatis.

SUBGENUS II. — **OTIORHYNCHUS**. Elytris 10-striatis; tibiis anticis apice non dilatatis; capite prothorace que mediocribus.

§ I. — **femoribus muticis.**

COHORS.

- | | |
|---|----|
| A4 Segmentum anale ♂ striatum; funiculi antennarum articulo 2° primo longiore..... | I |
| A3 Segmentum anale ♂ laud striatum; funiculi antennarum articulo 2° primo brevior..... | II |
| A2 Segmentum anale ♂ punctatum sive foveolatum; tibiis intermediis ante apicem emarginatis..... | V |
| A1 Segmentum anale ♂ plerumque aciculatum, planum aut subfoveolatum. | |

COHORS.

| | | |
|----|--|------|
| B2 | Oculis approximatis; fronte angusta, plana. | |
| C2 | Interstitiis elytrorum elevatis..... | XIII |
| C1 | Interstitiis elytrorum æqualibus. | |
| D2 | Interstitiis elytrorum non setosis. | |
| E2 | Prothorace transverso, longitudine multo latiore | IV |
| E1 | Prothorace longitudine non aut vix latiore. | |
| F2 | Corpore supra glabro vel subglabro, pectore villosa. | III |
| F1 | Corpore supra hirsuto nunquam pectore densius quam elytris villosa. | |
| D1 | Elytrorum interstitiis seriatim setosis. | |
| E2 | Elytrorum stria 3 ^a cum 6 ^a postice juncta | VII |
| E1 | Elytrorum stria 3 ^a cum 8 ^a postice juncta. | |
| F5 | Elytris dense squamosis. | |
| G3 | Corpore elongato, angustato | IX |
| G2 | Corpore lato, plano, ocellato-punctato..... | XIV |
| G1 | Corpore ovato, vel breviter ovato, ocellato-punctato | XV |
| F4 | Elytris maculatim squamosis, squamulis plerumque metallicis; rostro fere semper sulcato..... | VIII |
| F3 | Elytris subglobosis, densius vel parcius squamosis, squamulis opacis; corpore plerumque indumento terroso vestito..... | XI |
| F2 | Elytris hirsutis, sine squamulis..... | X |
| F1 | Elytris glabris (setulis serialibus interstitiorum exceptis)..... | XII |
| B1 | Oculis lateralibus, fronte inde lata, transversim convexa. | |
| C2 | Corpore supra squamulis piliformibus vel pilis depressis densius induto | XVI |
| C1 | Corpore supra glabro vel parce piloso | XVII |

§ II. — Femoribus dentatis.

| | | |
|----|--|--------|
| A2 | Interstitiis elytrorum alternis elevatis..... | XXVIII |
| A1 | Interstitiis elytrorum omnibus æqualibus. | |
| B2 | Elytris squamosis, ocellatis..... | XVIII |
| B1 | Elytris non aut parce squamosis, nec ocellatis. | |
| C2 | Corpore elongato, subdepresso | XXIII |
| C1 | Corpore ovato vel oblongo-ovato. | |
| D2 | Tibiis posticis ♂ apice emarginatis..... | XXVI |
| D1 | Tibiis posticis ♂ apice haud emarginatis. | |
| E4 | Antennis gracilibus, funiculi articulo 2 ^o primo ple- | |

| | | |
|---|---|-------|
| rumque longiore; elytris parce pilosis aut glabris. | | |
| F3 | Elytris profunde punctato-striatis, interstitiis rude granulatis, rostro fere semper sulcato. | |
| G2 | Stria 3 ^a elytrorum postice cum 6 ^a conjuncta. | |
| H2 | Elytris glabris, plerumque viridi-squamosis..... | XIX |
| H1 | Elytris hirsutis, testaceo-squamosis..... | XXI |
| G1 | Stria 3 ^a elytrorum postice cum 8 ^a conjuncta. | |
| H2 | Elytris glabris, squamulis rotundatis maculatim obsitis..... | XX |
| H1 | Elytris pilosis, non squamosis, vel squamulis piliformibus indutis..... | XXII |
| F2 | Elytris dense granulatis, substriatis..... | XXIV |
| F1 | Elytrorum interstitiis planis vel subconvexis, remote rugosis..... | XXV |
| E3 | Antennis subgracilibus; corpore sat dense piloso.... | XXIX |
| E2 | Antennis subgracilibus; corpore squamulis piliformibus vestito..... | XXXI |
| E1 | Antennis brevibus, crassis, fnniculi articulo 2 ^o primo parum longiore. | |
| F2 | Corpore crasso, magno, obeso. | |
| G2 | Elytris glabris vel parce setosis aut squamosis | XXVII |
| G1 | Elytris dense griseo-squamosis et pilosis..... | XXX |
| F1 | Corpore minuto, parce piloso vel glabro | XXXII |

SUBGENUS III. — **EURYCHIRUS.** Elytris 10-striatis; femoribus plerumque muticis, tibiis anticis utriusque sexus semper rectis, apice dilatatis; prothorace elytris adpresso, plerumque lato, abdomine semper glabro, nitido, rude remote punctato; corpore plerumque colore brunneo, segmento anali ♂ interdum subtiliter striato.

SUBGENUS IV. — **TOURNIERIA.** Elytris 10-striatis, capite prothoraceque magnis, pedibus anticis posticis fortioribus; prothorace elytris non adpresso, inde mesothorace conspicuo.

| | | |
|----|--|-----|
| A2 | Femoribus muticis..... | I |
| A1 | Femoribus dentatis. | |
| B2 | Elytris squamosis vel hirsutis, sutura postice carinata... | II |
| B1 | Elytris glabris vel parce pilosis..... | III |

SYNOPSIS ANALYTICA SPECIERUM.

SUBGENUS I. — **DODECASTICHUS.**

| | PAGES. |
|---|------------------------------|
| A2 Elytris ♂ postice lateribus carinatis. | |
| B2 Capite medioeriter lato. | |
| C2 Elytris breviter ovatis. | |
| D2 Elytris profunde punctato-striatis, interstitiis convexis. | |
| | 9 <i>inflatus</i> . 117 |
| D1 Elytris subtiliter punctato-striatis interstitiis planis. | |
| | 6 <i>lauri</i> . 116 |
| C1 Elytris oblongo-ovatis. | |
| D2 Prothorace elytris subtiliter granulatis... 10 <i>Heydeni</i> . | 119 |
| D1 Prothorace elytris fortius granulatis. | |
| E2 Segmento anali ♂ fasciculato; prothorace densius et fortius granulato; elytris postice perpendiculariter declivibus..... | 8 <i>geniculatus</i> . 116 |
| E1 Segmento anali ♂ non fasciculato; prothorace subtilius granulato; elytris postice minus prærupte declivibus. | |
| | 1 <i>pulverulentus</i> . 109 |
| B1 Capite lato. | |
| C2 Prothorace longitudine multo latiore, subtiliter granulato. | |
| | 5 <i>consentaneus</i> . 114 |
| C1 Prothorace longitudine parum latiore, rude granulato. | |
| | 7 <i>dolomitæ</i> . 115 |
| A1 ♂ Elytris postice lateribus non aut sub-carinatis. | |
| B2 Articulis antennarum externis latitudine non longioribus vel brevioribus. | |
| C2 Elytris breviter ovatis, subtiliter striatis et granulatis. | |
| | 12 <i>dulcis</i> . 121 |
| C1 Elytris oblongo-ovatis, minus subtiliter granulatis. | |
| D2 Prothorace longiore; elytris maculatis, rude rugoso-granulatis..... | 3 <i>contractus</i> 112 |
| D1 Prothorace brevior; elytris immaculatis, subtiliter rugoso-granulatis..... | 2 <i>obsoletus</i> 111 |
| B1 Articulis ant. externis gracilibus, latitudine longioribus. | |
| C2 Prothorace elytris fortius granulatis et striatis. | |
| | 4 <i>dalmatinus</i> 112 |
| C1 Prothorace elytris subtilius granulatis. | |

| | | | |
|--|----|------------------|-----|
| D2 ♂ ♀ forma fere æquali. Long. 7-10 mill. | 11 | <i>pruinus</i> . | 120 |
| D1 ♂ forma multo angustiore. Long. 5-7 mill... | 13 | <i>mastix</i> . | 122 |

SUBGENUS II. — OTIORHYNCHUS.

COHORS I.

| | | | |
|---|-----|-------------------------|-----|
| A2 Elytra ♂ depressa et plerumque latiora. | | | |
| B2 Corpus supra granulatum, granulis non confluentibus. | | | |
| C2 Articulis 4-7 funiculi ant. latitudine longioribus. | | | |
| D2 Subremote granulatus..... | 14 | <i>rhacusensis</i> . | 123 |
| D1 Confertim granulatus..... | 15 | <i>goerzensis</i> . | 124 |
| C1 Articulis 4-7 funiculi ant. longitudine latioribus. | | | |
| | 16 | <i>spalatrensis</i> . | 125 |
| B1 Corpus granulis confluentibus sparsum. | | | |
| C2 Elongatus; elytris latitudine fere duplo longioribus. | | | |
| D2 Elytris obsolete striatis..... | 17 | <i>caudatus</i> . | 127 |
| D1 Elytris evidenter striatis..... | 19 | <i>planatus</i> . | 133 |
| C1 Oblongus; elytris latitudine sesqui-longioribus. | | | |
| D2 Elytris regulariter striatis, squamosis aut glabris aut pilis adjacentibus vestitis. | | | |
| E2 Elytris metallico-squamosis. | | | |
| F2 Femoribus rufis. | | | |
| G2 Prothorace latitudine longiore. | 20 | <i>sabulosus</i> . | 134 |
| G1 Prothorace latitudine haud longiore. | | | |
| H2 Prothorace remote granulato; elytris maculatis squamosis | 21 | <i>latipennis</i> . | 158 |
| H1 Prothorace confertim granulato; elytris squamositate punctiformi vestitis..... | 32 | <i>europunctatus</i> . | 169 |
| F1 Femoribus nigris..... | 22 | <i>aurifer</i> . | 135 |
| E1 Elytris non squamosis aut squamulis pallidis, cinereis vestitis. | | | |
| F2 Pedibus nigris. | | | |
| G3 Supra, praesertim in prothorace, confertim evidenter granulatus..... | 23 | <i>armadillo</i> . | 154 |
| G2 Supra, praesertim in prothorace, multo subtilius granulatus. | | | |
| H2 Rostro latitudine vix longiore..... | 26 | <i>rheticus</i> . | 155 |
| H1 Rostro latitudine evidenter longiore. | 28 | <i>scabripennis</i> . | 161 |
| G1 Prothorace subtilissime confertim granulato. | | | |
| | 34 | <i>multipunctatus</i> . | 162 |
| | 45. | | |

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| F1 | Pedibus rufis. | |
| G3 | Elytris maculatim griseo-hirsutis. | |
| H2 | Prothorace confertim subtiliter granulato; segmento anali ♀ subtiliter striato. | |
| I2 | Prothorace latitudine non longiore. | |
| J2 | Elytris latitudine vix longioribus.. | 24 <i>latissimus</i> . 158 |
| J1 | Elytris latitudine evidenter longioribus. | |
| | | 26 <i>rhæticus</i> , var. 155 |
| H1 | Prothorace latitudine longiore..... | 27 <i>obsitus</i> . 160 |
| H1 | Prothorace minus dense granulato; segmento anali ♂ rude striato..... | 25 <i>amplipennis</i> . 156 |
| G2 | Supra æqualiter squamulis subtilibus, piliformibus vestitus, striis elytrorum basi evanescentibus. | |
| | | 29 <i>Ghilianii</i> . 159 |
| G1 | Supra non squamosus, vix pubescens. | |
| H3 | Anten. funiculi articulo 2° primo brevior. 33 <i>coryli</i> . | 170 |
| H2 | Anten. funiculi articulo 2° primo tertia parte longiore; rostro brevi, crasso; prothorace longitudine non latiore..... | 30 <i>pyrenæus</i> . 163 |
| H1 | Anten. funiculi articulo 2° primo fere duplo longiore; rostro graciliore, prothorace latitudine fere brevior. | 31 <i>amabilis</i> . 164 |
| D1 | Striis elytrorum paulum irregularibus, punctis admixtis extra ordinem, elytris ventricosis, hirsutie erecta sat dense vestitis. | |
| E2 | Rostro tri-carinato. | |
| F2 | Articulis funiculi anten. 4-6 latitudine vix longioribus. | |
| G2 | Latior; prothorace fortius granulato; elytris profundius punctato-striatis..... | 37 <i>civis</i> . 137 |
| G1 | Angustior; prothorace subtilius granulato; elytris subtilius punctato-striatis..... | 39 <i>meridionalis</i> . 171 |
| F1 | Antennis gracilioribus, articulis omnibus latitudine longioribus..... | 36 <i>corticalis</i> . 137 |
| E1 | Rostro sulcato, non carinato..... | 38 <i>oleæ</i> . 138 |
| A1 | Elytra ♂ convexiora et semper angustiora. | |
| B2 | Supra æqualiter rude granulatus. | |
| C3 | Supra metallico-squamosus, elytrorum striis pupillatis. | |
| | | 40 <i>aeropupillatus</i> . 126 |
| C2 | Supra parce pilosus, pronoti elytrorumque lateribus densius squamosis. | |

| | | | | |
|----|---|----|--------------------------|-----|
| D2 | Convexus; squamulis elytrorum metallicis..... | 45 | <i>fortis</i> . | 139 |
| D1 | Depressus; squamulis elytrorum cretaceis. | 46 | <i>vehemens</i> . | 140 |
| C1 | Supra æqualiter pubescens aut glaber. | | | |
| D2 | Elytris postice truncatis..... | 43 | <i>truncatus</i> . | 131 |
| D1 | Elytris postice acuminatis. | | | |
| E3 | Prothorace versus basin non constricto. | | | |
| F2 | Prothorace confertissime granulato. | | | |
| G2 | Elytris striatis..... | 42 | <i>scaberrimus</i> . | 130 |
| G1 | Elytris obsolete striatis..... | 41 | <i>bisulcatus</i> . | 128 |
| F1 | Prothorace remote granulato..... | 44 | <i>sulphurifer</i> . | 132 |
| E2 | Prothorace versus basin late constricto; elytris singulatim acuminatis..... | 48 | <i>caunicus</i> . | 749 |
| E1 | Prothorace versus basin late constricto; elytris conjunctim rotundatis..... | 64 | <i>truncatellus</i> . | 173 |
| B1 | Prothorace subtiliter granulato vel punctato; elytris rugosis vel lævibus. | | | |
| C2 | Prothorace latitudine longiore. | | | |
| D2 | Rostro latitudine baseos vix longiore.... | 47 | <i>stricticollis</i> . | 382 |
| D1 | Rostro latitudine baseos multo longiore | 51 | <i>francolinus</i> . (*) | 143 |
| C1 | Prothorace longitudine fere latiore. | | | |
| D2 | Tibiis posticis apice excisis..... | 59 | <i>cæsipes</i> . | 150 |
| D1 | Tibiis posticis apice non excisis. | | | |
| E2 | Pedibus rufis aut rufo-piceis. | | | |
| F2 | Antennis brevibus, articulis funiculi 4-7 latitudine non longioribus. | | | |
| G2 | Vix pubescens; elytrorum interstitiis fortiter rugosis. | 53 | <i>hæmatopus</i> . | 145 |
| G1 | Pubescens; elytrorum interstitiis obsolete rugoso-granulatis..... | 57 | <i>pubens</i> . | 149 |
| F1 | Antennis gracilibus, articulis omnibus latitudinæ longioribus. | | | |
| G3 | Sat dense squamosus. | | | |
| H2 | Elytris obsolete striatis; segmento anali ♂ foveolato. | 54 | <i>lugdunensis</i> . | 147 |
| H1 | Elytris evidenter striatis; segmento anali ♂ non foveolato. | | | |
| I2 | Elytris postice attenuatis..... | 50 | <i>hungaricus</i> . | 142 |

 (*) Longulus, 143.

| | | | |
|--|----|--------------------------|-----|
| H Elytris postice non attenuatis. | 49 | <i>griscopunctatus</i> . | 141 |
| G2 Supra glaber sive parce squamosus. | | | |
| H2 Segmento anali rude striato..... | 55 | <i>tenebricosus</i> . | 147 |
| H1 Segmento anali subtiliter striato. | | | |
| I2 Prothorace longitudine non latiore. | | | |
| J2 Elytrorum striis confertim punctatis. | | | |
| K2 Prothorace subremote punctato; elytris ovatis, levioribus..... | 58 | <i>sanguinipes</i> . | 150 |
| K1 Prothorace densius punctato; elytris oblongis, fortius striatis. | | | |
| L2 Minor; elytris rugoso-granulatis, densius pilosis. | | | |
| | 60 | <i>gallicus</i> . | 151 |
| L1 Major; elytris rugosis, glabris.... | 52 | <i>fuscipes</i> . | 144 |
| J1 Elytrorum striis remote punctatis, punctis squa- mosis..... | 61 | <i>niger</i> . | 165 |
| H Prothorace longitudine multo latiore. | 62 | <i>tumefactus</i> . | 170 |
| G1 Supra metallico-squamosus..... | 67 | <i>nobilis</i> . | 152 |
| E1 Pedibus nigris. | | | |
| F3 Interstitiis elytrorum rugoso-granulatis. | | | |
| | 63 | <i>sulcogemmatu</i> s. | 172 |
| F2 Interstitiis elytrorum obsolete rugosis. | | | |
| G2 Long. 10 mill. segmento anali rude striato. | | | |
| | 56 | <i>substriatus</i> . | 148 |
| G1 Long. 6 mill. segmento anali subtiliter striato. | | | |
| H2 Anten. articulo funiculi 2° primo longiore. | | | |
| | 69 | <i>concinuus</i> . | 153 |
| H1 Anten. articulo funiculi 2° primo non longiore. | | | |
| | 68 | <i>laevigatus</i> . | 152 |
| F1 Elytris cinereo tessellatis, subtiliter rugoso-granulatis. | | | |
| | 66 | <i>irritans</i> . | 162 |

COHORS III.

A2 Tibiis muticis.

B2 Elytris striatis.

C2 Pedibus nigris.

 D2 Prothorace sat dense punctato, interdum rugoso aut gra-
 nulato..... 71 *unicolor*. 177

 D1 Prothorace subtiliter remote punctato.... 73 *navaricus*. 180

C1 Pedibus rufis sive rufo-piceis.

| IX | DES ESPÈCES DU GENRE OTIORHYNCHUS. | 777 | PAGES. |
|----|---|-----|--------------------------|
| D3 | Elytris striatis, interstitiis planis; prothorace parum rotundato. Long. 10 mill..... | 72 | <i>hispanicus</i> . 180 |
| D1 | Elytris striatis, interstitiis convexis; prothorace modice rotundato. Long. 3-10 mill... .. | 74 | <i>Reynosæ</i> . 178 |
| D1 | Elytris obsolete striatis; prothorace fortiter rotundato. Long. 7 mill..... | 79 | <i>Perezi</i> . 184 |
| B1 | Elytris obsolete striatis. | | |
| C2 | Prothorace lateribus fortiter rotundato. Long. 10 mill. | | |
| | | 76 | <i>crinitarsis</i> . 182 |
| C1 | Prothorace lateribus parum rotundato. Long. 7-8 mill. | | |
| | | 78 | <i>atroapterus</i> . 183 |
| A1 | Tibiis posticis ♂ dentalis. | | |
| B2 | Elytris striatis..... | 77 | <i>dentipes</i> . 182 |
| B1 | Elytris non striatis..... | 75 | <i>asturiensis</i> . 750 |

COHORS IV.

| | | | |
|----|---|----|--|
| A2 | Prothorace punctato vel rugoso. | | |
| B2 | Elytris punctato-striatis, interstitiis rugosis, subconvexis. | | |
| C2 | Supra glaber..... | 80 | <i>orbicularis</i> . 187 |
| C1 | Supra squamosus. | | |
| D2 | Ovalis. | | |
| E2 | Rostro latitudine baseos vix longiore.... | 81 | <i>petrensis</i> . 188 |
| E1 | Rostro latitudine baseos multo longiore. | 82 | <i>gyratcollis</i> . 189 |
| D1 | Oblongo-ovatus, angustior..... | 83 | <i>luteus</i> . 190 |
| B1 | Elytris glabris, seriato-punctatis, interstitiis planis. | | |
| C2 | Rostro carinato..... | 85 | <i>arachnoides</i> 191 (ventralis 187). |
| C1 | Rostro sulcato | 86 | <i>kurdistanus</i> . 192 |
| A1 | Prothorace impressionibus semilunaribus... | 84 | <i>intrusicollis</i> . 190 |

COHORS V.

| | | | |
|----|--|----|---|
| A2 | Tibiis intermediis apice non emarginatis; tibiis non villosis. | | |
| | | 88 | <i>dubitabilis</i> . 193 |
| A1 | Tibiis intermediis apice emarginatis; tibiis villosis. | | |
| B2 | Prothorace granulato. | | |
| C2 | Prothorace brevior; elytris cupreo-squamosis. | 89 | <i>crinipes</i> 194 (Valachia, 750). |
| C1 | Prothorace longior; elytris griseo-squamosis. | 87 | <i>plumipes</i> . 192 |
| B1 | Prothorace punctato..... | 91 | <i>cribrosus</i> . 195 |

COHORS VI.

PAGES.

| | | | |
|--|----|-------------------------|-----|
| A2 Tibiis ♂ intus villosis..... | 72 | <i>cupreo-sparsus</i> . | 195 |
| A1 Tibiis ♂ intus non villosis. | | | |
| B2 Elytris griseo-squamosis. | | | |
| C2 Elongatus; antennis gracilibus..... | 93 | <i>lanuginosus</i> . | 196 |
| C1 Ovatus; antennis brevibus..... | 99 | <i>raucus</i> . | 202 |
| B1 Elytris metallico-squamosis. | | | |
| C2 Elytris obsolete striatis. | | | |
| D2 Squamulis elytrorum piliformibus..... | 95 | <i>chrysocomus</i> . | 199 |
| D1 Squamulis elytrorum rotundatis vel lanceolatis. | | | |
| | | 96 <i>repletus</i> . | 200 |
| C1 Elytris evidenter striatis. | | | |
| D2 Rostro subtiliter carinato, sine sulcis..... | 97 | <i>guttula</i> . | 201 |
| D1 Rostro evidenter bisulcato..... | 98 | <i>assimilis</i> . | 201 |

COHORS VII.

| | | | |
|---|-----|-----------------------|-----|
| A2 Elytris oblongo-ovatis. | | | |
| B2 Antennis gracilibus; striis elytrorum punctis subtilibus, simplicibus..... | 100 | <i>perdix</i> . | 203 |
| B1 Antennis fortioribus; striis elytrorum punctis umbilicatis. | | | |
| | | 102 <i>phasma</i> . | 000 |
| A1 Elytris ovatis, profunde punctato-sulcatis. | 101 | <i>intercalaris</i> . | 204 |

COHORS VIII.

| | | | |
|--|-----|-------------------------|-----|
| A2 Antennis sat gracilibus, articulis 4-7 funiculi longitudine non latioribus. | | | |
| B2 Elytris obsolete striatis..... | 103 | <i>argenteus</i> . | 205 |
| B1 Elytris evidenter striatis vel sulcatis. | | | |
| C2 Anten. funiculi articulo 2° primo duplo longiore. | | | |
| D2 Rostro carinato; sutura postice carinata. | 104 | <i>caucasicus</i> . | 751 |
| D1 Rostro plano aut subimpresso; sutura non carinata. | | | |
| E2 Prothorace rude tuberculato, lateribus fortiter rotundato. | | | |
| F2 Punctis elytrorum pupillatis; interstitiis rude acute granulatis..... | 106 | <i>conspicabilis</i> . | 210 |
| F1 Punctis elytrorum non pupillatis; interstitiis rugosis. | | | |
| | | 107 <i>argillosus</i> . | 382 |
| E1 Prothorace subtilius granulato, lateribus parum rotundato. | | | |

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| XI | DES ESPÈCES DU GENRE OTIORHYNCHUS. | 779 |
| | | PAGES. |
| F2 | Prothorace longitudine vix latiore..... | 109 <i>histrio</i> . 208 |
| F1 | Prothorace longitudine evidenter latiore, canaliculato. | |
| | | 110 <i>Zebei</i> . 208 |
| C1 | Anten. funic. articulo 2° primo paulo longiore. | |
| D2 | Prothorace latitudine paulo longiore. | |
| E2 | Pedibus rufis..... | 105 <i>vestitus</i> . 206 |
| E1 | Pedibus nigris..... | 108 <i>banaticus</i> . 207 |
| D1 | Prothorace latitudine brevior. | |
| E2 | Rostro profunde sulcato. | |
| F2 | Albo squamosus, squamulis rotundatis. | 111 <i>conspersus</i> . 210 |
| F1 | Æreo-squamosus, squamulis lanceolatis.... | 114 <i>Heeri</i> . 214 |
| E1 | Rostro plano, interdum subtiliter carinato. | |
| F2 | Prothorace antice angustior; elytris oblongo-ovatis. | |
| | | 115 <i>spoliatus</i> . 752 |
| F1 | Prothorace antice non angustior; elytris ovatis. | |
| | | 116 <i>chalceus</i> . 215 |
| A1 | Antennis brevibus, crassis; articulis externis longitudine multo latioribus. | |
| B2 | Rostro plano..... | 112 <i>validicornis</i> . 211 |
| B1 | Rostro excavato. | |
| C2 | Prothorace latitudine vix brevior. | |
| D2 | Prothorace rude granulato..... | 117 <i>subspinosus</i> . 215 |
| D1 | Prothorace subtiliter granulato..... | 118 <i>Carceli</i> . 216 |
| C1 | Prothorace longitudine multo latiore... | 113 <i>crassicornis</i> . 211 |

COHORS X.

| | | |
|----|--|------------------------------|
| A2 | Dense griseo-pilosus..... | 120 <i>densatus</i> . 219 |
| A1 | Parcius griseo-pubescent, colore obscuro corporis inde prævalente. | |
| B2 | Prothorace granulato. | |
| C2 | Anten. funiculi articulo 2° primo longiore. | |
| D2 | Rostro longitudine medioeri. | |
| E2 | Rostro sulcato. | |
| F2 | Prothorace longitudine latiore..... | 121 <i>scabrosus</i> . 219 |
| F1 | Prothorace longitudine non latiore..... | 125 <i>Stierlini</i> . |
| E1 | Rostro carinato. | (tristis.) 222 |
| F2 | Elytris oblongo-ovatis, depressis | 126 <i>arenosus</i> . 223 |
| F1 | Elytris ovatis. | |
| G2 | Prothorace fortius granulato, carinato. | 129 <i>necessarius</i> . 225 |

| | | | |
|--|-----|-------------------------|-----|
| E1 Prothoracis disco granulato | 130 | <i>plebejus</i> . | 226 |
| C1 Anten. funiculi articulo 2° primo non longiore. | | | |
| D2 Prothorace longitudine latiore..... | 137 | <i>pulverulus</i> . | 229 |
| D1 Prothorace longitudine non latiore. | | | |
| E3 Rostro sulcato. Long. 6 mill..... | 122 | <i>rudis</i> . | 220 |
| E2 Rostro obsolete sulcato. Long. 3 mill. | 132 | <i>pseudomias</i> . | 226 |
| E1 Rostro obsolete carinato. | | (lutosus 226.) | |
| F2 Antennis sat gracilibus..... | 134 | <i>affaber</i> . | 227 |
| F1 Antennis brevibus crassis..... | 127 | <i>misellus</i> . | 223 |
| B1 Prothorace punctato. | | | |
| C2 Rostro sulcato. | | | |
| D2 Anten. funiculi articulo 2° primo longiore. | | | |
| | 133 | <i>planophthalmus</i> . | 766 |
| D1 Anten. funiculi articulo 2° primo non longiore. | | | |
| | 128 | <i>rubiginosus</i> . | 224 |
| C1 Rostro plano, interdum subtiliter carinato. | | | |
| D2 Prothorace latitudine longiore. | | | |
| E2 Antennis crassis, funiculi articulo 2° primo brevior. | | | |
| | 136 | <i>corsicus</i> . | 228 |
| E1 Antennis gracilioribus, funiculi articulo 2° primo non brevior, elytris oblongo-ovatis..... | 135 | <i>Henoni</i> . | 228 |
| D1 Prothorace latitudine brevior; elytris breviter ovatis. | | | |
| | 131 | <i>subdepressus</i> . | 752 |

COHORS XII.

| | | | |
|---|-----|--------------------------|-----|
| A2 Antennarum funiculi articulo 2° cæteris crassior, rotundato. | | | |
| B2 Prothorace longitudine latior, postice latior. | | | |
| | 143 | <i>distincticornis</i> . | 233 |
| B1 Prothorace latitudine longior, postice non latior. | | | |
| | 144 | <i>lombardus</i> . | 234 |
| A1 Anten. funiculi articulo 2° cæteris non crassior. | | | |
| B2 Elytris maculatim metallico-squamosis..... | 148 | <i>incivilis</i> . | 236 |
| B1 Elytris non metallico-squamosis. | | | |
| C2 Rostro late sulcato. | | | |
| D2 Elytrorum striis seriatis granulatis..... | 140 | <i>alpestris</i> . | 231 |
| D1 Elytrorum striis punctatis..... | 141 | <i>foraminosus</i> . | 232 |
| C1 Rostro subtiliter longitudinaliter strigoso. | | | |
| D2 Rostro impresso..... | 145 | <i>pigrans</i> . | 234 |
| D1 Rostro plano. | | | |
| E2 Fronte impressa..... | 142 | <i>Mulleri</i> . | 232 |

E1 Fronte non impressa.

F2 Prothorace lateribus fere rectis, vix rotundatis.

146 *tagenioides*. 235

F1 Prothorace lateribus modice rotundato. 147 *compressus*. 236

COHORS XIII.

A2 Elytrorum stria 3^a postice cum 8^a sese conjungente; elytris
parce squamosis.

B2 Magnus, crassus; elytrorum structura ♀ valde differt.

149 *bicostatus*. 237

B1 Long. 7 mill. ad summum; elytrorum structura utriusque
sexus non diversa.

C3 Oblongo-ovatus; elytris ovatis, quorum maxima latitudo ante
medium vel in medio.

D2 Colore nigro, punctis elytrorum non pupillatis.

E2 Antennis gracilioribus; prothorace profunde canaliculato.

150 *lasius*. 238

E1 Antennis minus gracilibus; prothorace obsolete canalicu-
lato..... 151 *porcatus*. 239

D1 Colore testaceo-brunneo, punctis elytrorum pupillatis.

E2 Interstitiis omnibus elytr. seriatim setosis.

153 *subcostatus*. 240

E1 Interstitiis alternis (elevationibus) seriatim setosis.

152 *septentrionis*. 240

C2 Oblongo-ovatus; elytrorum maxima latitudine pone medium.

154 *obtus*. 241

C1 Elongatus; elytris fere parallelis, oblongo-ovatis.

158 *Chaudoiri*. 212

A1 Elytrorum stria 3^a postice cum 6^a sese conjungente, 7^a cum 8^a.

B2 Rostro antennisque longis, gracilibus.... 155 *Kuenburgi*. 242

B1 Rostro antennisque brevibus, crassis.

C2 Prothorace latitudine longiore; antennis modice crassis.

156 *costipennis*. 242

C1 Prothorace longitudine latiore; antennis brevissimis, cras-
sissimis 157 *antennatus*. 243

COHORS XIV.

A2 Elytris prothorace quinquies vel sexies longioribus.

B2 Capite rostroque subtiliter punctatis; anten. funiculi arti-

| | | | |
|--|-----|---------------------|-----|
| culis 2 primis æque longis | 159 | <i>squamifer.</i> | 244 |
| B1 Capite rostroque rugoso-punctatis; anten. funiculi articulo 2º primo longiore. | 161 | <i>parvicollis.</i> | 245 |
| A1 Elytris prothorace ter et dimidio longioribus. | | | |
| B2 Anten. articulis externis latitudine multo longioribus. | 162 | <i>sordidus.</i> | 246 |
| B1 Anten. articulis externis latitudine non longioribus. | | | |
| C2 Prothorace rude granulato, latitudine brevior. | 160 | <i>thracicus.</i> | 244 |
| C1 Prothorace subtiliter granulato, latitudine longiore. | 163 | <i>fraternus.</i> | 247 |

COHORS XV.

| | | | |
|---|-----|-------------------|-----|
| A2 Corpore supra setis longis erectis obsito. | 165 | <i>echinatus.</i> | 248 |
| A1 Corpore supra setis brevibus obsito. | | | |
| B2 Elongatus, angustus; margine basali prothoracis setulis corono nato | 171 | <i>coronatus.</i> | 753 |
| B1 Elongatus, angustus; margine basali prothoracis non setulis coronato. | | | |
| C2 Setulis elytrorum claviformibus. | | | |
| D2 Prothorace longitudine multo latiore, punctis pupillatis. | 167 | <i>setifer.</i> | 249 |
| D1 Prothorace longitudine vix latiore, granulato. | 166 | <i>uncinatus.</i> | 249 |
| C1 Setulis elytrorum brevibus, non clavatis. | | | |
| D2 Squamosus. | | | |
| E3 Prothorace granulato. | 164 | <i>hypocrita.</i> | 247 |
| E2 Prothorace punctato. | 170 | <i>proximus.</i> | 251 |
| E1 Prothorace obsolete punctato et granulato, fere cicatricoso. | 168 | <i>globulus.</i> | 250 |
| D1 Corpore piloso, non squamoso. | 169 | <i>teter.</i> | 250 |

COHORS XVI.

| | | | |
|--|-----|------------------|-----|
| A2 Prothorace granulato. | | | |
| B2 Rostro carinato, non longitudinaliter strigoso. | 172 | <i>maurus.</i> | 253 |
| B1 Rostro non nisi postice et obsolete carinato, longitudinaliter strigoso. | 174 | <i>Schmidti.</i> | 254 |
| A1 Prothorace punctato. | 173 | <i>Gobanzi.</i> | 754 |

COHORS XVII.

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| | | PAGES. |
| A2 | Elytris pilis longis erectis seriatim obsitis. | |
| B2 | Long. 8 mill. Prothorace confertim punctato. | 175 <i>trichographus</i> . 256 |
| B2 | Long. 5 mill. Prothorace subremote punctato. | 176 <i>seriehispidus</i> . 754 |
| A1 | Elytris glabris vel pilositate brevi depressa obsitis. | |
| B2 | Prothorace granulato. | |
| C2 | Long. 7 mill. Elytris substriatis..... | 177 <i>obcæcatus</i> . 257 |
| C1 | Long. 5 mill. Elytris profunde striatis..... | 197 <i>pullus</i> . 268 |
| B1 | Prothorace disco saltem punctato. | |
| C2 | Tibiis anticis ♂ incurvis. | |
| D2 | Prothorace remote punctato; tibiis apice emarginatis. | 180 <i>puncticornis</i> . 258 |
| D1 | Prothorace densius punctato; tibiis apice non emarginatis. | |
| E2 | Interstitiis elytr. confertim punctatis..... | 181 <i>fulvipes</i> . 258 |
| E1 | Interstitiis elytr. subremote punctatis. | |
| F2 | Prothorace sat dense subtiliter punctato. | |
| G2 | Long. 8-10 mill. | |
| H2 | Antennis sat gracilibus; articulis externis ♂ longitudine non latoribus..... | 178 <i>malefidus</i> . 185 |
| H1 | Antennis brevioribus; articulis externis ♂ longitudine latoribus..... | 179 <i>Novi</i> . 185 |
| G1 | Long. 5-7 mill. | |
| H2 | Pedibus ciliatis. | |
| I2 | Prothorace longitudine paulo latiore, postice leviter constricto. | |
| J2 | Elytris striatis; rostro punctato, subcarinato. | 182 <i>monticola</i> . 259 |
| J1 | Elytris obsolete striatis; rostro rugoso-punctato. | 183 <i>blandus</i> . 261 |
| I1 | Prothorace latitudine longiore..... | 187 <i>patruelis</i> . 263 |
| H1 | Pedibus et præsertim tibiis intus non ciliatis vel hirsutis. | |
| I2 | Prothorace latitudine longiore, subremote punctato. | 184 <i>jugicola</i> . 262 |
| I1 | Prothorace latitudine brevior, confertim punctato. | 185 <i>glabricollis</i> . 262 |

| | | | |
|--|---------------|---------------------------|-----|
| F1 Prothorace confertissime rude punctato. | 188 | <i>Kindermanni</i> . | 264 |
| C1 Tibiis omnibus rectis, etiam ♂. | (fallax 260.) | | |
| D2 Tibiis apice emarginatis. | | | |
| E2 Elytris punctato-striatis | 189 | <i>brevicornis</i> . | 265 |
| E1 Elytris foveolato-striatis..... | 190 | <i>cribripennis</i> . | 266 |
| D' Tibiis apice non emarginatis. | | | |
| E2 Elytrorum striis punctis magnis quadratis. | 191 | <i>cribratostriatus</i> . | 755 |
| E1 Elytris subtiliter striato-punctatis. | | | |
| F2 Prothorace disco punctato, lateribus granulato. | | | |
| G2 Prothorace latitudine longiore. | | | |
| H2 Latior; elytr. interstitiis subremote punctatis. | | | |
| I2 Prothorace evidenter subremote punctato. | 192 | <i>denigrator</i> . | 266 |
| I1 Prothorace confertim subtiliter punctato. | 193 | <i>angusticollis</i> . | 267 |
| III Angustior; elytr. interstitiis seriatim punctatis. | 196 | <i>politus</i> . | 268 |
| G1 Prothorace latitudine brevior. | 194 | <i>lithanthracinus</i> . | 267 |
| F1 Prothorace ubique punctato..... | 195 | <i>glabratus</i> . | 443 |

COHORS XVIII.

| | | | |
|--|-----|----------------------|-----|
| A2 Prothorace punctato..... | 202 | <i>squameus</i> . | 272 |
| A2 Prothorace granulato. | | | |
| B2 Elytris non pupillatis. | | | |
| C2 Rostro profunde sulcato; prothorace latitudine longiore. | 200 | <i>Parreyssi</i> . | 270 |
| C1 Rostro plano et subtiliter carinato; prothorace latitudine brevior..... | 201 | <i>aurosparsus</i> . | 271 |
| B1 Elytrorum punctis pupillatis. | | | |
| C3 Femoribus breviter minute dentatis. | | | |
| D3 Rostro tricarinato, carinis lateralibus postice convergentibus..... | 199 | <i>respersus</i> . | 270 |
| D2 Rostro carinato; elytris squamulis griseis dense tecto. | 198 | <i>lavandus</i> . | 269 |
| D1 Rostro non carinato, plano. | | | |
| E2 Antennis sat brevibus et crassis, funiculi articulis externis longitudine latioribus. | | | |

| | | |
|--|------------------------------|-----|
| F2 Prothorace evidenter granulato. | | |
| G2 Prothorace longitudine latiore, granulato, granulis ♂ umbilicatis; ventre parum ♂ vel non impresso. | 204 <i>picipes</i> . | 273 |
| G1 Prothorace longitudine non latiore, granulato, ♂ ♀ granulis umbilicatis et ventre impresso. | 205 <i>impressiventris</i> . | 275 |
| F1 Prothorace subtiliter granulato..... | 207 <i>Carmagnolæ</i> . | 276 |
| E1 Antennis gracilibus, articulis funic. 4-7 longitudine non latioribus; rostro tereti. | | |
| F2 Prothorace non canaliculato. | | |
| G2 Rostro, præsertim basi, validiore; prothorace evidentius granulato; squamulis elytrorum majoribus. | 208 <i>pupillatus</i> . | 276 |
| G1 Rostro, præsertim basi, tenuiore; prothorace subtilius granulato; squamulis elytr. minutis. | | |
| H2 Long. fere 7 mill. Colore brunneo; femoribus subdentatis..... | 209 <i>rhododendri</i> . | 278 |
| H1 Long. fere 5-6 mil. Colore nigro; femoribus acute dentatis..... | 210 <i>teretirostris</i> . | 279 |
| F1 Prothorace canaliculato. | | |
| G2 Long. 5,5 mill. Elytris oblongo-ovatis. | 211 <i>cancellatus</i> . | 280 |
| G1 Long. 3-4 mill. Elytris ovatis..... | 212 <i>pusillus</i> . | 281 |
| C2 Femoribus omnibus dente sat valido, acuto, armatis. | | |
| D2 Anten. funiculi articulo 2º globoso, cæteris crassiore. | 223 <i>globus</i> . | 288 |
| D1 Anten. funiculi articulo 2º globoso, cæteris non crassiore. | | |
| E2 Prothorace canaliculato..... | 216 <i>subquadratus</i> . | 283 |
| E1 Prothorace non canaliculato. | | |
| F3 Antenn. funiculi articulo 2º primo duplo longiore. | | |
| G2 Antennis gracilibus. | | |
| H2 Totus niger; antennis gracilioribus; long. 7-8 mill. | 214 <i>tenuicornis</i> . | 383 |
| H1 Fuscus; antennis minus gracilibus; long. 5-6 mill. | 215 <i>eremicola</i> . | 282 |
| G1 Antennis sat validis..... | 217 <i>Reichei</i> . | 284 |
| F2 Anten. funiculi articulo 2º primo parte tertia vel sesqui-longiore. | | |
| G2 Elytris globosis..... | 222 <i>cratægi</i> . | 287 |

| | | | |
|--|-----|------------------------|-----|
| G1 Elytris ovatis | 224 | <i>difficilis</i> . | 288 |
| F1 Anten. funiculi articulo 2° primo non longiore. | | | |
| G3 Antennis crassis, versus clavam crassioribus. | | | |
| | 213 | <i>varius</i> . | 282 |
| G2 Antennis sat gracilibus; elongatus, long. 4 mill. non superans. | | | |
| H2 Rostro sulcato | 220 | <i>Hampei</i> . | 286 |
| H1 Rostro thoraceque carinatis | 221 | <i>elegantulus</i> . | 287 |
| G1 Antennis sat crassis (ut in <i>picipes</i>); corpore oblongo-ovato. | | | |
| H2 Pedibus rufis | 218 | <i>delicatulus</i> . | 285 |
| H1 Pedibus nigro-piceis. | | | |
| I2 Squamositate densa fusca et testacea variegatus. | | | |
| | 219 | <i>vernalis</i> . | 285 |
| I1 Squamulis griseis, submetallicis, parce vestitus. | | | |
| | 206 | <i>Dieki</i> (*). | 756 |
| C1 Femoribus nonnisi posticis dentatis, dente minuto et obtuso plerumque. | | | |
| D2 Femoribus anticis posticis paulo fortioribus. | | | |
| E2 Elytris ovatis, maculatim metallico-squamosis. | | | |
| | 229 | <i>affinis</i> Hoch. | 292 |
| E1 Elytris subglobosis | 230 | <i>seductor</i> . | 293 |
| D1 Femoribus posticis anticis crassioribus. | | | |
| E2 Prothorace granulato. | | | |
| F3 Elongatus; anten. funiculi articulo 2° primo triplo longiori | 228 | <i>Milleri</i> . | 291 |
| F2 Oblongo-ovatus; anten. funiculi articulo 2° primo duplo longiori. | | | |
| G2 Oblongior; prothorace longitudine multo latiore. | | | |
| | 227 | <i>duinensis</i> . | 290 |
| G1 Brevior; prothorace longitudine paulo latiore. | | | |
| | 225 | <i>signatipennis</i> . | 289 |
| F1 Oblongo-ovatus; anten. funiculi articulo 2° primo sesqui longiore | 226 | <i>illyricus</i> . | 290 |
| E1 Prothorace punctato | 232 | <i>heteromorphus</i> . | 766 |

(*) Fortasse var. *vernalis*.

COHORS XXIX.

PAGES.

| | | | | |
|----|---|-----|---------------------|-----|
| A2 | Prothoracis lateribus non squamosis..... | 233 | <i>gemmatus</i> . | 294 |
| A1 | Prothoracis lateribus dense squamosis. | | | |
| B2 | Elytris nitidis, convexioribus. | | | |
| C2 | Elytris regulariter striatis, interstitiis minus elevatis, granulis obtusioribus obsitis; prothorace fortius granulato. | 235 | <i>opulentus</i> . | 295 |
| C1 | Elytris minus regulariter striatis, interstitiis convexioribus, fortius granulatis; prothorace paulo subtilius granulato. | 234 | <i>dives</i> . | 296 |
| B1 | Elytris depressis, minus nitidis | 236 | <i>cymophanes</i> . | 297 |

COHORS XX.

| | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|-----|
| A2 | Femoribus anticis ♂ dente valido, lato, obtuso, armatis. | 237 | <i>squamosus</i> . | 298 |
| A1 | Femoribus anticis ♂ dente brevi, acuto, armatis. | | | |
| B2 | Femoribus fortius dentatis; elytris longioribus, densius squamosis..... | 238 | <i>lepidopterus</i> . | 299 |
| B1 | Femoribus dente minore armatis; elytris brevioribus, parcius squamosis..... | 239 | <i>dauricus</i> . | 300 |

COHORS XXI.

| | | | | |
|----|--|-----|--------------------|-----|
| A2 | Elytris subglobosis..... | 244 | <i>obesus</i> . | 305 |
| A1 | Elytris ovatis. | | | |
| B3 | Rostro supra plano vel subdepresso..... | 240 | <i>giraffa</i> . | 301 |
| B2 | Rostro supra sulcato. | | | |
| C2 | Pedibus nigris, validis; femoribus omnibus dente valido armatis | 243 | <i>armatus</i> . | 304 |
| C1 | Pedibus rufopiceis, gracilioribus; femoribus dente minuto armatis..... | 241 | <i>turca</i> . | 302 |
| B1 | Rostro in medio transversim carinato | 242 | <i>adspersus</i> . | 303 |

COHORS XXII.

| | | | | |
|----|--|-----|-----------------|-----|
| A2 | Tibiis anticis in utroque sexu rectis vel parum incurvis. | | | |
| B3 | Anten. funiculi articulo 2° primo duplo vel triplo longiore. | | | |
| C2 | Rostro sulcato vel impresso. | | | |
| D2 | Femoribus obsolete dentatis..... | 245 | <i>scitus</i> . | 307 |

| | | | |
|----|--|------------------|--------------------------|
| D1 | Femoribus dente sat valido armatis. | | |
| E2 | Rostro profunde sulcato; supra fere glaber, squamulis nonnullis vestitus | 248 | <i>polycoccus.</i> 310 |
| E1 | Rostro leviter impresso; densius pilosus, pilis interdum in squamulas piliformes mutatis... | 247 | <i>funicularis.</i> 309 |
| C1 | Rostro fronteque sulcatis. | | |
| D2 | Interstitiis elytr. seriatim setosis..... | 249 ^a | <i>græcus.</i> 311 |
| D1 | Interstitiis elytr. non seriatim setosis. | 250 | <i>longipennis.</i> 312 |
| B2 | Antenn. funiculi articulo 2° primo sesqui-longiore. | | |
| C4 | Rostro non vel parum impresso, sed longitudinaliter strigoso. | | |
| D3 | Prothorace non canaliculato; elytris ovatis, squamulis piliformibus obsitis..... | 258 | <i>nigrita.</i> 317 |
| D2 | Prothorace non canaliculato; elytris oblongo-ovatis, subtiliter striatis, parce pilosis..... | 264 | <i>carniolicus.</i> 322 |
| D1 | Prothorace canaliculato; elytris oblongo-ovatis, parce pilosis..... | 262 | <i>angustior.</i> 320 |
| C3 | Rostro subtiliter carinato et obsolete bisulcato. | | |
| D2 | Elytris squamulis griseis, piliformibus vestitis. | | |
| E2 | Prothorace subtiliter granulato | 260 | <i>marmota.</i> 319 |
| E1 | Prothorace rude granulato | 260 ^a | <i>Brucki.</i> 757 |
| D1 | Elytris squamulis rotundatis metallicis maculatim indutis. | | |
| | | 257 | <i>auricomus.</i> 316 |
| C2 | Rostro evidenter carinato et bisulcato | 249 | <i>Kraatzii.</i> 310 |
| C1 | Rostro profunde sulcato, non carinato. | | |
| D2 | Antenn. funiculi articulis 4-7 latitudine fere longioribus. | | |
| | | 253 | <i>sulcatus.</i> 314 |
| D1 | Antenn. funiculi articulis 4-7 latitudine brevioribus. | | |
| E2 | Elytris nitidis, setulis vel squamulis lanceolatis parce obsitis..... | 251 | <i>inunctus.</i> 412 |
| E1 | Elytris opacis, densius pilosis et squamosis. | 263 | <i>populeti.</i> 321 |
| B1 | Anten. funiculi articulo 2° primo parum longiore. | | |
| C2 | Pedibus segmentisque 3 ultimis abdominis rufis. | | |
| | | 256 | <i>fusciventris.</i> 757 |
| C1 | Pedibus nigris. | | |
| D3 | Rostro sulcato; prothorace rude granulato; elytris parce albo-squamosis..... | 255 | <i>Schlæflini.</i> 315 |
| D2 | Rostro plano; prothorace punctato; elytris squamulis piliformibus maculatim obsitis | 259 | <i>monedula.</i> 318 |
| D1 | Prothorace carinato, subtiliter granulato; elytris pilis adpressis flavis et brunneis variegatis | 261 | <i>mus.</i> 319 |

A1 Tibiis anticis ♂ incurvis.

B2 Elytrorum interstitiis striis latioribus 252 *peregrinus*. 313

B1 Elytrorum interstitiis striis angustioribus 254 *linearis*. 314

COHORS XXIII.

A3 Prothorace granulato; rostro sulcato 265 *cypricola*. 323

A2 Prothorace rugoso-punctato; rostro non sulcato.

266 *prolixus*. 323

A1 Prothorace remote punctato.

B2 Rostro capite sesqui-longiore; femoribus anticis dente parvo armatis 268 *discretus*. 325

B1 Rostro capite parum longiore; femoribus anticis dente valido armatis.

C2 Prothorace latitudine vix longiore; elytris punctis sat profundis seriatim striatis 267 *prolongatus*. 324

C1 Prothorace latitudine paulo brevior; elytris subtiliter punctato-striatis 267^a *Jovis*. 204

COHORS XXV.

A2 Femoribus unidentatis, tibiis inermibus.

B2 Elytris sine setulis erectis.

C2 Elytris ♂ ovatis, ♀ breviter ovatis.

D2 Elytris striatis, striis obsolete punctatis.

E3 Rostro subtiliter carinato.

F2 Prothorace paulo angustiore, subtilius granulato; elytris rugoso-granulatis 272 *rugosus*. 328

F1 Prothorace paulo latiore, fortius granulato; elytris obsolete transversim rugosis 270 *Kratteri*. 327

E2 Rostro sulcato, non carinato; elytrorum interstitiis planis. 273 *corrus*. 328

E1 Rostro plano vel subtiliter canaliculato; elytrorum interstitiis carinatis 274 *intrusus*. 329

D1 Elytrorum striis evidenter punctatis vel foveolatis.

E3 Rostro convexo; elytrorum interstitiis rugosis.

F2 Prothorace antice angustiore, obsoletius granulato. 275 *obsidianus*. 330

F1 Prothorace antice non angustiore, fortius granulato. 276 *asplenii*. 331

| | | | |
|----|--|-----|---------------------------|
| E2 | Rostro plano; elytrorum interstitiis remote punctatis. | | |
| | | 279 | <i>achæus.</i> 332 |
| E1 | Rostro dense longitudinaliter strigoso; elytr. interstitiis remote punctatis..... | 277 | <i>verrucicollis.</i> 332 |
| C1 | Elytris ♂ oblongo-ovatis, ♀ ovatis. | | |
| D2 | Tibiis ♂ fortiter incurvis, capite, rostro, pectore abdomineque albido-setosis | 278 | <i>curvipes.</i> 333 |
| D1 | Tibiis ♂ rectis sive parum incurvis. | | |
| E2 | Prothorace subtilissime rugoso-granulato. | | |
| | | 280 | <i>simplicatus.</i> 334 |
| E1 | Prothorace rude granulato. | | |
| F2 | Femoribus vix dentatis | 281 | <i>alpigradus.</i> 335 |
| F1 | Femoribus acute dentatis. | | |
| G2 | Prothorace postice canaliculato, fortius granulato; elytris striis vix punctatis..... | 282 | <i>granicollis.</i> 336 |
| G1 | Prothorace non canaliculato, subtilius granulato; elytris præsertim ♀ profunde foveolato-striatis. | | |
| | | 271 | <i>egregius.</i> 767 |
| B1 | Elytris setulis erectis seriatim obsitis ... | 284 | <i>carbonarius.</i> 337 |
| A1 | Femoribus ♀ bidentatis, profunde emarginatis, tibiis dentatis. | | |
| | | 283 | <i>Riessi.</i> 758 |

COHORS XXVI.

| | | | |
|----|---|-----|--------------------------|
| A2 | Rostro longo, sulcato; elytris granulatis.. | 286 | <i>longiventris.</i> 338 |
| A1 | Rostro brevi, plano; elytris punctatis | 285 | <i>asphaltinus.</i> 337 |

COHORS XXVII.

| | | | |
|----|---|-----|-------------------------|
| A3 | Elytris oblongo-ovatis, antice seriatim punctatis, postice seriatim granulatis..... | 287 | <i>trojanus.</i> 339 |
| A2 | Elytris confertim granulatis, sine striis bene notatis. | | |
| B2 | Rostro carinato..... | 288 | <i>petiginosus.</i> 340 |
| B1 | Rostro sulcato | 293 | <i>sulcifrons.</i> 334 |
| A1 | Elytris punctato-striatis, striis postice plerumque profundioribus. | | |
| B2 | Anten. funic. articulo 2º primo sequi-longiore; elytris glabris (setulis exceptis). | | |
| C2 | Prothorace lateribus valde rotundato; elytrorum interstitiis seriatim setosis..... | 290 | <i>lugens.</i> 341 |
| C1 | Prothorace lateribus parum rotundato; elytris non setosis. | | |

| XXIII | DES ESPÈCES DU GENRE OTIORHYNCHUS. | 791 |
|-------|--|---------------------------------|
| | | PAGES. |
| D2 | Rostro confertim profunde punctato; prothorace subcanaliculato..... | 291 <i>sculptirostris</i> . 342 |
| D1 | Rostro subtiliter remote punctato; prothorace non canaliculato..... | 289 <i>helveticus</i> . 341 |
| B1 | Anten. funic. articulo 2 ^o primo vix longiore; elytris pilosis. | 292 <i>Kiesenwetteri</i> . 343 |

COHORS XXVIII.

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| A2 | Prothorace longitudine non aut vix latiore. | |
| B2 | Pedibus piceis, femoribus posticis dente valido armatis. | |
| C2 | Rostro subcarinato; femoribus anticis minus valide dentatis. | 294 <i>Kollari</i> . 343 |
| C1 | Rostro subsulcato; femoribus anticis paulo fortius dentatis. | 295 <i>Schaumi</i> . 344 |
| B1 | Pedibus rufis, femoribus omnibus dente parvo armatis. | |
| C2 | Interstitiis elytr. alternis alte elevatis..... | 296 <i>aerifer</i> . 345 |
| C1 | Interstitiis elytr. alternis parum elevatis. | |
| D2 | Elytrorum punctis pupillatis..... | 297 <i>subsignatus</i> . 346 |
| D1 | Elytrorum punctis non pupillatis..... | 298 <i>grandineus</i> . 347 |
| A1 | Prothorace longitudine evidenter latiore. | |
| B2 | Prothorace rude granulato; interstitiis alternis alte elevatis. | |
| C2 | Carina interstitii 3 ⁱ usque ad apicem pertingente. | 301 <i>austriacus</i> . 348 |
| C1 | Carina interstitii 3 ⁱ pone medium abbreviata. | 302 <i>costatus</i> . 349 |
| B1 | Prothorace subtiliter granulato, interstitiis alternis parum elevatis. | |
| C2 | Femoribus subdentatis..... | 300 <i>graniventris</i> . 213 |
| C1 | Femoribus dente sat valido armatis..... | 299 <i>croaticus</i> . 347 |

COHORS XXIX.

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| A2 | Prothorace non aut obsolete canaliculato. | |
| B3 | Anten. funiculi articulo 2 ^o primo duplo longiore; prothorace granulato. | |
| C2 | Elytris substriatis. | |
| D2 | Major et latior; rostro carinato bisulcatoque. | 303 <i>auricapillus</i> . 349 |
| D1 | Minor et angustior; rostro plano vel obsolete impresso. | 304 <i>montivagus</i> . 350 |
| C1 | Elytris seriatim foveolatis; rostro sulcato. | 305 <i>clathratus</i> . 351 |

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| B2 Anten. fun. articulo 2º primo non aut parum longiore; prothorace granulato. | | |
| C2 Totus niger. | | |
| D2 Elytr. stria 3ª non plus quam 28 punctis impressis. | | |
| E2 Elytris opacis, interstitiis convexis, granulatis. | | |
| F2 Elytris ovatis sive oblongo-ovatis, interstitiis subtilius granulatis..... | 306 | <i>nubilus.</i> 352 |
| F1 Elytris breviter ovatis, interstitiis rude granulatis. | | |
| | 307 | <i>Bischoffi.</i> 352 |
| E1 Elytris nitidis, interstitiis planis, obsolete granulatis. | | |
| | 308 | <i>Bourouloiri.</i> 353 |
| D1 Elytrorum interstitio 3º punctis 35 impressis. | 309 | <i>tener.</i> 354 |
| C1 Corpore toto aut saltem pedibus rufis. | | |
| D2 Pedibus rufis, femoribus subdentatis..... | 310 | <i>gracilis.</i> 355 |
| D1 Totus rufus, minutus; femoribus denticulo minuto armatis. | | |
| | 311 | <i>provincialis.</i> 355 |
| B1 Anten. funic. articulo 2º primo brevior, prothorace punctato..... | 312 | <i>irregularis.</i> 758 |
| A1 Prothorace profunde canaliculato. | | |
| B2 Antennis brevibus crassis..... | 313 | <i>rugicollis.</i> 356 |
| B1 Antennis gracilibus. | | |
| C2 Ant. funic. artº 2º primo sesqui-longiore; prothorace fortius granulato; elytris profundius striatis. | | |
| | 314 | <i>pachyscelis.</i> 357 |
| C1 Anten. funic. artº 2º primo parum longiore; prothorace paulo subtilius granulato; elytris subtiliter striatis. | | |
| | 315 | <i>tumidipes.</i> 358 |

COHORS XXX.

| | | |
|--|------|-----------------------|
| A2 Elytris substriatis. | | |
| B2 Dense griseo-squamosus, rostro brevior, oculis magis prominentibus; prothorace rude granulato..... | 316 | <i>ligustici.</i> 359 |
| B1 Parce griseo-squamosus, rostro longiore, oculis minus prominentibus; prothorace subtiliter granulato. | 316ª | <i>Ledereri.</i> 759 |
| A1 Elytris punctato-striatis..... | 317 | <i>cuprifer.</i> 360 |

COHORS XXXI.

| | |
|---|--|
| A2 Femoribus posticis fortius anticis dentatis. | |
| B2 Femoribus anticis dente valido armatis. | |

| | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|-----|
| C2 | Prothorace canaliculato, disco confertim evidenter punctato; elytris ampliatis..... | 320 | <i>Gautardi.</i> | 362 |
| C1 | Prothorace non canaliculato. | | | |
| D2 | Rostro carinato et bisulcato, sulcis usque ad frontem pertingentibus; antennis gracilibus, articulis funiculi 4-7 latitudine longioribus..... | 319 | <i>aterrimus.</i> | 362 |
| D1 | Rostro plano, subcarinato; anten. artic. externis latitudine non longioribus. | | | |
| E2 | Rostro longitudinaliter strigoso; prothorace remote punctato; anten. articulis externis latitudine latioribus. | 318 | <i>alpicola.</i> | 361 |
| E1 | Rostro punctato; prothorace confertim punctato; anten. articulis externis rotundatis..... | 324 | <i>proletarius.</i> | 366 |
| B1 | Femoribus anticis subdentatis. | | | |
| C2 | Opacus, dense hirsutus; rostro capite longiore; prothorace subtiliter confertim punctato..... | 322 | <i>strigirostris.</i> | 364 |
| C1 | Nitidus, parce hirsutus; rostro capite non longiore; prothorace rude subremote punctato..... | 321 | <i>Javeti.</i> | 363 |
| A1 | Femoribus anticis fortius posticis dentatis | 323 | <i>creticus.</i> | 365 |

COHORS XXXII.

| | | | | |
|----|---|-----|----------------------|-----|
| A2 | Femoribus anticis inermibus vel dente simplici armatis. | | | |
| B5 | Rostro longitudinaliter strigoso-punctato. | | | |
| C2 | Prothorace disco punctato. | | | |
| D2 | Prothorace disco tantum antico punctato; elytris granulatis. | 325 | <i>mæstus.</i> | 367 |
| D1 | Prothorace disco interstitiisque elytrorum punctatis. | 326 | <i>pedemontanus.</i> | 367 |
| C1 | Prothorace granulato. | | | |
| D2 | Elytrorum interstitiis planis, subtiliter coriaceis. | 328 | <i>obsulcatus</i> | 369 |
| D1 | Elytrorum interstitiis convexis, granulatis. (corarius 369.) | | | |
| E2 | Antennis crassis, extrorsum crassioribus. | | | |
| F2 | Ant. funic. articulo 2° primo paulo longiore; rostro non carinato..... | 331 | <i>rugifrons.</i> | 371 |
| F1 | Ant. funic. articulo 2° primo æque longo; rostro carinato. | | | |
| G3 | Elytris modice punctato-striatis; prothorace fortius granulato, parcius piloso..... | 334 | <i>impoticus.</i> | 373 |

| | | | |
|--|-----|------------------------|-----|
| G2 Elytris subtiliter obsolete punctato-striatis; prothorace subtilius granulato, densius piloso. | 333 | <i>ambiguus</i> . | 373 |
| G1 Elytris profunde punctato-sulcatis; prothorace subtiliter granulato; interstitiis elytr. parce seriatim setosis..... | 332 | <i>Piochardi</i> . | 372 |
| E1 Antennis gracilioribus, funic. articulis rotundatis, extrorsum non crassioribus. | | | |
| F Femoribus breviter obtuse dentatis..... | 335 | <i>Ghestleri</i> . | 374 |
| F Femoribus dente sat valido et acuto armatis. | | | |
| | 336 | <i>picitarsis</i> . | 374 |
| B4 Rostro confertim granulato, carinato; prothorace latitudine fere longiore, granulato; pedibus rufis. | 330 | <i>mæstificus</i> . | 443 |
| B3 Rostro lato, impresso, punctato, interdum carinula humili notato. | | | |
| C2 Prothorace granulato. | | | |
| D2 Totus niger; elytris fortiter punctato-striatis; femoribus acute dentatis..... | 337 | <i>pinastri</i> . | 375 |
| D1 Pedibus piceis; elytris subtiliter punctato-striatis; femoribus vix dentatis..... | 344 | <i>glabellus</i> . | 379 |
| C1 Prothorace longitudinaliter rugoso cum carina media. | | | |
| | 343 | <i>desertus</i> . | 379 |
| B2 Rostro anguste sed profunde canaliculato; elytr. interstitiis alte carinatis..... | 339 | <i>multicostatus</i> . | 376 |
| B1 Rostro plano, punctato vel punctato-rugoso, carinula plus minusve conspicua notato. | | | |
| C5 Prothorace longitudinaliter rugoso, canalicula abbreviata notato; elytr. interst. alte carinatis..... | 338 | <i>montanus</i> . | 173 |
| C4 Prothorace confertim subtiliter granulato, carinato. | | | |
| | 347 | <i>clemens</i> . | 381 |
| C3 Prothorace obsolete granulato, lateribus rotundato; elytr. interstitiis planis..... | 340 | <i>segnis</i> . | 377 |
| C2 Prothorace rugoso-punctato; elytrorum interstitiis rude punctatis; femoribus subdentatis.... | 348 | <i>perplexus</i> . | 381 |
| C1 Prothorace confertim punctato; elytr. interstitiis subtiliter punctatis; femoribus anticis dente valido obtuso armatis..... | 327 | <i>armicus</i> . | 368 |
| A1 Femoribus anticis dente bifido armatis. | | | |
| B4 Prothorace rude longitudinaliter rugoso | 341 | <i>ovatus</i> . | 377 |
| B3 Prothorace rude tuberculato, carinula abbreviata notato. | | | |
| | 342 | <i>muscorum</i> . | 378 |

- B2 Prothorace latitudine longiore, subtiliter granulato, carinula abbreviata notato..... 346 *pauvillus*. 380
 B1 Prothorace latitudine brevior, confertissime granulato, non carinato..... 345 *rotundatus*. 444 et 739

SUBGENUS III. — **EURYCHIRUS.**

A2 Prothorace punctato.

B2 Prothorace modice convexo, plerumque longitudine non ant parum latiore, lateribus modice rotundato.

C2 Rostro sulcato aut plano, non carinato.

D2 Prothorace punctis magnis umbilicatis remotis obsito.

E2 Elytris oblongo-ovatis.

F2 Rostri sulco non ultra basin protenso; prothorace non carinato.

G2 Prothorace longitudine non latiore, rude remote punctato..... 349 *cribricollis*. 384

G1 Prothorace longitudine paulo latiore, densius punctato. 350 *umbilicatus*. 385

F1 Rostri sulco in frontem prolongato; prothorace subtiliter carinato..... 351 *sulcirostris*. 386

E1 Elytris breviter ovatis 353 *setosulus*. 388

D1 Prothorace densius subtiliusque punctato, punctis non umbilicatis.

E3 Elytris glabris, interstitiis seriatim setosis.

F2 Elytris oblongo-ovatis; corpore magno.

352 *comparabilis*. 387

F1 Elytris breviter ovatis; corpore parvo.. 363 *gravidus*. 761

E4 Elytris sat dense, interdum maculatim tomentoso.

F2 Prothorace longitudine non latiore.

G2 Anten. funiculi articulo 2° primo sesqui-longiore.

354 *humilis*. 388

G1 Anten. funiculi articulo 2° primo vix longiore.

355 *tomentosus*. 389

F1 Prothorace longitudine latiore, confertissime punctato.

356 *villosus*. 760

E3 Elytris dense flavo-hirtis, setulisque longis in interstitiis.

358 *flavimanus*. 390

E2 Elytris squamulis piliformibus griseis, adpressis æqualiter obsitis..... 357 *Ferrarii*. 390

| | |
|--|----------------------------------|
| E1 Elytris maculatim metallico-squamosis, interstitiisque seriatim setosis. | |
| F2 Rostro longo, plano, confertim punctato.. | 359 <i>elatior.</i> 391 |
| F1 Rostro brevior, impresso, rugoso-punctato. | |
| G2 Prothorace brevior, carinato.... | 360 <i>neapolitanus.</i> 392 |
| G1 Prothorace longior, non carinato .. | 362 <i>pulchellus.</i> 392 |
| C1 Niger; rostro carinato. | |
| D2 Prothoracis disco remote punctato..... | 364 <i>picimanus.</i> 393 |
| D1 Prothoracis disco confertim punctato | 365 <i>Coyei.</i> 394 |
| B1 Prothorace depresso, longitudine latiore, lateribus valde rotundato-ampliato. | |
| C3 Elytrorum interstitiis antice punctatis, postice granulatis. | |
| D2 Femoribus inermibus. | |
| E2 Prothorace confertim subtiliter punctato. | |
| F2 Supra pilis adpressis obsitus..... | 375 <i>hebræus</i> , var. 398 |
| F1 Supra pilis erectis obsitus. | 376 <i>Marseuli.</i> 400 |
| E1 Prothorace rude punctato. | |
| F2 Prothorace longitudine vix latiore..... | 377 <i>bardus.</i> 403 |
| F1 Prothorace longitudine multo latiore, confertim punctato. | |
| G2 Anten. funiculi articulo 2º primo brevior. | |
| | 378 <i>cribrosicollis.</i> 403 |
| G1 Anten. funiculi articulo 2º primo longior. | |
| | 379 <i>rutilipes.</i> 168 |
| D1 Femoribus anticis dentatis. | |
| E2 Prothorace remote punctato, interstitiis punctorum his latioribus. | |
| F2 Prothorace punctis sat magnis; femoribus anticis dente minuto armatis..... | 380 <i>paradoxus.</i> 401 |
| F1 Prothorace punctis parvis; femoribus anticis dente valido armatis..... | 381 <i>semituberculatus.</i> 763 |
| E1 Prothorace confertim punctato, interstitiis punctorum his angustioribus..... | 382 <i>semigranulatus.</i> 400 |
| C2 Elytr. interstitiis antice lævibus, postice granulatis. | |
| | 374 <i>juvenilis.</i> 402 |
| C1 Elytr. interstitiis structura conformi, punctatis, granulatis sive rugosis, rugis interdum postice paulo fortioribus. | |
| D3 Elytr. pilis longis adpressis. | |
| E2 Evidenter punctato-striatis..... | 366 <i>impeus.</i> 395 |
| E1 Subtilissime punctato-striatis | 375 <i>hebræus.</i> 398 |
| D2 Elytris seriatim breviter setosis. | |

| | | |
|--|-----|----------------------------|
| E2 Prothorace longitudine multo latiore. | | |
| F2 Brevis; elytris profunde sulcatis..... | 368 | <i>Gastonis.</i> 397 |
| F1 Oblongus; elytris subtiliter sulcatis. | 369 | <i>planithorax.</i> 397 |
| E1 Prothorace longitudine parum latiore... | 370 | <i>Annibali.</i> 762 |
| D1 Elytris sine pilis et setis vel subtilissime parce pubescentibus. | | |
| E2 Prothorace subtiliter plus minusve dense punctato. | | |
| F2 Interstitiis punctorum his non latioribus. | 371 | <i>poricollis.</i> 398 |
| F1 Interstitiis punctorum his multo latioribus. | | |
| G2 Brunneus; elytris evidenter punctato-striatis. | | |
| | 372 | <i>unctuosus.</i> 399 |
| G1 Niger; elytris subtiliter punctato-striatis. | 373 | <i>ponticus.</i> 762 |
| E1 Prothorace rude punctato. | | |
| F2 Punctis magnis, parum profundis..... | 383 | <i>foveicollis.</i> 404 |
| F1 Punctis parvis | 384 | <i>messenicus.</i> 763 |
| A1 Prothorace granulato. | | |
| B2 Prothorace longitudine vix latiore.... | 385 | <i>concavirostris.</i> 405 |
| B'1 Prothorace longitudine multo latiore..... | 386 | <i>Allardi.</i> 405 |

SUBGENUS IV. — **TOURNIERIA.**

COHORS I.

| | | |
|---|-----|------------------------------|
| A3 Anten. funic. articulo 2 ^o primo non aut vix longiore. | | |
| B4 Prothorace punctato. | | |
| C2 Griseo-pilosus..... | 394 | <i>ampliocollis.</i> 410 |
| C1 Squamulis griseis brunneisque variegatus. | 396 | <i>balcanicus.</i> 412 |
| B3 Prothorace granulato. | | |
| C2 Prothorace latitudine longiore. | | |
| D2 Parce pubescens; rostro profunde sulcato. | | |
| | 392 | <i>grandicollis.</i> 409 |
| D1 Tomento fusco densissime obsitus; rostro plano. | | |
| | 400 | <i>pelliceus.</i> 414 |
| C1 Prothorace latitudine brevior, lateribus rotundo-ampliato. | | |
| D2 Long. fere 10 mill. Prothorace ante basin constricto. | | |
| | 393 | <i>constricticollis.</i> 410 |
| D1 Long. 6 mill. Prothorace ante basin non constricto. | | |
| E2 Rostro sulcato; prothorace longitudine multo latiore. | | |
| F2 Elytris latioribus, subtilius punctato-striatis, tomento densiore..... | 399 | <i>crispus.</i> 413 |

| | | |
|--|----------------------------|-----|
| F1 Elytris angustioribus, profundius punctato-striatis, tomento parciore..... | 397 <i>brunneus</i> . | 412 |
| E1 Rostro non aut obsolete sulcato; prothorace longitudine parum latiore..... | 398 <i>pubifer</i> . | 413 |
| B2 Prothorace granulato et carinato..... | 405 <i>vitellus</i> . | 380 |
| B1 Prothorace granulato, canaliculato; elytr. interstitiis alte carinatis..... | 406 <i>hystrix</i> . | 417 |
| A2 Ant. funiculi articulo 2° primo fere duplo longiore; elytr. interstitiis convexis, transversim rugosis. | 403 <i>tomentifer</i> (*). | 416 |
| A1 Ant. funiculi articulo 2° primo brevior. | | |
| B2 Major, paulo latior; tomento parciore; rostro leviter impresso et carinato..... | 401 <i>velutinus</i> . | 415 |
| B1 Minor, paulo angustior; tomento densiore; rostro plano et vix carinato..... | 402 <i>exilis</i> . | 415 |

COHORS II.

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| A2 Femoribus anticis dente valido armatis. | | |
| B2 Elytris obsolete striatis; prothoracis disco confertim punctato. | 408 <i>armeniacus</i> . | 419 |
| B1 Elytris evidenter striatis; prothoracis disco granulato. | | |
| C2 Prothorace non carinato. | | |
| D2 Long. 12 mill. Ant. funic. articulo 2° primo longiore; prothorace antice angustiore quam postice; sutura postice non carinata..... | 407 <i>crassicollis</i> . | 418 |
| D1 Long. 6 mill. Ant. funic. articulo 2° primo vix longiore; prothorace antice latiore quam postice; sutura postice carinata..... | 411 <i>coarctatus</i> . | 421 |
| C1 Prothorace carinato. | | |
| D2 Dense squamosus. | | |
| E2 Squamulis piliformibus; elytrorum striis profunde foveolatis..... | 409 <i>scopularis</i> . | 419 |
| E1 Squamulis rotundatis sive lanceolatis; striis profunde obsolete punctatis..... | 410 <i>zebra</i> . | 420 |
| D1 Griseo-pubescens; elytris subtiliter striatis, striis non punctatis..... | 412 <i>formicarius</i> . | 422 |
| A1 Femoribus omnibus denticulo minuto armatis .. | 413 <i>albidus</i> . | 423 |

(*) 404. *Decussatus*, Hoch., p. 417, qui ne diffère (d'après Hochhuth) de *tomentifer* que par le front déprimé et une carène transversale sur le rostre entre les antennes, en est probablement une simple variété.

COHORS III.

| | | PAGES. |
|-----|--|------------------------------|
| A3 | Femoribus anticis fortiter dentatis, supra glaber vel parum pubescens, pubescentia apicem versus tantum conspicua, elytrorum interstitiis punctatis. | |
| B2 | Prothorace remote punctulato..... | 435 <i>nudus.</i> 438 |
| B1 | Prothorace confertim evidenter punctato. | |
| C2 | Elytris breviter ovatis..... | 436 <i>Faldermanni.</i> 438 |
| C1 | Elytris oblongo-ovatis. | |
| D2 | Elytris convexis, subtilissime punctulatis. | 434 <i>globicollis.</i> 199 |
| D1 | Elytris planiusculis, evidenter punctatis. | 433 <i>laeviusculus.</i> 437 |
| A2 | Femoribus anticis fortiter dentatis; supra pilosus. | |
| B2 | Elytris ovatis. | |
| C3 | Prothorace granulato. | |
| D2 | Tibiis anticis intus denticulatis. | |
| E3 | Femoribus omnibus dente valido armatis; ant. funiculi articulis omnibus latitudine longioribus. | |
| F2 | Ant. funiculi articulo 2 ^o primo latitudine non brevior. | 414 <i>anadolicus.</i> 425 |
| F1 | Ant. funiculi articulo 2 ^o primo latitudine brevior. | 422 <i>griseus.</i> 430 |
| E2 | Femoribus omnibus valide dentatis; anten. funic. articulis externis latitudine brevioribus; elytris breviter ovatis. | 426 <i>bisphaericus.</i> 432 |
| E1 | Femoribus posticis denticulo minuto armatis. | |
| F2 | Elytris breviter ovatis..... | 425 <i>cornicinus.</i> 431 |
| F1 | Elytris oblongo-ovatis | 423 <i>asiaticus.</i> 430 |
| D1 | Tibiis anticis non denticulatis. | |
| E2 | Elytris setis erectis obsitis. | |
| F2 | Elytris pilis adpressis griseis obsitis.. | 421 <i>maxillosus.</i> 429 |
| F1 | Elytris pilis adpressis griseis non obsitis. | 425 <i>elongatus.</i> 431 |
| E1 | Elytris sine setis erectis. | |
| F2 | Antennis gracilibus. | |
| G2 | Prothorace latitudine longiore..... | 419 <i>longipes.</i> 764 |
| G1 | Prothorace latitudine brevior..... | 418 <i>brachialis.</i> 427 |
| F'1 | Antennis brevibus, articulis latitudine latioribus. | 420 <i>frater.</i> 428 |
| B1 | Elytris globosis. | |
| C2 | Prothorace evidenter punctato..... | 427 <i>ottomanus.</i> 433 |
| C1 | Prothorace subtilissime punctato | 428 <i>Friwaldskyi.</i> 434 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| A1 Femoribus anticis dente minuto armatis. | | |
| B3 | Prothorace longitudine multo latiore; elytris breviter ovatis, hirsutis..... | 432 <i>tumidicollis.</i> 437 |
| B2 | Prothorace longitudine parum latiore; elytris oblongo-ovatis. | |
| C2 | Elytris evidenter punctato-striatis. | |
| D2 | Elytris latitudine duplo longioribus.... | 415 <i>ovalipennis.</i> 426 |
| D1 | Elytris latitudine sesqui-longioribus. | |
| E2 | Prothorace elytrorumque interstitiis granulatis. | |
| | | 417 <i>pulvinatus.</i> 427 |
| E1 | Prothorace disco anteriori punctato; elytr. interstitiis seriatim punctatis vel transversim rugosis. | |
| | | 431 <i>nitidus.</i> 436 |
| C1 | Elytris seriatim punctatis | 416 <i>transylvanicus.</i> 426 |
| B1 | Prothorace latitudine longiore, rude punctato; elytris oblongo-ovatis, profunde punctato-striatis. | |
| | | 430 <i>altaicus.</i> 435 |

NOTE. — Les numéros qui précèdent les noms indiquent l'ordre rectifié dans lequel doivent être placées les espèces du genre *Otiorhynchus*.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS GÉNÉRIQUES ET SPÉCIFIQUES

| | PAGES. |
|---|--------|
| <i>acatum</i> Gyl. 34 Ot. 306 ^a | 411 |
| <i>achæus</i> Stierl. 61 Ot. 235 ^e | 332 |
| <i>Achardi</i> Desb. 72 Phyl. 3 | 675 |
| <i>acuminatus</i> Wollst. 54 Lich. 2. | 507 |
| <i>acuminatus</i> Bohm. 43 Phyl. 14. | 689 |
| <i>adscitus</i> Germ. 24 Ot. 151. | 253 |
| <i>adpersus</i> Bohm. 43 Ot. 207 ^a | 303 |
| <i>adumbratus</i> (Bej.) Ot. 1 <i>var.</i> | 109 |
| <i>adusticornis</i> Kiesw. 51 Per. 21. | 76 |
| <i>ancopunctatus</i> Gyl. 13 Ot. 222. | 317 |
| <i>ænescens</i> Wollst. 54 Laph. 56. | 556 |
| <i>ærifera</i> Germ. 24 Ot. 249. | 345 |
| <i>æthiops</i> Wollst. 64 Laph. 12. | 522 |
| <i>affaber</i> Bohm. 43 Ot. 121. | 227 |
| <i>affinis</i> Stierl. 61 Ot. 86. | 201 |
| <i>affinis</i> Hoch. 47 Ot. 197 ^b | 292 |
| <i>affinis</i> Redt. 49 Ot. 256. | 349 |
| <i>affinis</i> Wollst. 64 Laph. 29 <i>var.</i> | 533 |
| <i>agnathus</i> Gyl. 34 Ot. 267 <i>var.</i> | 359 |
| <i>albarius</i> Reiche 57 Strophom. 2. | 479 |
| <i>albidus</i> Stierl. 61 Ot. 319 | 423 |
| <i>albomarginatus</i> Luc. 46 Höl. 2. | 12 |
| <i>albopunctatus</i> Luc. 46 Höl. 1. | 10 |
| <i>algerinus</i> Seidl. 68 Trachyph. 21 | 627 |
| <i>Allardi</i> Stierl. 72 Ot. 302 ^a | 405 |
| <i>alneti</i> F. 61 Phyl. 5. | 677 |
| <i>alpestris</i> Stierl. 58 Ot. 125 | 231 |
| <i>alpicola</i> Bohm. 43 Ot. 269. | 361 |
| <i>alpigradus</i> Mill. 59 Ot. 238. | 335 |
| <i>alpinus</i> Stierl. 59 Phyl. 47. | 727 |
| <i>altaicus</i> Stierl. 61 Ot. 329 ^a | 435 |
| <i>alternans</i> Gyl. 34 Trachyph. 10. | 616 |
| <i>alutaceus</i> Germ. 17 Ot. 65. | 175 |
| <i>amabilis</i> Stierl. 61 Ot. 57. | 164 |
| <i>ambiguus</i> Steph. Sch. 43 Ot. 279 | 373 |
| <i>amphibius</i> M 72 Plat. 9. | 598 |
| Amphora Wollst. 65 19 ^e S-G. | 540 |

| | PAGES. |
|--|--------|
| <i>amplicolis</i> Stierl. 61 Ot. 306. | 410 |
| <i>amplificatus</i> Wollst. 65 Lichen 3 | |
| <i>var.</i> | 507 |
| <i>amplipennis</i> Fairm. 59 Ot. 49. | 156 |
| <i>amputatus</i> Chev. 72 Ot. 64 ^a | 174 |
| <i>andalusicus</i> Seidl. 68 Baryp. 15 | |
| <i>var.</i> | 586 |
| <i>anadolicus</i> Bohm. 43 Ot. 320 | 425 |
| ANEMOPHILUS Wollst. 54 19 ^e | 501 |
| <i>angustatus</i> Stierl. 72 Stom. 4 | 766 |
| <i>angustatus</i> (Mærk) 72 Ot. 59 <i>var.</i> | 167 |
| <i>angusticollis</i> Bohm. 43 Ot. 166 ^a | 267 |
| <i>angustior</i> Rosh. 47 Ot. 225. | 320 |
| <i>angustulus</i> Wollst. 63 Laph. 42. | 544 |
| <i>angustulus</i> Wollst. 57 Laph. 54 | 535 |
| <i>Annibali</i> Stierl. 72 Ot. 301 ^r | 762 |
| <i>anophthalmus</i> Schmidt 66 Ot. 341 | 449 |
| <i>anoplus</i> Fœrst. 49 Tachyph. 9. | 615 |
| <i>antennatus</i> Stierl. 61 Ot. 139. | 243 |
| <i>anthracinus</i> Scop. 1763 Ot. 334. | 441 |
| ANOMUS Bohm. 34 16 ^e | 490 |
| <i>Apollinis</i> Mill. 62 Phyl. 10. | 684 |
| APREPES Sch. 47 15 ^e | 489 |
| <i>aquila</i> M. 72 Per. 41. | 95 |
| <i>aquilus</i> Chev. 60 Per. 41. | 95 |
| <i>aquilus</i> Seidl. 65 Per. 40. | 94 |
| <i>arabicus</i> Bohm. 43 Mylloc. 2. | 744 |
| <i>arachnoides</i> Stierl. 61 Ot. 77. | 191 |
| <i>araneiformis</i> Schranck. 1781 Ba- ryp. 11 | 582 |
| <i>arenosus</i> Stierl. 61 Ot. 115. | 223 |
| <i>arenosus</i> (Bej.) Stierl. Ot. 71 <i>var.</i> | 183 |
| <i>argentatus</i> L. 1735 Phyll. 26. | 703 |
| <i>argenteus</i> Stierl. 61 Ot. 89 | 203 |
| <i>argillosus</i> Hoch. 51 Ot. 91 ^a | 382 |
| <i>argutus</i> Bohm. 43 Ot. 80. | 193 |
| <i>Ariasi</i> (Chev.) Ot. 41 <i>var.</i> | 149 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|--|--------|--|--------|
| <i>aristatus</i> Gyl. 27 Trachyp. 24... 632 | | <i>bellopterus</i> M. 72 Lapor. 20... 527 | |
| <i>armadillo</i> Rossi 1792 Ot. 48... 134 | | <i>bellus</i> M. 72 Pholie. 5... 486 | |
| <i>armatus</i> Bohm. 43 Ot. 208... 304 | | <i>betulae</i> F. 61 Phyl. 21... 697 | |
| <i>armatus</i> Seidl. 68 Myl. 10... 27 | | <i>bicostatus</i> Bohm. 43 Ot. 133... 237 | |
| <i>armeniacus</i> Hoch. 47 Ot. 314 ^a ... 419 | | <i>bidentatus</i> Stev. 29 Elytrod. 2... 495 | |
| <i>arnicus</i> Fairm. 66 Ot. 275 ^a ... 368 | | <i>Bielzi</i> Kust. 49 Ot. 247 <i>var.</i> ... 343 | |
| <i>arnipes</i> Seidl. 68 Cyclom. 3... 17 | | <i>bifoveolatus</i> Be. k. 17 Trachyp. 19 625 | |
| <i>arnipotens</i> M. 71 Mylac. 10... 27 | | <i>Bischoffi</i> Stierl. 58 Ot. 260... 352 | |
| <i>artenisiae</i> Desb. 73 Phyl. 42... 722 | | <i>bisignatus</i> Germ. 24 Ptoch. 12... 470 | |
| <i>asiae</i> Stierl. 61 Ot. 327... 430 | | <i>bison</i> M. 72 Bubaloceph. 1... 500 | |
| <i>asper</i> Marsh. 62 Ot. 177... 273 | | <i>bispharicus</i> Reiche 57 Ot. 323... 432 | |
| <i>asphaltinus</i> Germ. 24 Ot. 240... 337 | | <i>bispinus</i> Sturm. 26 Elytrod. 2... 495 | |
| <i>asphaltinus</i> Gyl. 34 Trachyp. 24 632 | | <i>bisulcatus</i> F. 1781 Ot. 18... 158 | |
| <i>aspleni</i> Mill. 68 Ot. 235 ^a ... 331 | | <i>blandus</i> Gyl. 34 Ot. 159... 261 | |
| <i>assimilis</i> M. 72 Ot. 86... 201 | | <i>Bohemanni</i> Zett. 38 Omias 8... 563 | |
| <i>astragali</i> Stierl. 61 Per. 3... 47 | | <i>Bonvouloiri</i> Stierl. 66 Ot. 260 ^a ... 353 | |
| <i>asturiensis</i> Chev. 69 Ot. 67 ^b ... 759 | | <i>brachialis</i> Bohm. 43 Ot. 322 ^b ... 427 | |
| <i>ater</i> Herbst. 1795 Ot. 59... 165 | | <i>brachycornis</i> Desb. 73 Phyl. 23... 700 | |
| <i>aterrimus</i> Bohm. 43 Ot. 270... 362 | | Brachysomus Sch. 26 24° S-G. 589 | |
| Atlantis Wollst. 54 Lapor. 21°. 539 | | <i>breviatus</i> Desb. 73. Phyl. 28... 705 | |
| <i>atropterus</i> de G. 1781 Ot. 71 ^f ... 183 | | <i>brevicollis</i> (Seidl.) 72 Per. 27... 86 | |
| <i>atrorirens</i> Gyl. 34 Phyl. 3... 677 | | <i>brevicornis</i> Bohm. 43 Ot. 164... 265 | |
| <i>auctus</i> Wollst. 64 Lichenop. 3... 507 | | <i>brevirostris</i> Bris. 66 Trachyp. 23 630 | |
| <i>aureocruciat</i> Desb. 71 Trach. 6 ^a 612 | | <i>brevis</i> Gyl. 34 Phyl. 53... 735 | |
| <i>aureolus</i> Gyl. 34 Ot. 193... 289 | | <i>breviusculus</i> M. 68 Strophom. 3... 480 | |
| <i>auricapillus</i> Germ. 24 Ot. 256... 349 | | <i>Brisouti</i> Desbr. 72 Phyl. 8... 681 | |
| <i>auricomus</i> Germ. 24 Ot. 211... 316 | | <i>Bruckensis</i> M. Ot. 224 ^a ... 757 | |
| <i>aurifer</i> Bohm. 43 Ot. 25... 135 | | <i>Brucki</i> Stierl. 73 Ot. 224 ^a ... 757 | |
| <i>aurifer</i> Bohm. 43 Ot. 21 <i>var.</i> ... 698 | | <i>Brucki</i> Seidl. 65 Per. 29... 87 | |
| <i>aurohitus</i> Seidl. 68 Platytars. 2... 593 | | <i>Bructeri</i> Germ. 24 Ot. 151... 253 | |
| <i>auropunctatus</i> Gyl. 34 Ot. 69... 169 | | <i>brunneus</i> Stev. 29 Ot. 308... 412 | |
| <i>auropupillatus</i> Stierl. 61 Ot. 16... 126 | | <i>brunnipes</i> Ot. 68 Barypeith. 11... 582 | |
| <i>aurosparus</i> Germ. 24 Ot. 175... 271 | | BUBALOCEPHALUS Capiom. 67 18° 499 | |
| <i>aureus</i> Bohm. 43 Platytars. 1... 592 | | <i>buccator</i> Wollst. 65 Lichen 9... 512 | |
| <i>aureus</i> Muls. 59 Ot. 151 <i>var.</i> ... 253 | | | |
| <i>australis</i> Wollst. 54 Lapor. 45 ^a 547 | | <i>caesipes</i> Muls. 61 Ot. 43... 450 | |
| <i>austriacus</i> F. 61 Ot. 253... 348 | | <i>calcaratus</i> F. 61 Phyl. 5... 677 | |
| AXYREUS Kiesw. 64 27°... 657 | | <i>calceator</i> Wollst. 54 Lapor. 44... 546 | |
| | | <i>camaldulensis</i> Rott. 70 Ot. 343... 451 | |
| <i>Bachi</i> Bach. 54 Coenops. 1... 97 | | <i>canaliculatus</i> Schaaf. 67 Trach. 34 638 | |
| <i>baticus</i> Schaaf. 61 Mylac. 13... 29 | | <i>canalirostris</i> M. 72 Lapor. 36... 537 | |
| <i>baicanicus</i> Stierl. 61 Ot. 307... 412 | | <i>canariensis</i> Bohm. 43 Lapor. 38... 540 | |
| <i>banaticus</i> Stierl. 61 Ot. 92... 207 | | <i>cancellatus</i> Bohm. 43 Ot. 183... 280 | |
| <i>bardus</i> Bohm. 43 Ot. 302 ^f ... 403 | | <i>candidatus</i> Perris 65 Phyl. 738 | |
| BARYPEITHES Duv. 53 23°... 570 | | Canopus Wollst. 65 21° S-G... 541 | |

| | PAGES. | | PAGES. |
|--|--------|--|--------|
| <i>caucus</i> Gyl. 34 Phyl. 12 | 687 | <i>clavipes</i> Bohm. 43 Ot. 32 <i>var.</i> .. | 141 |
| <i>Capononti</i> Seidl. 62 Cathorm | | <i>clavipes</i> Ol. 68 Ot. 39..... | 147 |
| 13 <i>var.</i> | 654 | <i>clemens</i> Gyl. 34 Ot. 290..... | 381 |
| <i>carbonarius</i> Hoch. 47 Ot. 239 ^a . | 337 | <i>coarctatus</i> Stierl. 61 Ot. 317 .. | 421 |
| <i>Carceli</i> Gyl. 43 Ot. 100..... | 216 | <i>cæcus</i> Germ. 24 Ot. 58..... | 163 |
| <i>cardiniger</i> Host. 1789 = Ot. 14 | 124 | COENOPSIS Bach. 54 6 ^a | 97 |
| <i>carinatus</i> Gyl. 34 Ot. 253 <i>var.</i> ... | 348 | <i>collaris</i> F. 01 Ot. 967 <i>var.</i> | 359 |
| <i>carinatus</i> Payk. 1792 Ot. 316... 420 | | <i>collinus</i> Gredl. = Ot. 48 ^a <i>var.</i> ... | 155 |
| <i>carinirostris</i> Bohm. 43 Ptoch. 9. | 467 | <i>coloratus</i> All. 69 Trachyp. 19 ^a . | 626 |
| <i>carinthiacus</i> Germ. 17 Ot. 18 .. | 128 | <i>cornutus</i> Bohm. 39 Strophom. 1 | |
| <i>Carnagnoka</i> Stierl. 53 Ot. 180 . | 276 | <i>var.</i> | 479 |
| <i>carniolicus</i> Stierl. 62 Ot. 226 ^a . | 322 | <i>comosellus</i> Bohm. 43 Ot. 131 <i>var.</i> | 253 |
| Cataphorticus Dav. 68 6 ^a | 97 | <i>compactus</i> Wollst. 64 Lapar. 35 | 536 |
| <i>cattarvensis</i> (Ziegl.) 72 Ot. 14 <i>var.</i> | 124 | <i>Companyoni</i> Boh. . 43 Baryp. 9 | 580 |
| CATHORMOCERUS Sch. 43 26 ^a ... | 639 | <i>comparabilis</i> Bohm. 43 Ot. 294. | 387 |
| <i>caucasicus</i> Stierl. 72 Ot. 91 ^a ... | 751 | <i>compressus</i> Stierl. 61 Ot. 131.. | 236 |
| <i>caudatus</i> Rossi 1792 Ot. 17 | 127 | <i>concavirostris</i> Bohm. 47 Ot. 302 ^b | 405 |
| <i>caunicus</i> Stierl. 72 Ot. 31 ^a | 749 | <i>concinus</i> Bohm. 34 Omias 7... | 564 |
| <i>centronnctatus</i> (Ziegl.) 72 Ot. | | <i>concinus</i> Bohm. 34 Ot. 47 | 153 |
| 181 <i>var.</i> | 276 | <i>confinis</i> Steph. 31 Trachyp. 19. | 625 |
| <i>cervinus</i> Hoch. 47 Phyl. 60.... | 738 | <i>confusus</i> Bohm. 43 Ot. 193 | 292 |
| <i>chalcus</i> Stierl. 61 Ot. 98..... | 215 | <i>conglobatus</i> Seidl. 71 Holc. 5.. | 14 |
| <i>Chandonri</i> Hoch. 51 Ot. 95 ^d | 212 | <i>consentaneus</i> Bohm. 43 Ot. 5... 114 | |
| <i>Chevolati</i> Bohm. 43 Ot. 178 <i>var.</i> | 274 | <i>conspersus</i> Herbst. 1795 Ot. 95. | 210 |
| <i>Chevolati</i> Reiche 58 Elytrod. 1 | 493 | <i>conspicabilis</i> Fald. 38 Ot. 95 ^a .. | 210 |
| <i>Chevolati</i> Bohm. 43 Baryp. 3.. | 576 | <i>constricticollis</i> Stierl. 61 Ot. 305 | 440 |
| <i>Chevolati</i> Seidl. 68 Cathorm. 3. | 647 | <i>contemptus</i> Stev. 29 Phyl. 24.. | 701 |
| <i>chloris</i> Bohm. 43 Phyl. 48..... | 728 | <i>contractus</i> Stierl. 61 Ot. 3..... | 112 |
| <i>chlorizans</i> Bohm. 43 Phyl. 49... 729 | | <i>convexicollis</i> Sch. 72 Ot. 297 <i>var.</i> | 389 |
| <i>chlorophanus</i> Bohm. 43 Ot. 200 | | <i>cordicollis</i> Seidl. 68 Cathorm. 1 | 645 |
| <i>var.</i> | 294 | <i>coriarius</i> Stierl. 61 Ot. 277..... | 369 |
| Chœrorhinus Chev. 60 17 | 496 | CORIGETUS Desb. 73 31 ^a | 746 |
| <i>chrysocomus</i> Germ. 24 Ot. 83.. | 199 | <i>cornicinus</i> Stierl. 61 Ot. 326. . | 431 |
| <i>chrysomus</i> Hoch. 43 Ot. 101... 217 | | <i>cornicinus</i> (Heyd.) 72 Ot. 46 <i>var.</i> | 153 |
| <i>chrysops</i> Herbst. 1797 Ot. 338.. | 445 | <i>coronatus</i> Stierl. 72 Ot. 150 ^a ... | 753 |
| <i>chrysops</i> Gyl. 34 Ot. 340..... | 447 | <i>corrugatus</i> Gmel. 1778 Ot. 335.. | 442 |
| <i>chrysopterus</i> Stierl. 61 Ot. 315. | 419 | <i>corruptor</i> Host. 1789 = Ot. 206 | 301 |
| <i>cinerascens</i> Rosh. 56 Baryp. 16 | 588 | <i>corsicus</i> Fairm. 59 Ot. 122 | 228 |
| <i>cineceipennis</i> Gyl. 34 Phyl. 51. | 730 | <i>corsicus</i> Desb. 71 Perit..... | 748 |
| <i>cinereus</i> Gyl. 34 Phyl. 54 <i>var.</i> ... | 734 | <i>corticalis</i> Luc. 46 Ot. 27 | 137 |
| <i>cinifer</i> Germ. 17 Ot. 18 | 128 | <i>corvus</i> Bohm. 43 Ot. 234 | 328 |
| <i>civis</i> Stierl. 61 Ot. 28.... | 137 | <i>coryli</i> Chev. 63 Ot. 60 ^a | 170 |
| <i>circumcinctus</i> Bohm. 34 Ptoch. 6 | 463 | <i>costatus</i> Stierl. 61 Ot. 234 | 349 |
| <i>clathratus</i> Germ. 17 Ot. 258.... | 351 | <i>costipennis</i> Rosh. 56 Ot. 138... 242 | |
| <i>clavatus</i> Wollst. 54 Lapar. 1... 513 | | <i>costulatus</i> Fairm. 66 Cyclom. 2. | 17 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|---|--------|---|--------|
| Coyei Mars. 68 Ot. 301 ^e | 394 | dalmatinus Gyl. 34 Ot. 4 | 412 |
| crassicollis Stierl. 61 Ot. 314 | 418 | damascenus Hampe 61 Mylloc. 1 | 743 |
| <i>crassicollis</i> Stierl. 63 Phyll. 1. | 673 | dauriens Stierl. 62 Ot. 203 ^a | 300 |
| <i>crassicornis</i> Duv. 52 Per. 32. | 99 | decussatus Hoch. 51 Ot. 313 ^b | 417 |
| crassicornis Fald. 38 Ot. 95 ^e | 211 | debilis Wollst. 63 Lapa. 28. | 532 |
| crassifrons Wollst. 63 Lapa. 10. | 521 | Dejeani Bohm. 43 Ot. 340. | 447 |
| crassior Deshr. 73 Phyl. 39 ^a | 718 | delicatulus Stierl. 72 Ot. 188 ^a | 283 |
| crassipes Mots. 59 Phyl. 2. | 674 | <i>demotus</i> Redt. 49 Ot. 151. | 253 |
| crassirostris Wollst. 64 Lapa. 9 | 520 | <i>demotus</i> Bohm. 43 Ot. 151 <i>rar.</i> | 253 |
| crassulicornis M. 72 Per. 32. | 90 | denigrator Bohm. 43 Ot. 166. | 266 |
| crassus Wollst. 34 Anemop. 1. | 502 | densatus Bohm. 43 Ot. 110 | 219 |
| crataegi Germ. 24 Ot. 192 | 287 | dentipes Graells 55 Ot. 70. | 182 |
| Cremierei Bohm. 43 Per. 6. | 51 | deportatus Bohm. 34 Ptoch. 1. | 462 |
| cressa M. axyr. 1. | 657 | depressior M. 72 Ot. 119 ^a | 752 |
| creticus Stierl. 61 Ot. 273. | 365 | <i>depubes</i> Bohm. 43 Per. 4. | 48 |
| cribratostris Stierl. 72 Ot. 163 ^a | 755 | deserticola M. 72 Ptoch. 3. | 463 |
| cribricollis Gyl. 34 Ot. 291 | 384 | desertus Rosh. 47 Ot. 287. | 379 |
| cribripennis Hoch. 51 Ot. 165. | 266 | <i>desertus</i> Mots. 59 Ptoch. 3 | 463 |
| cribrosicollis Bohm. 43 Ot. 302 ^e | 403 | <i>detritus</i> Gyl. 43 Phyll. 24 | 701 |
| cribrosus Germ. 17 Ot. 80 | 195 | dicatus M. 72 Elytr. 1 | 491 |
| erinipes Mill. 63 Ot. 79 ^b | 194 | Diecki Siedl. 72 Cathorm. 4 | 647 |
| erinitarsis Stierl. 61 Ot. 69. | 182 | <i>Diecki</i> Stierl. 72 Ot. 179 ^a | 756 |
| crispus Bohm. 43 Ot. 310. | 413 | Dieckidius M. 72 Ot. 179 ^a | 756 |
| croaticus Stierl. 61 Ot. 252. | 347 | difficilis Stierl. 58 Ot. 194 | 268 |
| cruciatu Seidl. 68 Trachyph. 6. | 611 | digitalis Gyl. 27 Trachyph. 13. | 618 |
| <i>crucirostris</i> Hoch. 51 Ot. 321. | 426 | <i>Diluyui</i> Steph. 31 Ot. 278. | 371 |
| cupreo aureus Stierl. 64 Phyl. 13 | 688 | discretus Stierl. 61 Ot. 230 | 325 |
| cupreosparsus Fairm. 59 Ot. 81 | 195 | dispar Wollst. 64 Lapa. 27. | 531 |
| <i>cupreus</i> Lach. 1781 Ot. 222 | 317 | <i>dispar</i> Redt. 49 Phyll. 55 | 735 |
| cuprifer Stierl. 61 Ot. 268 | 360 | distincticornis Hoch. 47 Ot. 128 | 233 |
| curticollis M. 72 Per. 27 | 86 | distortus Wollst. 54 Lapa. 37. | 538 |
| curvimanus Duv. 53 Baryp. 8. | 580 | dives Germ. 17 Ot. 202 | 296 |
| <i>curripes</i> Stierl. 61 Ot. 236. | 333 | Dodecastichus Stierl. 61 7 ^e S-G. 109 | |
| curvipes Wollst. 64 Cathorm. 5. | 648 | dolomita Stierl. 62 Ot. 5 ^a | 115 |
| curviscapus Seidl. 68 Cathorm. 6 | 648 | dorsalis Manh. 25 Pseudomyl. 1 | 740 |
| curviscelis M. 72 Ot. 235. | 333 | habitabilis Fairm. 66 Ot. 79 ^a | 193 |
| CYCLOMAURUS Fairm. 60 2 ^e | 15 | dainensis Germ. 24 Ot. 197. | 290 |
| CYCLOPTERUS Seidl. 71 4 ^e | 30 | doleis Germ. 17 Ot. 11. | 121 |
| cylindricollis Gyl. 34 Phyl. 1. | 673 | | |
| cymophanes Germ. 17 Ot. 203. | 297 | <i>ebeninus</i> Bohm. 43 Baryp. 11. | 582 |
| cypricola Reiche 57 Ot. 227. | 323 | <i>ebeninus</i> Gyl. 34 Ot. 66 <i>rar.</i> | 177 |
| Cyphoscelis Wollst. 54 21 ^e S-G. 537 | | echidna Seidl. 65 Per. 28. | 86 |
| cypricus Seidl. 68 Omias 5. | 563 | <i>echinatus</i> Hoch. 47 Ot. 146. | 248 |
| <i>cyrtus</i> Fairm. 66 Cyclom. 2. | 17 | <i>echinatus</i> Herbst. 1795 Ot. 136. | 240 |
| | | <i>echinatus</i> Bond. 1785 Plat. 5. | 595 |

PAGES.

| | |
|--|-----|
| <i>egregius</i> Mill. 70 Ot. 232 ^a | 767 |
| <i>claboratus</i> Gyl. 44 Ot. 249 | 345 |
| <i>elator</i> Stierl. 61 Ot. 299 | 391 |
| <i>elegantulus</i> Germ. 24 Ot. 191 | 287 |
| <i>ellipticus</i> Wollst. 63 Lpar. 18. | 525 |
| <i>elongatulus</i> Fairm. 59 Per. 33 | 90 |
| <i>elongatus</i> Stierl. 61 Ot. 34 | 143 |
| <i>elongatus</i> Hoch. 47 Ot. 327 ^a | 431 |
| <i>ELYTODON</i> Sch. 26 17 ^o | 492 |
| <i>Emeryi</i> Desbr. 72 Phyl. 25 <i>var.</i> | 703 |
| <i>EPIPHANEUS</i> Sch. 43 12 ^o | 475 |
| <i>eremicola</i> Rosh. 47 Ot. 186 | 282 |
| <i>erinaceus</i> Redt. 49 Trachyp. 14. | 619 |
| <i>erythropus</i> Bohm. 43 Ot. 37 | 146 |
| <i>etruscus</i> Desb. 72 Phyl. 20 | 696 |
| Eurychirus Stierl. 61 7 ^o S-G | 384 |
| <i>excavatus</i> Wollst. 63 Lpar. 6. | 517 |
| <i>excelsus</i> Wollst. 54 Lpar. 52. | 553 |
| <i>excursor</i> Stierl. 62 Cathorm. 11 | 653 |
| <i>excursor</i> Seidl. 68 Cathorm. 10. | 652 |
| <i>excursor</i> Stierl. 62 Ot. 109 ^a | 218 |
| <i>exiguus</i> Stierl. 61 Per. 35 | 91 |
| <i>exiguus</i> <i>var.</i> Stierl. 61 Per. 37. | 92 |
| <i>exilis</i> Bohm. 43 Ot. 313 | 415 |
| <i>fæculentus</i> Gyl. 34 Phyl. 12 | 687 |
| <i>fagi</i> Gyl. 34 Ot. 35 <i>var.</i> | 144 |
| <i>Fairmairei</i> M. 71 Cyclom. 1. | 16 |
| <i>Faldermanni</i> Hoch. 47 Ot. 332 ^b | 438 |
| <i>fallax</i> M. 68 Ot. 158 | 260 |
| <i>fallax</i> (Desb.) 72 Phyl. 20 <i>var.</i> | 697 |
| <i>familiaris</i> Bohm. 34 Per. 14 | 62 |
| <i>famularis</i> Gyl. 34 Per. 14 | 62 |
| <i>femoralis</i> Bohm. 43 Phyl. 37 | 715 |
| <i>femoralis</i> Bohm. 43 Ot. 56 | 163 |
| <i>Ferrarii</i> Mill. 61 Ot. 297 ^a | 390 |
| <i>fessus</i> Bohm. 43 Phyll. 5. | 677 |
| <i>fissirostris</i> Walt. 47 Cænop. 1. | 97 |
| <i>flavimanus</i> Stierl. 61 Ot. 298 | 390 |
| <i>flavipennis</i> J. Duv. 52 Per. 26. | 83 |
| <i>Foræ</i> Wollst. 54 Lpar. 53 | 554 |
| <i>foraminosus</i> Bohm. 43 Ot. 126 | 232 |
| <i>formicarius</i> Stierl. 61 Ot. 318 | 422 |
| <i>forticornis</i> Bohm. 34 Omias 10. | 568 |
| <i>fortis</i> Rosh. 47 Ot. 30 | 139 |

PAGES.

| | |
|---|-----|
| <i>fossicollis</i> M. 72 Lichen. 8 | 511 |
| <i>fossor</i> Bohm. 43 Ot. 60 <i>var.</i> | 169 |
| <i>foveicollis</i> Hoch. 47 Ot. 302 ^g | 404 |
| <i>francolinus</i> (Schaul.) = Ot. 34. | 143 |
| <i>frater</i> Stierl. 61 Ot. 324 | 428 |
| <i>fraternus</i> Stierl. 61 Ot. 144 | 247 |
| <i>fraxini</i> Germ. 24 Ot. 211 <i>var.</i> | 309 |
| <i>Freseati</i> Bohm. 43 Ot. 114 | 221 |
| <i>frigidus</i> Muls. 60 Ot. 182 | 277 |
| <i>fritillus</i> Wollst. 54 Lichen f | 506 |
| <i>fruticulos</i> Herbst. 1798 Ot. 22 | 132 |
| <i>Friwaldskyi</i> Rosh. 56 Ot. 330 | 434 |
| <i>fullo</i> Schrank 1781 Ot. 316 | 420 |
| <i>fulvago</i> Stev. 29 Phyl. 6 | 679 |
| <i>fulvidipes</i> M. 72 Ptoch. 11 | 468 |
| <i>fulvipes</i> Gyl. 34 Ot. 157 | 258 |
| <i>fulvipes</i> Hoch. 51 Ptoch. 11 | 468 |
| <i>fulvipes</i> Bohm. 34 Phyl. 6 | 679 |
| <i>fulvipilis</i> Desbr. 73 Phyl. 25 | 702 |
| <i>fulvus</i> F. 1781 Ot. 87 <i>var.</i> | 202 |
| <i>fumigatus</i> Bohm. 43 Phyl. 7 | 680 |
| <i>funicularis</i> Gyl. Ot. 211 | 309 |
| <i>furinus</i> Chev. 60 Per. 41 | 95 |
| <i>fuscipes</i> Ol. 08 Ot. 35 | 144 |
| <i>fusciventris</i> Fuss. 68 Ot. 220 ^a | 757 |
| <i>Fussi</i> Kust. 49 Ot. 201 <i>var.</i> | 295 |
| <i>gallicanus</i> Gyl. 34 Ot. 113 | 220 |
| <i>gallicus</i> Stierl. 61 Ot. 44 | 151 |
| <i>Gastonis</i> Fairm. 67 Ot. 301 ^f | 397 |
| <i>Gautardi</i> Stierl. 61 Ot. 271 | 362 |
| <i>gemellatus</i> Beck. 17 Ot. 136 | 240 |
| <i>gemmatus</i> F. 1777 Ot. 200 | 294 |
| <i>Genei</i> Sturm. 43 Ot. 194 | 288 |
| <i>geniculatus</i> Germ. 17 Ot. 7 | 116 |
| <i>Ghestleri</i> Stierl. 61 Ot. 281 | 374 |
| <i>Ghilianii</i> Fairm. 56 Ot. 52 | 159 |
| <i>gibbicollis</i> Bohm. 43 Ot. 329 | 435 |
| <i>giganteus</i> Fairm. 60 Elytrod. 3. | 496 |
| <i>giraffa</i> Germ. 17 Ot. 206 | 301 |
| <i>glabellus</i> Rosh. 47 Ot. 288 | 379 |
| <i>glabratus</i> Stierl. 61 Ot. 337 ^a | 443 |
| <i>glabricollis</i> Bohm. 43 Ot. 160 | 262 |
| <i>globatus</i> M. 72 Ot. 148 ^a | 250 |
| <i>globicollis</i> Hoch. 47 Ot. 83 ^a | 199 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|--|--------|--|--------|
| <i>globithorax</i> Bohm. 43 Ot. 303 ^c . | 408 | <i>Grenieri</i> Seidl. 65 Per. 18..... | 73 |
| <i>globosipennis</i> M. 72 Lapar. 15.. | 524 | <i>Grenieri</i> All. 68 Ot. 342..... | 449 |
| <i>globosus</i> Gyl. 34 Mylac. 8..... | 25 | <i>griseopunctatus</i> Bohm. 43 Ot. 32 | 141 |
| <i>globulicollis</i> Seidl. 71 Per. 12.. | 61 | <i>griseopunctatus</i> de G. 1775 Ot. 136 | 240 |
| <i>globulipennis</i> Wollst. 64 Lap. 15 | 524 | <i>griseopunctatus</i> de G. 1775 Ot. 218 | 314 |
| <i>globulipennis</i> Gyl. 34 Ot. 333 ^c . | 440 | <i>griseus</i> Muls. 58 Ot. 110.... | 219 |
| <i>globulus</i> Bohm. 43 Mylac. 2... . | 22 | <i>griseus</i> Kirsch. 71 Ot. 323 ^a | 430 |
| <i>globulus</i> Gredl. 66 Ot. 148 ^a | 250 | <i>griseus</i> Ot. 08 Per. 15..... | 65 |
| <i>globus</i> Bohm. 43 Ot. 193..... | 288 | <i>grosseopunctatus</i> Wollst. 64 La- | |
| <i>globus</i> Seidl. 68 Baryp. 1..... | 574 | par. 7..... | 518 |
| <i>glomeratus</i> Bohm. 34 Mylac. 9. . | 26 | <i>gnadarramus</i> Seidl. 68 Trach. 27 | 634 |
| <i>glycyrrhiza</i> Stierl. 62 Chloeb... . | 739 | <i>gutula</i> Fairm. 59 Ot. 85..... | 201 |
| <i>glomulus</i> Ménét. 32 Mylac. 9.. . | 26 | Gymnomorphus Seidl. 65 5 ^o S-G. . | 44 |
| <i>glonus</i> M. 72 Baryp. 1..... | 574 | <i>gyraticollis</i> Stierl. 61 Ot. 75... . | 189 |
| <i>Gobanzi</i> Gredl. 68 Ot. 151 ^a | 754 | <i>gyratus</i> Gyl. 34 Phyl. 39..... | 717 |
| <i>Godarti</i> Seidl. 68 Trachyp. 4... . | 610 | <i>gyrosicollis</i> Bohm. 43 Stomod. 1 | 454 |
| <i>Godeti</i> Gyl. 34 Ot. 296..... | 388 | | |
| <i>gortzensis</i> Herbst. 1797 Ot. 14. . | 124 | <i>hæmatopus</i> Rosh. 56 Mylac. 4.. . | 23 |
| <i>gomeræcola</i> M. 72 Lapar. 26... . | 531 | <i>hæmatopus</i> Bohm. 43 Ot. 36... . | 145 |
| <i>Goryi</i> Bohm. 43 Nastus 1... . . | 473 | <i>hamatus</i> Seidl. 72 Per. 34..... | 91 |
| <i>Gougeleti</i> Seidl. 65 Per. 19.... | 74 | <i>Hampei</i> Stierl. 61 Ot. 190..... | 286 |
| <i>gracens</i> M. 72 Cathorm. 12.... | 653 | <i>Hanaki</i> Friv. 66 Omias 1..... | 561 |
| <i>gracilicornis</i> Seidl. 68 Trach. 17 | 623 | <i>hebes</i> Bohm. 43 Phyl. 1..... | 673 |
| <i>gracilior</i> Fairm. 70 Cathorm. 7 ^a . | 630 | <i>hebraeus</i> Stierl. 61 Ot. 301 ^h ... | 398 |
| <i>gracilipes</i> Bohm. 34 Om. 10.... | 568 | <i>Heeri</i> Stierl. 58 Ot. 97..... | 214 |
| <i>gracilis</i> Wollst. 64 Lapar. 26.. . | 531 | <i>hellenicus</i> Stierl. 72 Ot. 300 ^a .. | 760 |
| <i>gracilis</i> Seidl. 68 Cathorm. 12. . | 653 | <i>Henoni</i> Fairm. 67 Ot. 121 ^a | 228 |
| <i>gracilis</i> Gyl. 34 Ot. 262.. . . . | 355 | <i>helveticus</i> Bohm. 43 Ot. 244... . | 141 |
| <i>gracilis</i> Beck. 17 Baryp. 11.... | 582 | <i>heteromorphus</i> Rott. 71 Ot. 198 ^a | 766 |
| <i>gracilis</i> Chev. 61 Per. 41 var.. . | 95 | <i>Heydeni</i> Stierl. 61 Ot. 9..... | 119 |
| <i>grævus</i> Stierl. 61 Ot. 214..... | 311 | <i>hirticornis</i> Herbst. 1795 Per. 4. . | 48 |
| <i>granatus</i> (Parreys.) 72 Ot. 208 var. | 304 | <i>hirsutulus</i> F. 1793 Platyt. 5.... | 595 |
| <i>grandicollis</i> Bohm. 43 Ot. 304.. . | 409 | <i>hirticulus</i> M. 72 Cathorm. 10... . | 652 |
| <i>grandicornis</i> Stev. 29 Ptochus 12 | 470 | <i>hirtus</i> Seidl. 67 Phyl. 17..... | 693 |
| <i>grandineus</i> Germ. 24 Ot. 251... . | 347 | <i>hirtus</i> Wollst. 64 Lapar. 13.... | 522 |
| <i>Grandini</i> Deshr. 71 Cathorm. 16 | 656 | <i>hirtus</i> Bohm. 45 Platyt. 8..... | 597 |
| <i>granicollis</i> Bohm. 43 Ot. 239... . | 336 | <i>hispanensis</i> M. 71 Per. 23.... | 79 |
| <i>graniger</i> Reiche 57 Ot. 100.... | 216 | <i>hispanus</i> Chev. 66 Per. 19... . | 74 |
| <i>graniventris</i> Miller 59 Ot. 252 ^a . | 213 | <i>hispanicus</i> Stierl. 62 Ot. 67 ^c ... | 180 |
| <i>granulatus</i> Seidl. 68 Trachyp. 29 | 635 | <i>hispidulus</i> (Dej.) 72 Ot. 113 var. | 221 |
| <i>granulatus</i> Herbst. 1791 Ot. 177 | 273 | <i>hispidulus</i> Herbst. 1793 Platyt. 5 | 595 |
| <i>granulosus</i> Bohm. 43 Ot. 124... . | 231 | <i>hispidus</i> Stierl. 61 Parameira 1.. | 458 |
| <i>granulus</i> M. 72 Trachyp. 29.... | 635 | <i>hispidus</i> Stierl. 61 Ot. 150..... | 252 |
| <i>gravidus</i> Stierl. 72 Ot. 301 ^a ... | 761 | <i>hispidus</i> Bohm. 33 Strophom. 1 | 478 |
| <i>grayanus</i> Wollst. 65 Lapar. 42. . | 544 | <i>hispidus</i> Redt. 49 Platyt. 6.... | 596 |

| | PAGES. |
|---|--------|
| histrio Gyl. 34 Ot. 93.... | 208 |
| Hochbuthi M. 72 Ot. 116..... | 248 |
| Holcorhinus Sch. 26 1 ^o | 8 |
| holosericeus F. 01 Barypeith. 12 | 583 |
| horrens Gyl. 34 Cathorm. 7.... | 649 |
| humatus Germ. 24 Nastus 2.... | 474 |
| humilis Germ. 24 Ot. 296 | 388 |
| hungaricus Germ. 24 Ot. 33 ... | 142 |
| hybridus Seidl. 71 Per. 13..... | 61 |
| hypocrita Rosh. 47 Ot. 145.... | 247 |
| hystrix Gyl. 34 Ot. 313 ^e | 417 |
| hystrix Duv. 53 Trachyp. 22.... | 629 |
| ibericus Desbr. 72 Phyl. 46.... | |
| illotus Hoch. 47 Om. 10 ^a ... | 570 |
| illyricus Stierl. 61 Ot. 196..... | 290 |
| imbellis M. 72 Elytr. 5..... | 498 |
| impexus Gyl. 34 Ot. 301 ^e | 395 |
| impoticus Bohm. 43 Ot. 280 ... | 373 |
| impressicollis Wollst. 64 Liche- | |
| nop. 8..... | 511 |
| impressifrons Bohm. 43 Phyl. 43 | 723 |
| impressipennis (Dahl.) 72 Ot. 245 | 341 |
| impressirostris Sch. 43 Phyl. 51 | 730 |
| impressiventris Fairm. 59 Ot. 179 | 275 |
| imus Bohm. 43 Ot. 67..... | 178 |
| inæqualis Wollst. 63 Lapar. 14. | 523 |
| inauratus Bohm. 33 Pholie. 4 .. | 485 |
| incanus Gyl. 34 Phyl. 34..... | 712 |
| incivilis Fald. 38 Ot. 131 ^a | 236 |
| inclivis Stierl. 61 Ot. 131 ^a | 236 |
| incomptus Wollst. 65 Lapar. 40 | 542 |
| inconstans Wollst. 54 Lapar. 49 | 551 |
| indigenus Bohm. 34 Baryp. 14 .. | 585 |
| inductus Gyl. 34 Ot. 336 | 442 |
| indutus Wollst. 65 Lapar. 34.. | 535 |
| indutus Kiesw. 64 Mylic. 12... .. | 28 |
| inermis Bohm. 43 Elytr. 5..... | 498 |
| inermis Bohm. 43 Trachyp. 28. | 634 |
| infaustus Gyl. 34 Ot. 211 | 309 |
| infernalis Germ. 17 Ot. 231.... | 325 |
| inflatus Kolen. 58 Omias 9..... | 567 |
| inflatus Wollst. 65 Lapar. 19.. | 526 |
| inflatus Gyl. 34 Ot. 8 | 117 |
| innocuus Bohm. 43 Ot. 301 ^d . . | 396 |

| | PAGES. |
|--|--------|
| insculptus (Heer.) 71 Ot. 126 var. | 231 |
| instabilis Wollst. 54 Lapar. 51.. | 55 |
| insubricus Cristof. 33 Ot. 82. . | 196 |
| insularis Desh. 71 Per..... | |
| intercalaris Bohm. 43 Ot. 88 ^b .. | 204 |
| intersetosus Chevl. 60 Per. 39 . | 93 |
| interstitialis Germ. 24 Ot. 1... .. | 109 |
| intricatus Stierl. 72=Ot. 68 var. | 180 |
| intrusicollis Rosh. 56 Ot. 76... .. | 190 |
| intrusus Reiche 62 Ot. 234 ^a ... | 329 |
| iaunctus Stierl. 61 Ot. 216..... | 312 |
| irrasus Seidl. 68 Cathorm. 14 .. | 655 |
| irregularis Stierl. 72 Ot. 263 ^a .. | 758 |
| irritans Herbst. 1795 Ot. 55 var. | 162 |
| irroratus (Dahl.) 72 Ot. 208 | 304 |
| irroratus Bohm. 43 Phyl. 54 var. | 734 |
| irroratus Seidl. 67 Phyl. 41.... | 721 |
| islamita M. 72 Parameir. 2..... | 458 |
| istriensis Germ. 24 Ot. 18 var. | 128 |
| italicus M. 72 Per. 30..... | 88 |
| Javeti Stierl. 66 Ot. 271 ^a | 363 |
| Jovis Mill. 62 Ot. 88 ^a | 204 |
| jugicola Stierl. = Ot. 72 ^a | 186 |
| jugicola Stierl. 61 Ot. 161..... | 262 |
| juvencus Gyl. 34 Ot. 297 var.... | 389 |
| juvenilis Gyl. 34 Ot. 302 ^d | 402 |

| | |
|---|-----|
| Kiesenwetteri Capiom. 67 Bub. 1 | 500 |
| Kiesenwetteri Seidl. 65 Per. 23 | 79 |
| Kiesenwetteri Stierl. 61 Ot. 246 | 343 |
| Kindermanni Stierl. 61 Ot. 163. | 264 |
| Kirschi M. 72 Ot. 323 ^a | 430 |
| Kollari Germ. 34 Ot. 247..... | 343 |
| Kraatzi Tourn. 64 Per. | |
| Kraatzi Stierl. 61 Ot. 213..... | 310 |
| Kraatzi Kiesw. 64 Axyr. 1.... | 657 |
| Kratleri Bohm. 43 Ot. 232..... | 327 |
| Küenburgi Stierl. 66 Ot. 138 ^a . | 242 |
| kurdi tanus Stierl. 61 Ot. 78... .. | 192 |

| | |
|---|-----|
| Lacordaireius Bris. 68 25 ^o S-G. | 599 |
| lactebus Mots. 60 Ptoch. 4.... | 463 |
| lavigatocollis Gredl. 57 Ot. 83 | |
| var..... | 199 |
| lævigatus F. 1793 Ot. 46 | 152 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|---|--------|---|--------|
| <i>lavigatus</i> Gyl. 13 Ot. 158..... | 259 | <i>longipilis</i> Bohm. 42 Phyl. 27... | 704 |
| <i>læviusculus</i> Stierl. 61 Ot. 332 ^a .. | 437 | <i>longiventris</i> Kust. 49 Ot. 241... | 338 |
| <i>lamellipes</i> Wollst. 54 Lapar. 43 | 544 | <i>longulus</i> Mars. 72 Ot. 34..... | 143 |
| <i>lanatus</i> Wollst. 54 Lapar. 47... | 549 | <i>loricatus</i> Stierl. 58 Ot. 244 | 341 |
| <i>lanosimanus</i> Chev. 60 Elytrod. 4 | 496 | <i>lubricus</i> Bohm. 43 Ot. 303 ^b | 407 |
| <i>lanuginosus</i> Bohm. 43 Ot. 82 .. | 196 | <i>lugdunensis</i> Bohm. 43 Ot. 38... | 147 |
| <i>lanuginosus</i> Gyl. 34 Trachyp. 12 | 617 | <i>lugubris</i> Mots. 59 Phyl. 7.. ... | 680 |
| LAPAROCERUS Sch. 35 21 ^o | 512 | <i>lugubris</i> Gmel. 1777 Ot. 222... | 317 |
| <i>lapidicola</i> Chev. 66 Cathorm. 9. | 651 | <i>lugens</i> Germ. 17 Ot. 245..... | 341 |
| Larraldi Perris 57 Cœnops. 2... | 98 | <i>luteus</i> Stierl. 62 Ot. 75 ^a | 190 |
| <i>lasius</i> Germ. 17 Ot. 134..... | 238 | <i>lutosus</i> Stierl. 58 Ot. 120 ^a | 226 |
| <i>lateralis</i> Reiche 57 Phyl. 22 | 699 | | |
| <i>laticollis</i> Bohm. 43 Trachyp. 9. | 615 | <i>maculatus</i> Perris 70 Trachyp. 14 ^a | 620 |
| <i>latifrons</i> Hoch. 47 Ptoch. 10 ... | 468 | <i>maculicornis</i> Germ. 21 Phyl. 6. | 676 |
| <i>latipennis</i> Bohm. 43 Ot. 51 | 158 | <i>maculifer</i> Desbr. 73 Phyl. 32 .. | 710 |
| <i>latirostris</i> Bargagli 71 Ot. 346.. | 765 | <i>Maderæ</i> Wollst. 54 Cathorm. 8. | 650 |
| <i>latiscribs</i> Desb. 71 Per. | | <i>malachiticus</i> Bohm. 43 Epiph. 1 | 477 |
| <i>latissimus</i> Stierl. 61 Ot. 50 | 158 | <i>malefidus</i> Gyl. 34 Ot. 72..... | 185 |
| <i>latithorax</i> Desb. 73 Phyl. 50... | 730 | <i>mandibularis</i> Redt. 49 Ot. 123.. | 230 |
| <i>lauri</i> Stierl. 61 Ot. 6..... | 116 | <i>mandibularis</i> Chev. 63 Omias 7. | 564 |
| <i>lauripotens</i> Wollst. 54 Lapar. 45 | 547 | <i>marmoratus</i> (Manh.) Desb. 73 | |
| <i>lavandus</i> Germ. 24 Ot. 172 | 269 | Corig. 1..... | 746 |
| <i>Ledereri</i> Stierl. Ot. 267 ^a | 759 | <i>marmota</i> Stierl. 61 Ot. 224..... | 319 |
| <i>Lefebvrei</i> Gyl. 43 Ot. 26 | 136 | <i>Marquardtii</i> Fald. 37 Ot. 177 var. | 274 |
| <i>lepidopterus</i> Wollst. 64 Lapar. 20 | 527 | <i>Marqueti</i> Gaut. 63 Omias 7..... | 564 |
| <i>lepidopterus</i> F. 1796 Ot. 205... | 299 | <i>Marqueti</i> Gaut. 57 Per. 10..... | 57 |
| <i>lepidopterus</i> Bohm. 43 Pholic. 5 | 486 | <i>Marseuli</i> Stierl. 72 Ot. 302 ^b ... | 400 |
| <i>leptosphaeroides</i> Seidl. 68 Per. 38 | 92 | <i>Martini</i> Fairm. 62 Ot. 343..... | 450 |
| Leptosphaerotus Seidl. 65 5 ^o S-G | 93 | <i>mastix</i> Ol. 08 Ot. 12..... | 122 |
| <i>Lethierryi</i> Chev. 66 Cathorm. 13 | 654 | <i>manrus</i> Gyl. 13 Ot. 151 | 253 |
| <i>leucophæus</i> Sch. 26 Pholic. 4 .. | 485 | <i>maxillosus</i> Gyl. 34 Ot. 323..... | 429 |
| <i>leucogrammus</i> Germ. 24 Per. 9. | 55 | <i>Megerlei</i> F. 01 Ot. 339..... | 446 |
| LICHENOPHAGUS Wollst. 54 20 ^o .. | 505 | <i>Meira</i> Duv. 52 5 ^o S-G..... | 89 |
| <i>ligneus</i> Ol. 08 Ot. 113..... | 220 | <i>mennonius</i> Gyl. 34 Ot. 66 var.. | 177 |
| <i>ligurinus</i> Gyl. 34 Phyl. 29..... | 738 | <i>mendax</i> Wollst. 54 Lapar. 50.. | 552 |
| <i>ligustiei</i> L. 1767 Ot. 267..... | 359 | <i>mendicus</i> Wollst. 64 Lapar. 25. | 530 |
| <i>lilliputanns</i> M. 72 Cathorm. 15.. | 655 | <i>meridionalis</i> Gyl. 34 Ot. 62 ... | 171 |
| <i>linearis</i> Stierl. 61 Ot. 219..... | 314 | <i>meridionalis</i> Muls. 63 Baryp. 15 | 586 |
| <i>lincolatus</i> Fairm. 59 Strophom. 2 | 479 | <i>meridionalis</i> (Desbr.) Phyl. 45.. | 725 |
| <i>lithanthracius</i> Bohm. 43 Ot. 167. | 267 | <i>messenicus</i> Stierl. 72 Ot. 302 ^{vi} .. | 763 |
| <i>lombardus</i> Stierl. 66 Ot. 128 ^a .. | 234 | <i>metallescens</i> Seidl. 68 Omias 6. | 564 |
| <i>longicollis</i> Bohm. 34 Ptochus 7. | 466 | <i>metallescens</i> Luc. 46 Cyclom. 2 | 17 |
| <i>longicollis</i> Gyll. 34 Ot. 28 var.. | 128 | <i>metallicus</i> M. 72 Omias 6..... | 564 |
| <i>longipennis</i> Stierl. 61 Ot. 215.. | 312 | <i>micans</i> Sch. 47 Aprepes 1 | 490 |
| <i>longipes</i> Stierl. 72 Ot. 323'... .. | 764 | <i>micans</i> Seidl. 68 Omias 4..... | 563 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|--|--------|--|--------|
| <i>microphthalmus</i> Seidl. 63 Per. 37 | 92 | <i>MYLACUS</i> Sch. 43 3 ^e | 18 |
| <i>Milleri</i> Stierl. 62 Ot. 197 ^a | 291 | <i>MYLLOCERUS</i> Sch. 26 30 ^e | 743 |
| <i>minimus</i> Stierl. 61 Per. 33..... | 90 | <i>myrmecophilus</i> Seidl. 68 Trach. 26 | 633 |
| <i>minutissimus</i> Desbr. 72 Per..... | 748 | | |
| <i>misellus</i> Stierl. 61 Ot. 116..... | 223 | <i>NASTUS</i> Sch. 43 11 ^e | 472 |
| <i>Mitomermus</i> Duval. 53 25 ^e S-G. | 599 | <i>Naudini</i> Luc. 53 Ot. 55 ^a | 163 |
| <i>mixtus</i> Hoch. 47 Phyl. 57..... | 737 | <i>navarius</i> Gyl. 34 Ot. 68..... | 180 |
| <i>mœstificus</i> Gyl. 34 Ot. 337..... | 443 | <i>navicularis</i> Wollst. 54 Lapar. 48 | 550 |
| <i>mœstus</i> Gyl. 34 Ot. 274..... | 367 | <i>neapolitanus</i> Stierl. 61 Ot. 300. | 392 |
| <i>mollicomus</i> Ahr. 12 Baryp. 12. | 583 | <i>necessarius</i> Gyl. 34 Per. 24..... | 79 |
| <i>mollinus</i> Bohm. 34 Omias 8..... | 565 | <i>necessarius</i> Stierl. 61 Ot. 118.. | 225 |
| <i>monedula</i> Stierl. 61 Ot. 223..... | 318 | <i>necessus</i> M. 72 Ot. 118..... | 225 |
| <i>mononychus</i> Seidl. 65 Per. 2... | 45 | <i>neglectus</i> Stierl. 58 Ot. 82 <i>var.</i> | 196 |
| <i>monopterus</i> Fourc. 1785 Ot. 267 | 359 | <i>niger</i> F. 1775 Ot. 59..... | 165 |
| <i>montanus</i> Chev. 63 Baryp. 5.. | 577 | <i>niger</i> Marsh. 02 Ot. 39..... | 147 |
| <i>montanus</i> Chev. 66 Ot. 63 ^a ... | 173 | <i>nigrans</i> Fairm. 62 Per. 1..... | 44 |
| <i>montanus</i> Bohm. 43 Ot. 59 <i>var.</i> | 165 | <i>nigriceps</i> Bohm. 34 Ot. 41 <i>var.</i> | 149 |
| <i>montanus</i> Mill. 62 Phyl. 33..... | 711 | <i>nigrita</i> F. 1781 Ot. 222..... | 317 |
| <i>monticola</i> Germ. 24 Ot. 158..... | 259 | <i>nigrita</i> Rossi 1790 Ot. 48..... | 154 |
| <i>montigena</i> M. 72 Ot. 63 ^a | 173 | <i>nitens</i> M. 72 Ot. 331..... | 436 |
| <i>montivagus</i> Wollst. 54 Lapar. 45 | 547 | <i>nitidus</i> Reiche 57 Ot. 331..... | 436 |
| <i>montivagus</i> Bohm. 43 Ot. 257.. | 350 | <i>nitidus</i> Bohm. 43 Omias 3..... | 562 |
| <i>montosus</i> M. 72 Baryp. 5..... | 577 | <i>nivalis</i> Stierl. 62 Ot. 221 ^a <i>var.</i> | 317 |
| <i>morio</i> Redt. 49 Ot. 269..... | 361 | <i>nobilis</i> Germ. 21 Ot. 45..... | 152 |
| <i>morio</i> Bohm. 34 Lapar. 3..... | 515 | <i>nobilis</i> (Dabl.) 72 Phyl. 21..... | 698 |
| <i>morio</i> Payk. 1800 Ot. 39..... | 147 | <i>noctivagus</i> Wollst. 54 Lapar. 45 | 548 |
| <i>morio</i> F. 1775 Ot. 66... <i>var.</i> | 177 | <i>nodipennis</i> Chev. 60 Trachyp. 5 | 610 |
| <i>morulus</i> Bohm. 43 Ot. 25 <i>var.</i> | 135 | <i>notatus</i> Steph. 31 Ot. 177 <i>var.</i> | 274 |
| <i>Mulleri</i> Gmel. 1777 Ot. 267..... | 359 | <i>notatus</i> Bond. 1785 Ot. 177... | 273 |
| <i>Mulleri</i> Rosh. 56 Ot. 127..... | 232 | <i>Novi</i> Fairm. 62 Ot. 72 ^a | 185 |
| <i>multicolor</i> Gmel. 01 Ot. 136... | 240 | <i>noxius</i> Bohm. 34 Per. 16..... | 69 |
| <i>multicostatus</i> Stierl. 61 Ot. 284. | 376 | <i>nubiculosus</i> Bohm. 34 Pholic. 3 | 484 |
| <i>multipunctatus</i> F. 1792 Ot. 55.. | 162 | <i>nubilus</i> Bohm. 43 Ot. 259..... | 352 |
| <i>multipunctatus</i> Ol. 08 Ot. 59... | 165 | <i>nudus</i> Stierl. 61 Ot. 333... .. | 438 |
| <i>muricatus</i> Chev. 60 Per. 40.... | 94 | | |
| <i>murinus</i> Bohm. 39 Pholic. 7... | 488 | <i>obœœtus</i> Bohm. 34 Ot. 155.. | 257 |
| <i>murinus</i> Bohm. 43 Mylac. 1.... | 21 | <i>obesulus</i> M. 72 Ot. 209..... | 305 |
| <i>mus</i> Stierl. 62 Ot. 224 ^a | 319 | <i>obesus</i> Stierl. 61 Ot. 209..... | 305 |
| <i>mus</i> F. 01 Pseudomylloc. 3..... | 742 | <i>oblongus</i> L. 1735 Phyl. 35..... | 713 |
| <i>muscula</i> Desbr. 72 Per..... | 748 | <i>oblongus</i> Bohm. 43 Omias 7 ^e ... | 564 |
| <i>muscorum</i> Bris. 63 Ot. 286 ^b ... | 378 | <i>obovatus</i> Gebl. 34 Phyl. 38..... | 716 |
| <i>muscorum</i> Desbr. 70 Per..... | 748 | <i>obscurellus</i> M. 72 Lapar. 24.... | 529 |
| <i>mutabilis</i> Desb. 73 Phyl. 44.... | 724 | <i>obscurus</i> Wollst. 64 Lapar. 24.. | 529 |
| <i>mutandus</i> M. 72 Cath. rm. 2.... | 647 | <i>obscurus</i> Gyll. 34 Ot. 333 ^d | 441 |
| <i>mutus</i> Gyl. 34 Phyl. 41..... | 721 | <i>ob-idianus</i> Bohm. 43 Ot. 235... | 330 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|---|--------|--|--------|
| <i>obsitus</i> Gyl. 34 Ot. 53..... | 160 | <i>pedemontanus</i> Stierl. 61 Ot. 275..... | 367 |
| <i>obsitus</i> Wollst. 64 Lapar. 31.... | 534 | <i>pelliceus</i> Bohm. 43 Ot. 311.... | 414 |
| <i>obsoletus</i> Stierl. 61 Ot. 2..... | 111 | <i>pellitus</i> Bohm. 43 Phyl. 15.... | 691 |
| <i>obscureatus</i> Stierl. 61 Ot. 276.... | 369 | <i>pellucidus</i> Bohm. 34 Baryp. 4.... | 577 |
| <i>obtriangularis</i> Wollst. 64 Lap. 17 | 525 | <i>perdix</i> Ol. 08 Ot. 88..... | 293 |
| <i>obtusatus</i> Bohm. 43 Ot. 137..... | 241 | <i>perdix</i> Bohm. 34 Ptoch. 4..... | 463 |
| <i>occidentalis</i> Wollst. 64 Lapar. 16 | 524 | <i>peregrinus</i> Stierl. 61 Ot. 217... | 313 |
| <i>olea</i> Stierl. 61 Ot. 29..... | 138 | <i>Perezi</i> Stierl. 62 Ot. 71 ^a | 184 |
| <i>OMIAS</i> Sch. 26 22° | 557 | <i>perforatus</i> Redt. 49 Ot. 235.... | 330 |
| <i>Omioides</i> Hoch. 51 Phyl. 56.... | 736 | <i>periscelis</i> Gyl. 34 Ot. 1 var.... | 109 |
| <i>opulentus</i> Germ. 17 Ot. 201.... | 295 | <i>periteloides</i> Fuss. 61 Ptoch. 15. | 472 |
| <i>orbicularis</i> Herbst. 1795 Ot. 73. | 187 | <i>PERITELUS</i> Germ. 24 5°..... | 31 |
| <i>orbicularis</i> Ol. 08 Ot. 48..... | 154 | <i>perplexus</i> Gyl. 34 Ot. 290 ^a | 381 |
| <i>orbitalis</i> Seidl. 68 Trachyp. 7.. | 612 | <i>persimilis</i> Wollst. 64 Lichen 5. | 509 |
| <i>orientalis</i> Gyl. 34 Ot. 21..... | 132 | <i>persitus</i> M. 72 Lapar. 31..... | 534 |
| <i>ornatus</i> (Germ.) Ot. 206 var.... | 301 | <i>pertusus</i> Sturm. 26 Ot. 283.... | 375 |
| <i>Orsinii</i> (Cristof.) 72 Ot. 272.... | 364 | <i>petiginosus</i> Stierl. 61 Ot. 243.. | 340 |
| <i>Oskayi</i> (Stenz.) 72 Ot. 166 var.. | 267 | <i>petrensis</i> Bohm. 43 Ot. 74..... | 188 |
| <i>ostentatus</i> Gyl. 34 Ot. 210 ^a | 308 | <i>phasma</i> Rott. 71 Ot. 88° | 765 |
| <i>OTIORHYNCHUS</i> Sch. 26 7°..... | 99 | <i>Pfisteri</i> Stierl. 64 Per. 36..... | 91 |
| <i>ottomanus</i> Stierl. 61 Ot. 328.... | 433 | <i>PHOLICODES</i> Sch. 26 14°..... | 481 |
| <i>ovallipennis</i> Bohm. 43 Ot. 321.. | 426 | <i>PHYLLOBIUS</i> Germ. 24 28°..... | 662 |
| <i>ovalatus</i> Bohm. 43 Ot. 303..... | 406 | <i>piceus</i> All. 69 Cyclom. 2..... | 17 |
| <i>ovatus</i> L. 1767 Ot. 286..... | 377 | <i>piceus</i> Marsh. 62 Baryp. 11.... | 582 |
| <i>pabulinus</i> Panz. Ot. 286 var.... | 378 | <i>piceus</i> Gyl. 34 Lapar. 46..... | 548 |
| <i>pachyscelis</i> Stierl. 61 Ot. 263.. | 337 | <i>picimanus</i> Stierl. 61 Ot. 301 ^a .. | 393 |
| <i>pallidipennis</i> Hoch. 47 Phyl. 59 | 738 | <i>picipes</i> F. 1777 Ot. 177..... | 273 |
| <i>pallipes</i> Gyl. 34 Phyl. 31..... | 709 | <i>pieitarsis</i> Ro-h. 56 Ot. 282.... | 374 |
| <i>panormitanus</i> (Germ.) 72 Ot. 297 | 389 | <i>pictus</i> Stev. 29 Phyl. 31..... | 709 |
| <i>paradoxus</i> Stierl. 72 Ot. 302° ... | 401 | <i>pigrans</i> Stierl. 61 Ot. 129 | 234 |
| <i>parallelus</i> Seidl. 68 Trachyp. 8. | 614 | <i>pilicornis</i> Desb. 72 Phyl. 11.... | 686 |
| <i>PARAMEIRA</i> Seidl. 68 9°..... | 457 | <i>pilifer</i> Gyl. 34 Phyl. 12..... | 687 |
| <i>Parreyssi</i> Stierl. 61 Ot. 174.... | 279 | <i>pilipes</i> Desb. 72 Phyl. 16..... | 692 |
| <i>partialis</i> Bohm. 43 Ot. 259 var. | 352 | <i>pilosulus</i> Chev. 65 Holec. 1 ^a .. | 11 |
| <i>parviceps</i> Desbr. 73 Phyl. 29.... | 707 | <i>pilosus</i> Gyl. 34 Ot. 82 ^a | 198 |
| <i>parvicollis</i> Seidl. 68 Holec. 3.. | 13 | <i>pinastri</i> Herbst. 1795 Ot. 283.. | 375 |
| <i>parvicollis</i> Gyl. 34 Ot. 142.... | 245 | <i>pineti</i> Redt. 49 Phyl. 26 var.... | 737 |
| <i>parvicollis</i> M. 72 Holec. 3.... | 13 | <i>pinens</i> (Kiesw.) 72 Phyl. 9..... | 683 |
| <i>parrulus</i> Seidl. 65 Per. 30..... | 88 | <i>pinicola</i> Kiesw. 64 Phyl. 9.... | 683 |
| <i>parvulus</i> Bohm. 34 Omias 7.... | 564 | <i>Piochardi</i> Stierl. 66 Ot. 278 ^a ... | 372 |
| <i>patruelis</i> Stierl. 61 Ot. 162.... | 263 | <i>Plagiatus</i> Desbr. 73 Phyl. S-G... 710 | |
| <i>pauper</i> Bohm. 43 Ot. 151 var.... | 253 | <i>planatus</i> Herbst. 1795 Ot. 23.... | 133 |
| <i>pauperculus</i> [Heer.] 72 Ot. 205 var. | 299 | <i>planidorsis</i> Seidl. 65 Per. 5.... | 49 |
| <i>pauxillus</i> Rosh. 47 Ot. 289.. .. | 380 | <i>planidorsis</i> Fairm. 56 Ot. 72... | 185 |
| | | <i>planirostris</i> Gyl. 34 Phyl. 54... | 774 |

PAGES.

PAGES.

| | |
|---|-----|
| planithorax Bohm. 43 Ot. 301 ^c . | 397 |
| planophthalmus Heyd. 71 Ot. | |
| 120 ^b | 766 |
| platysomus Seidl. 63 Per. 8. . . | 53 |
| PLATYTARSUS Sch. 39 24 ^o | 589 |
| plebejus Stierl. 61 Ot. 119 . . . | 226 |
| plebejus Bohm. 34 Pholie. 1 . . . | 482 |
| plumipes Germ. 17 Ot. 79 | 192 |
| politus Gyl. 34 Ot. 168 ^a | 268 |
| politus Stierl. 61 Ot. 206 var. . . | 301 |
| polyroccus Gyl. 43 Ot. 212..... | 310 |
| pomaceus Gyl. 34 Phyl. 5..... | 677 |
| pomone Ol. 08 Phyl. 51..... | 730 |
| ponticus Stierl. 72 Ot. 302..... | 762 |
| populeti Bohm. 43 Ot. 226 . . . | 321 |
| porcatus Herbst. 1793 Ot. 135. . | 239 |
| porcellus Bohm. 34 Ptoch. 4... 463 | |
| porcellus Bohm. 33 Strophomor. 1 | 478 |
| poricollis Gyl. 34 Ot. 301 ^a | 398 |
| poster M. 72 Ot. 342..... | 449 |
| praelongus Fairm. 63 Ot. 72 ^a ... | 185 |
| proletarius Bohm. 43 Ot. 273 ^a .. | 366 |
| prolixus Kiesw. 51 Per. 25..... | 81 |
| prolixus Rosh. 47 Ot. 228..... | 323 |
| prolongatus Stierl. 61 Ot. 229.. | 324 |
| promissus M. 72 Per. 25 | 81 |
| provincialis Stierl. 61 Ot. 263. . | 255 |
| proximus Stierl. 61 Ot. 149.... | 251 |
| pruinosis Germ. 17 Ot. 10..... | 120 |
| pruinosis Bohm. 43 Platyt. 3... 594 | |
| pseudomaticus Bohm. 43 Ot. 176 ^a | 273 |
| pseudomias Hoch. 47 Ot. 120.. | 226 |
| PSEUDOMYLLOCERUS Desb. 73 29 ^o | 739 |
| psittacinus Germ. 24 Phyl. 14.. | 689 |
| Prochus Sch. 26 10 ^o | 459 |
| pubens Bohm. 43 Ot. 41..... | 149 |
| puberulus Hoch. 51 Ot. 82 ^b ... | 198 |
| puberulus Stev. 29 Mylac. 3 ... | 22 |
| pubescens Bohm. 34 Aomus 1.. | 491 |
| pubifer Bohm. 43 Ot. 309..... | 413 |
| pulehellus Stierl. 61 Ot. 301 .. | 392 |
| pullus Gyl. 34 Ot. 168 ^b | 268 |
| pulverulentus Germ. 24 Ot. 1... 109 | |
| pulverulus Bohm. 43 Ot. 122 ^a .. | 229 |
| pulvinatus Hoch. 47 Ot. 322 ^a .. | 427 |

| | |
|---|-----|
| punctatissimus Gyl. 34 Ot. 65 var. | 175 |
| punctatus All. 69 Holcor. 3.... | 13 |
| puncticollis Wollst. 64 Lapar. 33 | 535 |
| puncticollis Tourn. 64 Stoni. 1 ^a | 455 |
| puncticornis Gyl. 34 Ot. 156... 258 | |
| punctirostris Bohm. 43 Baryp. 12 | 583 |
| punctiscapus Bohm. 43 Ot. 256. | 349 |
| pupillatus Gyl. 34 Ot. 181 | 276 |
| pusillus Stierl. 61 Ot. 184 | 281 |
| pusio Gyl. 34 Ot. 303 ^a | 407 |
| pusulatus Seidl. 68 Mylac. 6... 24 | |
| pustulatus Seidl. 68 Trachyp. 2. | 609 |
| pustulifer M. 72 Trachyp. 2.... | 609 |
| pygmaeus Stierl. 68 Cathorm. 15 | 655 |
| pygmaeus Stierl. 68 Holcor. 6... 14 | |
| pyrenaeus Gyl. 34 Ot. 56. . . . | 163 |
| pyrenaeus Seidl. 68 Baryp. 11 var. | 582 |
| pyri Sch. 34 Phyl. 5..... | 677 |
| pyri L. 1745 Phyl. 41..... | 721 |
| queralus Bohm. 34 Holcor. 1 .. | 10 |
| 4-signatus Bach. 56 Ptoch. 13.. | 470 |
| ragusensis Bohm. 34 Ot. 13 ... | 123 |
| rasus Wollst. 64 Lapar. 21 | 527 |
| raucus F. 1777 Ot. 87..... | 202 |
| raucus Herbst. 1793 Ot. 136 ... | 240 |
| Raymouli Gaut. 61 Omias 7.... | 564 |
| Raymondi Gaut. 61 Trachyp. 31 | 636 |
| Raymondi Gaut. 60 Ot. 274.... | 367 |
| rectus Thoms. 65 Trachyp. 9.. | 615 |
| regularis Stierl. 61 Ot. 249 var. | 345 |
| Reichei Stierl. 68 Ot. 188..... | 284 |
| Reichei Seidl. 68 Trachyp. 3... 609 | |
| reicheianus M. 72 Trachyp. 3. | 609 |
| reicheidius Desbr. 72 Phyl. 18. | 694 |
| religiosus Schranck 04 Ot. 200. | 294 |
| repletus Bohm. 43 Ot. 84..... | 200 |
| respersus Stierl. 61 Ot. 173.... | 270 |
| reticollis Bohm. 43 Ot. 291 var. | 384 |
| Reynosæ Bris. 66 Ot. 67 ^a | 178 |
| rhacusensis Germ. 24 Ot. 13... 123 | |
| rhaeticus Stierl. 62 Ot. 48 ^a | 155 |
| rhaeticus (Heer.) 72 Ot. 269.... | 361 |
| rhinolophus Seidl. 68 Myl. 13 . | 29 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|---|---------|--|--------|
| <i>rhododendri</i> Stierl. 61 Ot. 181 ^a .. | 278 | <i>salicis</i> (Stenz) Ot. 48 var..... | 154 |
| <i>Riessi</i> Fuss 68 Ot. 239 ^a | 757 | <i>sanguinipes</i> Bohm. 43 Ot. 42 .. | 150 |
| <i>robustus</i> Stierl. 61 Ot. 226 var. .. | 322 | <i>scaber</i> Redt. 58 Trachyp. 10... .. | 616 |
| <i>rodus</i> M. 72 Ot. 112..... | 220 | <i>scaber</i> Steph. 31 Ot. 278 var... .. | 371 |
| <i>romanus</i> Bohm. 43 Ot. 208 var. .. | 304 | <i>scaber</i> Thoms. 65 Trachyp. 33. .. | 638 |
| <i>rosa</i> de G. 1781 Ot. 286..... | 377 | <i>scaber</i> L. 1761 Trachyp. 19... .. | 625 |
| <i>roscidus</i> Gyl. 34 Ot. 175..... | 271 | <i>scaber</i> Bonsd. 1785 Ot. 136.... | 240 |
| <i>rostratus</i> Thoms. 68 Trachyp. 33 .. | 368 | <i>scaber</i> Sch. 43 Trachyp. 14.... | 615 |
| <i>rotundatus</i> Siebold 37 Ot. 377 ^b 444-759 | | <i>scaherrimus</i> Stierl. 61 Ot. 19... .. | 130 |
| <i>rotundatus</i> F. 1792 Mylæ. 3... .. | 22 | <i>scabricollis</i> Germ. 17 Ot. 10 var. .. | 120 |
| <i>rotundicollis</i> Capiom. 67 Bubal. 2 .. | 500 | <i>scabriculus</i> L. 1768 Trachyp. 14. .. | 619 |
| <i>rotundus</i> M. 72 Ot. 337 ^b | 444-759 | <i>scabriculus</i> Gyl. 13 Trachyp. 19. .. | 625 |
| <i>rubiginosus</i> Stierl. 61 Ot. 117... .. | 224 | <i>scabridus</i> Steph. 31 Ot. 113... .. | 220 |
| <i>rubripes</i> M. 71 Mylæ. 4 | 23 | <i>scabripennis</i> Gyl. 34 Ot. 54... .. | 161 |
| <i>rudis</i> Bohm. 43 Per. 29..... | 87 | <i>scabrosus</i> Marsh. 02 Ot. 111... .. | 219 |
| <i>rudis</i> Stierl. 61 Ot. 112 | 220 | <i>sculptus</i> Gyl. 34 Ot. 245..... | 341 |
| <i>rudis</i> Bohm. 43 Parameir. 1.... | 458 | <i>scapularis</i> Wollst. 64 Lapar 11. .. | 521 |
| <i>ruficollis</i> F. 1792 Baryp. 12.... | 583 | <i>Schaufussi</i> Miller 61 Stomod 3... .. | 456 |
| <i>ruficollis</i> Bohm. 34 Baryp. 3... .. | 576 | <i>Schaumi</i> Stierl. 61 Ot. 248..... | 344 |
| <i>ruficornis</i> Bris. 63 Per. 17 | 71 | <i>Schanmi</i> Wollst. 54 Lapar. 53... .. | 554 |
| <i>ruficornis</i> Redt. 49 Phyl. 34.... | 712 | Schaumius Bris. 66 26° S-G... .. | 639 |
| <i>rufimanus</i> Hoch. 51 Ot. 48 ^b | 156 | <i>Schläfli</i> Stierl. 61 Ot. 220... .. | 315 |
| <i>rufipes</i> Gyl. 34 Ptoch. 8 | 467 | <i>Schmidti</i> Stierl. 61 Ot. 152..... | 254 |
| <i>rufipes</i> Bohm. 34 Omias 2..... | 562 | <i>Schrenherri</i> Bohm. 43 Per. 7... .. | 52 |
| <i>rufipes</i> Duv. 53 Baryp. 15.... | 586 | <i>Schwabi</i> (Stenz) 72 Ot. 269..... | 361 |
| <i>rufipes</i> Bohm. 43 Ot. 60 var... .. | 169 | <i>scitus</i> Bohm. 43 Ot. 90..... | 206 |
| <i>rufolipes</i> M. 72 Omias 2 | 562 | <i>scitus</i> Gyl. 43 Ot. 210... .. | 307 |
| <i>rugaticollis</i> M. 72 Trachyp. 16 .. | 622 | Scoliocerus Wollst. 54 26° S-G. .. | 639 |
| <i>rugicollis</i> Germ. 17 Ot. 264.... | 356 | <i>Scopolii</i> Gmel. 1777 Ot. 286.... | 377 |
| <i>rugicollis</i> Seidl. 68 Trachyp. 16 .. | 622 | <i>scopularis</i> Hoch. 47 Ot. 315.... | 419 |
| <i>rugicollis</i> Bohm. 43 Omias 10 ... | 568 | <i>scrobiculatus</i> Gyl. 34 Ot. 59.... | 165 |
| <i>rugicollis</i> Steph. 31 Ot. 279.... | 373 | <i>sculptipennis</i> Wollst. 64 Lichen.7 .. | 510 |
| <i>rugifrons</i> Gyl. 13 Ot. 278..... | 371 | <i>sculptirostris</i> Hoch. 47 Ot. 245 ^a .. | 342 |
| <i>rugifrons</i> Hoch. 51 Omias 9 ^a .. | 567 | <i>sculptus</i> Brul. 38 Lapar. 4..... | 516 |
| <i>rugipennis</i> Bohm. 43 Ot. 59 var. .. | 165 | <i>scutellaris</i> Redt. 49 Phyl. 45... .. | 725 |
| <i>rugosifrons</i> M. 72 Omias 9 ^a | 567 | <i>scydmænoides</i> Seidl. 68 Baryp. 10 .. | 581 |
| <i>rugosus</i> Hum. 27 Ot. 233..... | 328 | <i>seductor</i> Stierl. 61 Ot. 199..... | 293 |
| <i>rugosus</i> Schranck Ot. 267..... | 359 | <i>segnis</i> Gyl. 34 Ot. 285..... | 377 |
| <i>rusticus</i> Bohm. 43 Per. 22..... | 77 | <i>Seidlitz</i> Bris. 68 Trachyp. 1... .. | 607 |
| <i>rutilipes</i> Hoch. 51 Ot. 59 ^a 302... .. | 168 | <i>semigranulatus</i> Stierl. 61 Ot. 302 ^a .. | 400 |
| <i>sabulosus</i> Gyl. 34 Ot. 24..... | 134 | <i>seminulum</i> F. 1792 Myl. 7. | 24 |
| <i>sabulosus</i> Redt. 58 Trachyp. 28. .. | 634 | <i>semituberculatus</i> Stierl. 73 Ot. .. | |
| <i>sævus</i> Bohm. 43 Ot. 333 ^b | 440 | 302 ^a | 763 |
| <i>salebrosus</i> Bohm. 43 Ot. 8 var. .. | 117 | <i>senex</i> (Chevl.) Ot. 279 var..... | 273 |
| | | <i>senex</i> Bohm. 34 Per. 10..... | 57 |

PAGES.

| |
|---|
| <i>seniculus</i> Wollst. 64 Lapor. 22. 528 |
| <i>sensitivus</i> Scopol. 1763 = Ot. 23 133 |
| <i>septentrionis</i> Herbst. 1793 Ot. 136 240 |
| <i>sericeus</i> Bohm. 43 Omias 7. 364 |
| <i>serichirtus</i> M. 72 Ot. 154 ^a 734 |
| <i>serichispidus</i> Gyl. 34 Phyl. 54. . 734 |
| <i>serichispidus</i> Bohm. 34 Hole. 1. 10 |
| <i>serichispidus</i> Stierl. 72 Ot. 154 ^a 754 |
| <i>serripes</i> Desb. 73 Phyl. 30. 708 |
| <i>setarius</i> Gyl. 34 Trachyp. 14. . . 619 |
| <i>seternis</i> M. 72 Trachyp. 20. . . . 627 |
| <i>setifer</i> Bohm. 43 Ot. 148. 249 |
| <i>setiger</i> Gyl. 39 Plat. 3. 594 |
| <i>setiger</i> Seidl. 68 Trachyp. 20. . . 627 |
| <i>setosa</i> Seidl. 68 Paramier. 2. . . . 158 |
| <i>setosulus</i> Stierl. 61 Ot. 293. . . . 388 |
| <i>setosus</i> Bohm. 34 Ptoch. 3. 464 |
| <i>setosus</i> F. 01 Ot. 136. 210 |
| <i>setosus</i> (Meg.) Ot. 113 var. 220 |
| <i>setulosus</i> Bohm. 45 Platyt. 8. . . 597 |
| <i>siculus</i> Seidl. 68 Holcor. 4. 43 |
| <i>siculus</i> Kiesw. Siedl. 63 Per. 26 |
| var. 83 |
| <i>siculus</i> (Dej.) Ot. 13 var. 123 |
| <i>signatipennis</i> Gyl. 34 Ot. 195. . 289 |
| <i>simo</i> Ol. 08 Per. 4. 48 |
| <i>simplex</i> Brul. 38 Lapor. 41. . . . 543 |
| <i>simplicatus</i> Stierl. 61 Ot. 237. . 334 |
| <i>singularis</i> L. 06 Ot. 177 var. . . 274 |
| <i>singularis</i> Schrank 1798 Ot. 177 273 |
| <i>Sinon</i> Desbr. 72 Phyl. 20 var. . . 697 |
| <i>sinuatus</i> Chev. 60 Per. 20. 73 |
| <i>sinuatus</i> F. 01 Pseudomyll. 2. . . 741 |
| <i>smaragdifer</i> Kiesw. 64 Phyl. 22. 699 |
| <i>socius</i> Bohm. 43 Cathorm. 2. . . 646 |
| <i>sordidus</i> Stierl. 61 Ot. 144. . . . 247 |
| <i>soricinus</i> M. 71 Mylac. 1. 21 |
| <i>spalatrensis</i> Bohm. 43 Ot. 15. . . 125 |
| <i>sphaericus</i> Bohm. 43 Mylac. 1 var. 21 |
| <i>sphaeroides</i> Germ. 24 Per. 15. . . 63 |
| <i>sphaeroides</i> Seidl. 68 Baryp. 1 var. 574 |
| <i>spinifer</i> Seidl. 70 Cyclopt. 1. . . . 30 |
| <i>spinimanus</i> Thoms. 63 Trachyp. 9 615 |
| <i>spinimanus</i> Gyl. 27 Trachyp. 14. 619 |
| <i>spinimanus</i> Germ. 24 Trachyp. 12 617 |

PAGES.

| |
|--|
| <i>spinosulus</i> Gaut. 61 Trachyp. 14. 619 |
| <i>splendens</i> M. 72 Aprepes. 1. . . . 490 |
| <i>spoliatus</i> Stierl. 72 Ot. 97 ^a . . . 752 |
| <i>spumans</i> M. 72 Ot. 248. 344 |
| <i>squamans</i> M. 72 Per. 31. 89 |
| <i>squamatilis</i> M. 72 Ot. 204. . . . 298 |
| <i>squameus</i> Bohm. 43 Ot. 176. . . . 272 |
| <i>squamifer</i> Bohm. 43 Ot. 140. . . . 244 |
| <i>squamifer</i> F. 01 Ot. 205. 299 |
| <i>squamiger</i> Ol. 08 Ot. 200. 254 |
| <i>squamiger</i> Marsh. 02 Ot. 177. . . 273 |
| <i>squamosus</i> Gyl. 34 Trachyp. 19. 625 |
| <i>squamosus</i> Brul. 38 Lapor. 8. . . 519 |
| <i>squamosus</i> Mill. 59 Ot. 204. . . . 298 |
| <i>squamosus</i> Bris. 66 Phyl. 17. . . . 693 |
| <i>squamulatus</i> Reiche. 62 Per. 31. 89 |
| <i>squamulatus</i> Ol. 08 Trachyp. 23. 633 |
| <i>squamulatus</i> (Dej.) Ot. 204 var. 299 |
| <i>squamulifer</i> M. 72 Ot. 140. . . . 244 |
| <i>squarrosus</i> Desb. 72 Phyl. 17. . . 693 |
| <i>stipulatus</i> Germ. 17 Trachyp. 24. 632 |
| <i>stierlinensis</i> Desb. 73 Phyl. 36. 714 |
| <i>Stierlini</i> Gemm. = Ot. 144 ^a . . . 222 |
| <i>Stierlini</i> Desb. 73 Phyl. 36. . . . 714 |
| <i>stomachosus</i> Gyl. 43 Ot. 41. . . . 149 |
| <i>Stomodes</i> Sch. 26 8°. 453 |
| <i>striatosetosus</i> Bohm. 43 Ot. 291 |
| var. 384 |
| <i>stricticollis</i> Fairm. 59 Ot. 57 ^a . . 382 |
| <i>strictus</i> Gmel. 1779 Ot. 218. . . . 314 |
| <i>strigifrons</i> Gyl. 34 Omias. 9. . . . 566 |
| <i>strigirostris</i> Bohm. 43 Ot. 272. . 364 |
| <i>strigirostris</i> Hoch. 51 Ptoch. 2. 462 |
| <i>strigosirostris</i> M. 72 Ptoch. 2. . 462 |
| <i>STROPHOMORPHUS</i> Seidl. 67 13°. 477 |
| <i>styriacus</i> Seidl. 68 Baryp. 6. . . . 578 |
| <i>subcostatus</i> Stierl. 66 Ot. 136 ^a . 240 |
| <i>subcostatus</i> Kolen. 58 Myllœcer. 3 745 |
| <i>subdentatus</i> Bach. 54 Ot. 181 var. 276 |
| <i>subdentatus</i> Bach. 54 Ot. 182. . 277 |
| <i>subdentatus</i> Bohm. 43 Phyl. 40. 720 |
| <i>subdepressus</i> Stierl. 72 Ot. 119 ^a . 752 |
| <i>subdepressus</i> Mals. 59 Per. 25. 83 |
| <i>subnebulosus</i> Wollst. 64 Lapor. 39 541 |
| <i>subnitidus</i> Bohm. 43 Baryp. 3. . . 576 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|--|--------|---|--------|
| submodosus Wollst. 64 Lichen. 6 | 509 | <i>terrestris</i> (Dahl.) Ot. 291 <i>var.</i> ... | 385 |
| subnudus Seidl. 68 Platyt. 7.... | 596 | terricola Lind. 63 Ot. 344..... | 351 |
| subopacus Wollst. 65 Lapa. 23. | 528 | tersus (Sch.) Desb. 73 Phyl. 40. | 720 |
| subquadratus Rosh. 47 Ot. 187.. | 283 | <i>tessellatus</i> (Heyd.) Phyl. 33.... | 711 |
| subsagillatus M. 72 Ot. 250..... | 346 | <i>tessellatus</i> Bohm. 43 Trachyp. 19 | 625 |
| <i>subsignatus</i> Gyl. 34 Ot. 250..... | 346 | tessellatus Brul. 38 Lapa. 30.. | 533 |
| subsignatus Bohm. 34 Ptoch. 14. | 471 | tesserula Wollst. 64 Lichen. 4. | 508 |
| subspinosus Stierl. 61 Ot. 99... 215 | | teter Gredl. 66 Ot. 148 ^b | 250 |
| substriatus Gyl. 34 Ot. 40..... | 148 | tetriens Bohm. 34 Lapa. 41.... | 543 |
| subtessellatus Wollst. 54 Anem. 2 | 503 | thalassinus Gyl. 34 Phyl. 43.... | 723 |
| sulcatifrons M. 72 Baryp. 15... 586 | | thracicus Stierl. 61 Ot. 141.... | 244 |
| sulcatus F. 1775 Ot. 218..... | 314 | tibialis Wollst. 64 Lapa. 40... 542 | |
| <i>sulcatus</i> Payk. 1800 Ot. 222..... | 317 | <i>ticinensis</i> Stierl. 58 Ot. 31 <i>var.</i> | 140 |
| <i>sulcifrons</i> Bohm. 43 Baryp. 15.. | 586 | tolutarius Bohm. 34 Stomod. 2. | 455 |
| <i>sulcifrons</i> Gyl. 34 Ot. 237..... | 334 | tomentifer Bohm. 43 Ot. 313 ^a .. | 416 |
| <i>sulcipcennis</i> (Dahl.) Ot. 245..... | 341 | tomentosus Gyl. 34 Ot. 297.... | 389 |
| <i>sulcirostris</i> Chev. 66 Cathorn. 7 | 649 | Tournieria Stierl. 7° S-G..... | 409 |
| <i>sulcirostris</i> Wollst. 64 Lapa. 36 | 537 | TRACHYPHLOEUS Germ. 24 25°.. | 599 |
| sulcirostris Bohm. 43 Ot. 293.. | 386 | transparens Fisch. 21 Ot..... | |
| <i>sulcirostris</i> Chev. 60 Platyt. 1. | 592 | transylvanicus Stierl. 61 Ot. 322. | 426 |
| sulcirostris Bohm. 34 Phyl. 54. | 734 | <i>transylvanicus</i> Seidl. 68 Platyt. 9 | 598 |
| sulcogenmmatus Bohm. 43 Ot. 63. | 172 | trichographus Stierl. 61 Ot. 154. | 256 |
| sulphurifer F. Ot. 22..... | 132 | <i>trichopterus</i> Gant. 63 Baryp. 9. | 580 |
| <i>sulphurifer</i> Herbst. 1797 Ot. 48. | 154 | <i>tristis</i> F. 1775 Ot. 87 <i>var.</i> | 202 |
| <i>suratus</i> Gyl. 34 Phyl. 54..... | 734 | tristis Stierl. 62 Ot. 114 ^a | 222 |
| sus M. 72 Ptoch. 4..... | 463 | <i>tristis</i> Scopol. 1763 Ot. 222 .. | 317 |
| Susanæ Seidl. 65 Per. 11..... | 60 | trivialis Bohm. 34 Pholic. 2.... | 483 |
| sutnrellus Fairm. 59 Per. 33... 90 | | <i>trivialis</i> Bohm. 43 Phyl. 21.... | 697 |
| sylvestris Chev. 66 Ot. 72 ^b | 186 | Troglophynchus Schmidt 56 7° | |
| <i>sylvestris</i> Chev. 66 Ot. 161... 262 | | S-G..... | 448 |
| syriacus Bohm. 43 Pholic. 6... 487 | | trojanus Stierl. 61 Ot. 242..... | 339 |
| <i>syriacus</i> Seidl. 68 Trachyp. 30.. | 636 | trossulus Wollst. 54 Anem. 3.. | 504 |
| syrus M. 72 Trachyp. 30..... | 636 | Truequii Seidl. 68 Trachyp. 41. | 617 |
| | | truncatellus Graëlls. 55 Ot. 64. | 173 |
| tagenoides Stierl. 61 Ot. 130... 235 | | truncatus Stierl. 61 Ot. 20..... | 131 |
| <i>Tarnieri</i> Stierl. 61 Ot. 210..... | 307 | tuberculifer Chev. 65 Phyl. 19. | 695 |
| <i>tauriens</i> Stev. 29 Ot. 240..... | 337 | tumefactus Stierl. 61 Ot. 61.... | 170 |
| tectus M. 72 Lapa. 34..... | 535 | tunnens M. 72 Lapa. 19..... | 526 |
| tenebricosus Herbst. 1795 Ot. 39. | 147 | tumidicollis Stierl. 61 Ot. 332.. | 437 |
| tenellus Wollst. 64 Lapa. 32.. | 534 | tumidipes Stierl. 61 Ot. 266... 358 | |
| tener Stierl. 61 Ot. 261..... | 354 | turea Bohm. 43 Ot. 207..... | 302 |
| tenex Bohm. 43 Baryp. 13.... | 584 | turcius Seidl. 68 Mylac. 11... 27 | |
| tennicornis Mill. 70 Ot. 185 ^a .. | 383 | <i>turcius</i> Seidl. 68 Trachyp. 18 <i>var.</i> | 624 |
| <i>tereticollis</i> Gyl. 34 Phyl. 25 <i>var.</i> | 703 | <i>turgidus</i> Germ. 17 Ot. 10 <i>var.</i> .. | 120 |
| teretirostris Stierl. 66 Ot. 182 ^a . | 279 | Tyloderes Sch. 26 7° S-G..... | 444 |

| | PAGES. | | PAGES. |
|--|--------|--|--------|
| <i>ulmi</i> Beek. 64 Phyl. 51..... | 730 | <i>vestitus</i> Wollst. 64 Lapar. 29.. | 532 |
| <i>umbilicatus</i> Stierl. 21 Ot. 292.. | 385 | <i>vestitus</i> Bohm. 43 Mylac. 1 <i>var.</i> | 21 |
| <i>uncinatus</i> Germ. 24 Ot. 147. . | 249 | <i>vestitus</i> Kust. 48 Trachyp. 32.. | 637 |
| <i>unctuosus</i> Germ. 24 Ot. 302.... | 399 | <i>vestitus</i> Gyl. 34 Ot. 91..... | 206 |
| <i>undatus</i> Wollst. 64 Lapar. 5.... | 517 | <i>villosopunctatus</i> Gyl. 34 Ot. 59 | |
| <i>undulatus</i> Wollst. 62 Lapar. 2. | 514 | <i>var.</i> | 165 |
| <i>unicolor</i> Herbst. 1795 Ot. 66.... | 177 | <i>villosulus</i> Germ. Platyt. 4..... | 595 |
| <i>uniformis</i> Marsh. 02 Phyl. 52.. | 731 | <i>villosus</i> Stierl. 72 Ot. 297 ^a | 760 |
| <i>uniformis</i> Sch. 43 Phyl. 51.... | 730 | <i>violatus</i> Seidl. 68 Baryp. 7..... | 579 |
| | | <i>virens</i> Bohm. 43 Phyl..... | 738 |
| Valachiæ Fuss. 68 = Ot. 79 ^b <i>var.</i> | 730 | <i>viridans</i> Bohm. 43 Phyl. 26 <i>var.</i> | 703 |
| <i>valgus</i> Gyl. 34 Phyl. 24..... | 701 | <i>viridiacris</i> Laich. 1781 Phyl. 52. | 731 |
| <i>validicornis</i> Fald. 38 Ot. 95 ^b .. | 211 | <i>viridicollis</i> F. 01 Phyl. 53..... | 732 |
| <i>vallestris</i> Hampe 70 Baryp. 12 ^a . | 584 | <i>virguncula</i> Seidl. 61 Baryp. 2.. | 575 |
| <i>validicornis</i> Mark. 44 Omias 10. | 584 | <i>vitellus</i> Gyl. 34 Ot. 288 ^a | 380 |
| <i>varians</i> M. 72 Ot. 185..... | 282 | <i>vitis</i> (Stev) Gyl. 34 Ot. 333 ^a .. | 439 |
| <i>variegatus</i> Hoch. 51 Ptoch. 1.. | 462 | <i>vittatus</i> Germ. 17 Ot. 65..... | 175 |
| <i>variegatus</i> Kust. 48 Trachyp. 22. | 629 | <i>viverra</i> Herbst. 1784 Trachyp. 14 | 619 |
| <i>variegatus</i> Bohm. 43 Per. 4.... | 48 | <i>rochinensis</i> (Schmt.) Ot. 18 <i>var.</i> | 128 |
| <i>rarius</i> Bohm. 43 Ot. 185..... | 282 | <i>vorticosis</i> Gyl. 34 Ot. 286 <i>var.</i> | 378 |
| <i>rarius</i> Brul. 32 Phyl. 31..... | 709 | <i>Vuillefroyi</i> Bris. 66 Cathorm. 9. | 651 |
| <i>rastator</i> Marsh. 02 Ot. 177.... | 274 | <i>vulgaris</i> M. 72 Ot. 119..... | 226 |
| <i>vehemens</i> Bohm. 43 Ot. 31.... | 140 | | |
| <i>velatus</i> M. 72 Lapar. 29..... | 532 | Waltoni Bohm. 43 Cœnop. 3... .. | 98 |
| <i>vellicatus</i> Germ. 24 Ot. 197.... | 389 | Waterhousei Wollst. 54 Lapar. 57 | 557 |
| <i>velutinus</i> Germ. 24 Ot. 312.... | 415 | <i>Wiesuri</i> (Dahl) Ot. 151..... | 253 |
| <i>velutinus</i> Fairm. 60 Cyclom. 1. | 16 | <i>Wolff</i> (Stenz) Phyl. 11..... | 681 |
| <i>ventralis</i> M. 68 Ot. 73 ^a | 187 | Wollastoni M. 72 Lapar. 11... .. | 521 |
| <i>ventricosus</i> Germ. 34 Trachyp. 15 | 621 | | |
| <i>ventrosus</i> Wollst. 54 Lapar. 55. | 555 | xanthocnemus Kiew. 51 Phyl. 46. | 725 |
| <i>verecundus</i> Bohm. 43 Phyl. 5. . | 677 | <i>xanthocnemus</i> Desbr. 73 Phyl. 47 | 727 |
| <i>vernalis</i> Stierl. 61 Ot. 189..... | 285 | | |
| <i>verruca</i> Bohm. 34 Mylac. 5.... | 23 | ypsilon Seidl. 68 Trachyp. 18.. | 623 |
| <i>verrucicollis</i> Stierl. 61 Ot. 235 ^b . | 332 | | |
| <i>vespertinus</i> Wollst. 54 Lap. 46. | 548 | Zebei Stierl. 61 Ot. 94..... | 208 |
| <i>vespertinus</i> Gyl. 34 Phyl. 41... .. | 721 | zebra F. 1792 Ot. 316..... | 420 |

ERRATA

PAGES.

- 74 *Perit. hispanus* Guér., mettez p. 403 au lieu de 23.
93 mettez *AQUILUS* au lieu d'*aquila*.
133 à or. *planatus* ajoutez *sensiticus* Scop. Carn. 1773, 32.
143 remplacez *longulus* par *francolinus* (Schauf.).
146 reportez *erythropus* comme var. de *fuscipes*.
155 ajoutez, après *rheticus*, var. *collinus* Gredl. Tir. II 329.
164 après *amabilis*, remplacez *Seidl.* par *Stierlin*.
165 reportez *cereus* comme variété au *niger*.
178 reportez *imus* comme variété à l'*unicolor*.
186 supprimez *sylvestris* Chevrl. = *jugicola*.
200 supprimez *scitus*.
216 remplacez *Carcelli* par *Carceli*.
218 supprimez *Ot. excursor*, reproduit p. 653.
222 remplacez *tristis* par *Stierlini* Gemm.
226 rapportez *lutosus* à *Pseudomius*.
252 remplacez *hispidus* par *hispidosus*.
260 rapportez *fallax* à *Kindermanni*.
383 ajoutez à *tenuicornis* : Mill. Vien. zool. Bot. 70, 219. —
Stierl. Berl. 72, 333.
394 ajoutez à *Coyei* : Chevrl. Harold. Col. v 69, 75.
400 ajoutez à *Marseuli* : Stierl. Berl. 72, 339.
401 ajoutez à *paradoxus* : Stierl. Berl. 72, 338.
403 ajoutez à *Allardi* : Stierl. Berl. 72, 334.
539 *Omius lepidotus* Perris est une *Foucartia*.
680 rapportez le *Trach. maculatus* Per. au *setermis*.
737 reportez *pineti* Redt. comme var. à l'*argentatus*.
-

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00449259 1

nhent QL596 C9S45

v 2 Monographie des Otorhynchides /